

De medicamentorum

SIMPLICIVM DELECTV, PRAE-
PARATIONIBVS, MISTIONIS

modo, Libri tres, Iacobo

Syluio medico

authore.



PARISIIS

Væneunt prope gymnasium Cameracense, è re-
gione sancti Christofori per Iacobum
Gasellum.

1 5 4 2.

Cum Priuilegio



De medicamentorum

REPUBLICAE DELECTAE

PARATIONIBUS MIXTIONIBUS

modis

modis

modis

A Court veue la Requeste presentee a icelle par Maistre
L Jaques Syluius medecin en ceste ville de Paris, avec la cer-
tification de deux docteurs en la faculte de Medecine, A
permis & permet a icelluy Syluius ensemble a Limprimeur ou Li-
braire que par luy sera aduoue en ceste partie, d'imprimer, ou faire
imprimer mettre ou exposer en vente vn liuret nagueres par ledict
Syluius compose, intitule De Medicamentorum simplicium Dele-
ctu, Preparationibus, & Mixtionis modo, defendat a tous autres Im-
primeurs, libraires, marchans & autres, icelluy liure imprimer, ven-
dre & distribuer dedans trois ans prochainement venans, Sur peine
de confiscation desdicts liures qui autrement seroient imprimez, &
damende arbitraire a la discretion de ladicte Court.



Vnc laborem meū reipublicæ imprimis vtilem , & mi-
rum ni etiam necessarium dedo ac dedico amplissimę
H Parrhisorum politię administratoribus maximis simul
& optimis Stephano à Monte Mirabili, in summo Par-
rhisorum Senatu Consuli equissimo, mercatoribusque
Pręfecto, & Quatuor viris (Scabinos vocat Gallia) Thomę Bragero-
nio Cõsuli Castellano, Guichardo Curtino vrbis (vt vocāt) Quarta-
nario, Gulielmo Crasso, & Nicolao Perotto mercatoribus iustissi-
mis & opulentissimis: quorū vt reipublicæ nostrę incremētis ac or-
namentis felicia omnia ac summa comprecor pro sua in me nō vul-
gari benignitate. Quam propterea quod equare non potui, geome-
tricis aliquot machinis huic vrbi maximę vtilibus, quod gratię de-
fuit, hoc munusculo sufficere tētaui. quod vt manu grata suscipiant,
vehementer obsecro.

A ij

AD LECTOREM.

V

T rectè est veterum sermone celebrata sentètia, Quam quisque nouit artè, hanc exerceat vnà atque excolat, & totus in ea versetur: sic rectè nunc pronunciari posse mihi persuadeo, quam quisque exercere artè constituit, hanc accuratè prius pernoscat. Id quod si hodie diligentius obseruarent homines, non tam multi repente fierent medici, nulladū medicinę parte illis probe peruestigata, nullius adhuc morbi curatione apud præceptores obseruata. Cum tamē esset è re ipsorum: sed magis etiam ægrorū, si nullum omnino affectum suscipere curandum, quem non antè obseruassent à præceptoribus curatum. Quam rectè cum ægris ageretur, si hac ætate qui medicinā fatitant, sic essent antè sub præceptoribus instituti affectus cognoscere, illis occurrere, futura prænunciare. Non mediūsfidius per hominum mortes, experimenta sic agerent imperiti adhuc & rerum omnium suarū rudes medici: tam quæstus auidi, vt quid eos deceat ignorent, quid famam perstringat nesciant, vt interim animæ detrimentum taceā. Vbi enim medicas nescio quas præceptiunculas memoria didicerint, ac medicamentorum certas quasdam scripturas, se medicos profitentur. Illis est satis scire antidotum, catholicū verbi gratia, humorum omnium redundantiam vacuare, cum ignorent, quibus, & quanta singulorum mensura constet, quæ singulorum sit facultas, quæ horum cum illis sic mistorum: eadēque in ceteris medicamentis compositis vtūtur, ignoratiē impostura. Quid per deum immortalem hoc hominis portento, se medicum mentiente, est reipublicæ pestilentius: quod nota censoria dignum magis est facinus. Cur leges cessatis in hos carnifices, vt meriti sunt animaduertere? An nondum extant quæ hanc capitalem inscitiam puniāt, & nouo vindictæ exemplo coerceant? aut si hæc peccandi licentia impune permittitur, cur non modo ex typographorū prælis, sed omni omnium hominum ordine in medicinā non cōuolatur? Sed deus optime maxime nobis largire meliora, & indoctis his carnificibus ignorantie suæ conscientiam oppone, vt facinorum tam indignorum poenitentia confusi in ordinem suum redigantur. Iam ab hac arena explosis circulatoribus istis, rem medicā sincere tractaturo non soli pharmacopœo necessariam esse hanc medicinæ partem quæ simplicia deligit, ad compositionem præparat, & deniq; feliciter commiscet, docere aggredior. si enim pharmacopœi fides tibi suspecta est, velisque

ob id ipsi simplicia deligēti, præparanti, miscēti, adesse, quid ex hoc studio emolumēti cōsequere, nisi hæc tu vt ille pernoscas? imò quam tibi infamiæ notam imprudens inuris, dum ignarus horum simplicium medicamentorum, tanquam asinus quidam ad omnia eius rogata auribus motis velut annuis. Quid quod tibi sæpe etiam volens pharmacopœus illudit, & mea sentētia iustissimè, dum coryli nucamentum pro pipere longo ostentat, dum cētaurii magni radicem pro rha pontico, dum acorum palustrem nostrum pro Indico & vero porrigit, sed vitia hæc tolerabilia sunt. Pro elleboro autem nigro, Arabum napellum, aconiti genus quibuscūq; hodie prope ab omnibus pharmacopœis substitui quis ferat? an non communis est vtriq; medicorum & aromatariorum ordini ignorātia & culpa? Venia dignior est impostura, cum aristolochiā clematitum nobis frequētem pro duabus aliis rarioribus supponūt: indignior, cum scammonium crudum pro cocto miscēt, aut largius quàm scriptura medicamenti postulet, medicamentis immiscent, aut etiam cum alicuius ex tithymallis lac miscēt pro scāmonio. Quæ errata ceteraque omnia in medicamentorum mistione committi solita si vellem persequi, longior Iliade nostra procederet oratio. At vt donemus medico ad componendum nihil opus esse diligenti ista in simplicibus medicamentis deligendis, parandis, & miscendis exercitatione, iam pharmacopœo commissa: ad pernoscendum autem cōpositi vires, omnia hæc illi ad vnguem sunt pernoscēda. si enim vnius simplicis improbitas totam sæpe compositionem vitiat, vt abundè in methodo medicamēta cōponendi docuimus, an parui esse tibi debet singulorū simplicium delectus, si item præparationis ratio simplicium vires auget, minuit, abolet, nouas acquirit, vt libro secundo explicamus: quam tu horum ignarus facultatem toti medicamēto tribues? Si deniq; misionis modus ex eadem materia vnguentum, ceratum, emplastrum efficiat, an tibi est negligendus? Crede mihi absurdissimus est, ac sæpe ridiculus, qui medicinam facit harū rerum ignarus, nō dico quoties medici imperiti enumerata simplicia turba subscribant, fiat emplastrum, vel aliud, cum tamen ad hanc medicamenti formā scripta illa simplicia nunquam veniant. Quæ res medicum pharmacopœo ignorantia suspectū merito reddit. Præterea multos me vidisse tam harum rerum imperitos, vt cum in officinas diuertissent pharmacopœorum, non modo simplicia vsu ipsis quotidiano celebrata non agnouisse, sed neque composita medicamenta illis prope cōtinenter in ore & calamo versata nouisse mollia ne essent an solida. an nō id est ignorantia rerum maxime necessariarum crassissima? Quam ne

exuant plerique, à medici dignitate alienum putant in medicamentarias officinas diuertere, ibi aliquandiu sedere, quæ componuntur obseruare, quæ consuetudo, vt in Gallia Narbonensi est antiquissima, utinam hic saltem nunc inciperet ac procederet, spectaret medici quam foede frequenter labuntur ob compositorum iniquitatem, & fortasse sua dignitate, si scientia id minime possent sua, indoctos, aut improbos pharmacopœos à praua compositione deterrent. Hæc prolixius à me scripta quam rei natura postulet, fortasse ineptus aliquis calumniabitur: cū tamē res ipsa longissimam efflagitet orationē, quæ profligata multorum ignorantia omnes medici nomine dignandos in id studium impellere posset, ne posthac esset accusationi locus. Faxit deus, vt quisq; quā exercet artē pernoscat, & medicus nihil eorū ignoret quæ ad morbos cito & tuto curandos vtilia, vel necessaria esse consueuerunt. Porro medicum omnia hæc intelligere oportet, non vt in opus pharmacopœorum euadat (nisi si quando horum desiderio cogatur aliquid huius artis moliri) sed vt componenti pharmacopœo possit non modò adesse, sed etiā præesse. nec huius disciplinæ ignarus quotidie describat simplicia quæ in emplastrum cogi iubeat, cum ex his quiduis potius quàm emplastrū perfici queat, quomodo cum amphora cœpit formari, currente rota cur vceus exit?

Viue, vale lector, siquid scis rectius istis
Candidus imperti: si non, his vtere gratus.

Q

VANQ VAM plurima cum medico habet
cōmunia pharmacopœus, prudentiā natura in-
fitam, medicamentorū absolutam cognitionem,
diligentiam in his omnibus quæ suarū sunt par-
tium maximam, probitatem: tamen non pauca
ipsi propemodum propria videntur, quæ tamen
aliquādo & medicorū fuerunt cum ipsi medica-

mēta parabāt, id quod Galenū fecisse passim scripta ipsius loquun-
tur. Eius generis sunt medicamētorum delectus, ratione & experiē-
tia summa quæsitus: deinde seruādi hæc modus, & tempus quo vi-
gent, aut iam viribus effœta sunt ac exanimata. Item qua ratione v-
numquodque sit vtēdum, siue illud ipsum per se, siue cum alijs co-
quēdo & terēdo, vel alia ratione præparādo. Sit præterea doctus grā-
maticam, vt compositiones veterum, & scripturas medicorum quo-
tidianas intelligat, in quibus siquid interdum hi scripserint largius
aut parcius, aut ingratius quā ægro huic cōpetere coniectet phar-
macopœus, medicum amicē admoneat. Volumus præterea pharma-
copœum artem omnē medicamēta deligendi, præparandi, & com-
ponendi callere, cultu mediocri contentum, hilarem, facetū, diligen-
tem in rem ægrorum: non avarum, nō libidinosum, non ebriosum,
non contentiosum. Quæ iterum illi cum medico sunt communia, vt
Hippocrates docuit libro de medici officio. Quibus animi & corpo-
ris, & fortunæ dotibus si præditus erit pharmacopœus, nihil incon-
sulto medico perito, cuiquam propinabit, præsertim magnarum vi-
rium, sed neque quantūvis paruarū, cum horū vires nesciat: & ple-
runque auxilia, hæc quanuis, vt videtur, imbecilla, tamē quantitate,
qualitate, tempore insalubria, magnorū sæpe morborū sunt occasio,
& legitimam curandi rationem peruertūt, dum sub his curatū cor-
pus remedia iam maiora, sed idonea non feret. Nihil etiā vel amore
vel odio, vel metu, vel pretio, vel ignorantia peccabit. neq; venena,
abortum faciētia, exoleta, adulterina, aut supposititia vnquam exhi-
bebit: sed medicum doctum consulēt quodnam simplex, aut com-
positum illius pœnuria volet substitui. Non augebit medicamēti a-
licuius valentis quantitatem, vt vacuatione hinc largiore sequuta di-
catur medicamenta habere præstantiora. Quam vellem huius æta-
tis pharmacopœos ad hunc se velut canonem conformare, & me-
dicos ad suum. Non esset cur hodie tam neglecta iaceret medicina,

etiam multorum probris lacerata. Deum optimum maximum sup-
plex oro, & obtestor, vt aliquando id studium in mētes medicorum
& pharmacopœorum immittat, vt esse quisque quàm videri aut di-
ci malit optimus, vel medicus, vel pharmacopœus. Quòd si di-
uinam illam gratiam neglexerint, faxit deus vt regia censura
in eos aliquando animaduertatur, qui artem prius ex-
ercent quàm pernouerint hominum corpori tam
salubrem cum recte obitur, tam insalubrem
& perniciosam, cum inscienter tra-
ctatur.

De Medicamentorum simpli-

CIVM DELECTV RITE FACIENDO,

LIBER PRIMVS.



QUOS TRE libros his mēſibus proximis ſum pollicitus ad modum rectē medicamenta componendū pertinentes, præſtare aggredior. Primum ſcilicet, de accurato medicamentorum ſimplicium delectu: Alterum de legitima ipſorum præparatione: Poſtremū, de modo miſcendi medicamēta componi idonea. Quod verò ad primū laborem mihi propoſitum attinet, quanquam rectē à Meſue tradita eſt methodus medicamenta purgātia deligēdi, & quam facile ad alia quocumque medicamenta deligenda transferre poſſit lector non indoctus: tamen paucis viſum mihi eſt eam methodum illuſtrare, & planiorē reddere locis aliquot communibus, à Meſue poſt Dioſcoridem & Galenū obſeruatis, noſtro autem commetario latius effuſis: quanquam & à me non pauca in hanc rem ſunt dicta initio methodi medicamenta componendi: ſed tamen quæ nunc trademus, neq; bis dicta, neq; ocioſa facile intelliges, ſi ea legeris attentius. Delectus itaq; medicamentorū ſimplicium, vt aliarū rerum plurimarū præcipue ſumitur ab ipſorū ſubſtantia, quātitate, qualitate, actione, ſitū, & tēpore. Quædam enim ipſorū præſtantiora ſunt ſi craſſe ſint ſubſtātia, alia tenuis, nōnnulla denſe, alia raræ. Sunt quæ magis leuitas commendet, quæ dā grauitas. Nec deſunt quæ friabilia magis probamus, alia fractū & pulueratū cōtumacia. Adhæc glutinoſa quædam, alia fluxilia. Aſpera item nonnulla præponimus, alia læuia. Poſtremo hæc mollia alijs præſtantiora, illa verò dura iudicamus. Hæc enim propria qualitatū tactilium nomina ſubſtantiæ per ſe incomprehenſibili & indicibili tribuuntur: quòd eius craſſamentum & ex elementis miſtionem primæ ſequuntur, & omnium poſt ſapores (qui etiam ad has referri poſſunt, cum guſtatur quoq; Ariſtoteli & Galeno quidam tactus ſit) maxime demonſtrāt. Ad eandem plenius declarādā non leuiter cōferunt ſinceritas, impuritas, hepatis, ferri, aliarumque rerum nobis notarum, in ſubſtātia ſimilitudo. Præterea ſubſtantiæ triplicis in vnoquoque, ſi obſeruari queat, copia, penuria, mediocritas.

Quid autē hæc nomina qualitatū tactricum medico ſignificēt, licet abunde ſit explicatum libro ſecundo noſtrę methodi medicamenta componendi, hoc loco tamen paucis perſtringere non fuerit alienum.

Craſſum ſeu *παχυμεις*, quod egrē in tenues partes comminui poteſt.

Tenue ſeu *λεπτομεις*, quod facile in partes tenues cōminui poteſt, quod in ſiccis ſignificat in puluerem tenuiſſimum: in liquidis verò, quod prompte latius ſe ſpargit, & corpus quaquauerſum cito imbut, ipſumque velut vanescit, vt aqua vitæ, oleum terebinthine, & 3. oleum ipſum aquæ collatum.

Denſum proprie quod poros, id eſt, meatus paruos per ſe totum habet.

Rarum proprie quod poros per ſe totum habet magnos.

Denſum per metaphorā & abuſiue eſt coactum in ſe, vt aqua, terra. Rarū verò eſt laxū, vt ignis, aer: quanquā hæc elementa ſint vnita, & ex ſimilaribus natura partibus conſtent, nec vllos tales poros habeant.

Graue quod mole exigua pōdus magnum exhibet nobis vel ſtateris, qualia ſunt aquea, terrea præſertim denſa.

Leue quod mole etiā magna pondus exiguū præſtat nobis, vel ſtateris, vt igneū & aereū corpus, præſertim rarum. Aqua autem quæ cito caleſcit aut refrigeratur, Hippocrati leuiſſima dicitur: non tātum proprie vt definiuimus, ſed etiam per abuſum, quod hippochondrijs non ſit grauis, nec in his diu immoretur ob eſſentiæ ſuæ tenuitatem: quæ facit vt cito alteretur, prompte in corpus diſtribuat.

γλωχιν, id eſt, lentū & glutinoſum in ſolidis corporibus quod fractū eſt contumax, humore partes terreas glutinante multo, & tentioni cedente, vt in ſparto, ſalice, corijs, tendonibus, ligamentis, quæ tuſa laeſcunt magis.

Friabile quod prompte friatur, & in puluerem abit, etiā digitorum compreſſu, vt amy-lum, ceruſſa, caphura.

Lentū autem in humidis eſt quicquid egrē diſſolubile adhæret, ſeu quod dum trahitur, aut digito vel alio tollitur, continuatē longiſſimē ſeruat: & non interciſum nec abrup-tum, vt oleum, mel, adipēs, pirituita.

Lib. 10.

ſimpl. ca.

3.

Lib. 2.

ſanit.

tuendę.

Lib. 11.

Meth.

Lib. 7.

Metth. in

Lib. 11. *ῥαπίδιος*, id est, detergens, quod tantū abest vt adhæreat, vt etiā quæ adhærent detergeat.
 Meth. Alibi autem in Methodo, ipsi glutinosi in humidis opponit Galenus fluxile & liquidum. Asperum non solum tactu inæquale, sed etiam gustatu partes inæqualiter siccans, contrahens, humore tertio integens, quale acerbum austerum lene lubricum & æquale. in humidis verò quod linguæ, faucium, asperæ arteriæ, dentium inæqualitatē corrigit, vel replendo, vel modice tergendō, & laxando, quale dulce & vntuosum.

Molle quod cedit nostræ carni: Durū cui cedit nostra caro. De vtroq; plura li. 2. saniti-
 tuendæ, & lib. 5. simpli. cap. 4.

Ad crassum reducitur terreum, lapidosum, arenosum, astringens, opacum, crudum.

Ad tenue, æreum, igneum, coctum, vstum, amarum, acre, perlucidum.

Ad densum, solidum, coactum, compactum, vnitum.

Ad rarum, laxum, fungosum, solutum.

Ad graue, plenum, distictum, & si vis densum, succulentum, bene habitū, probe nutritū.

Ad leue, inane, foraminulentum, fungosum, rugosum, & si vis rarum, exuccum, emaciatum, marcidum.

Ad glutinosum, pingue, gumosum, resinofum, mucosum, tenax, sibi fluendo continuum.

Ad fluxile, liquidum, pinguis, expers.

Ad lene seu lene & politum, vel foris tātum enode, spinis carens, depile. vel etiā intus, æquale, sibi vbique simile, homœomeres, ac similare.

Ad asperū foris, spinis armatū, & his longis, breuibus, rectis, hamatis, hirsutum, lanuginosum, muscosum, capillatum. Vel etiā intus, inæquale sibi, partibus quibuscum dissimile anomœomeres ac dissimile, grumosum.

Ad molle, tenerū, carnosum, succosum, fungosum, mucosum, pingue, lentū, & vitilium corijque modo flexile, humidum.

Ad durum, firmū, osseum, lapidosum lignosum, exuccum, solidum, aridum, friabile, rigidum, inflexile, fractu contumax, vegetum, adamantinum refertur.

Secundo loco cū quantitas sit duplex multitudo & magnitudo, ab vtraque notæ etiam sumuntur: quibus intenti, hoc eligimus, illud reijcimus. Numerus enim singularis dualis, multiplex, vel aliter pluralis, radices, stipites, ramos, folia, flores, fructus, semina, cortices, & reliquas plantarum partes, atque adeo plantas totas, vel optatiores reddit, vel contemptiores ac minus salubres. quod in colocynthide planta & fructu, & alijs quibusdam recte Mesues commemorauit, & in multorū aliorum delectu clarè apparet, tum ex nostris simplicibus, tum ex hoc lib. 1. Pharmacopœciæ.

Magnitudo autē latius patet, non modò quia magis ad deligendum pertinet, sed quia eius nomine interdum sola longitudo venit: vt Aph. vlt. lib. 2. Potest etiam latitudo sola intelligi, vel etiam sola profunditas: nonnunquam longitudo simul & latitudo, vel longitudo & profunditas, vel latitudo & profunditas, vel tria simul: quo significatu ferè accipimus. Huc pertinet quod in horum singulis contrarietas est, ratioque maioris & minoris in infinitum extenditur, & lōgum, breue, latum, angustum, profundum, elatū, symmetrio sui generis collatū, aliud magis & minus alio dicitur, idque paulo vel multo magis vel minus. Et inter hæc contraria, præter dicta, est mediocritas quædam indiuisibilis, alia maioris & minoris ratione diuidua.

Ad huius loci communis vastitatem pertinet nomina mensurarū nobis notarum, digiti, & eius parui, maximi, medij, pollicis, palmi, dodrantis, pedis, cubiti, & aliorū plurimorum. Hinc dicimus deligendum hoc illud vel fugiendum, quod magnum est, enorme, procerum, vastum, corpulentū, bene habitum, exiguum, gracile, strigosum, rugosum, marcidum, (nam hæc etiā quantitatē significat) & item quod est præditū magnitudine digiti, pollicis humani, manus, palmi, dodrantis, pedis, semipedis, dimidij cubiti, cubiti vnus, duorum, trium, quatuor, quinque, seu digitali, pollicari, dodrantali, pedali, semipedali, bipedali, tripedali, cubitali, bicubitali, tricubitali. In quo sermonis genere magnitudo longitudinem potius declarat, quāquam & crassitiem & profunditatem consignificare possit: quarum alterutra dum nobis apertius significanda est, exprimitur, vt humani digiti, parui, indicis, pollicis, cubiti, baculi, vnus, duorum, &c. vel digitali, pollicari, cubitali, &c. crassitie vel longitudine. Id quod in profunditate similiter facimus frequenter, vtrāq; dimensionem crassitie nomine cōprehēdimus, dicētes hoc tūc esse vsui, quādo est crassitie digiti, pollicis, cubiti, baculi. Est quando altitudo quoq; exprimitur, vt protectorū vtrinq; hominis brachiorū altitudine est solanū Dios. & phoenix herba sedigitalis seu senum digitorū.

Eodē modo in contrarijs, paruitate, breuitate, angustia & gracilitate, maioris & minoris ratio exercenda est.

Ex loco enim fertili plantę & animalia auctiora & pulchriora eadunt: eadem ob id vel deligenda vel interdum fugienda. Scillam nanque enormem (qualis terra feraci prouenit) Galenus damnat, improbat & strigofam flaccidamque: bene habitam verò & magnitudine mediocrem commendat.

Qui autē locus cōis in qualitate est, notari ad deligēda medicamēta necessariarum effēcūdisimus. Hinc probamus aut improbam⁹ medicamētū hoc illud calidū, frigidū, humidum, siccū, principio medio fine, ordinis primi, secundi, tertij, quarti. Ad hæc hac vel illa præditi facultate, secūda, tertia, & sapore, odore, colore, has qualitates primas cōsequētib⁹

Saporem quidem vel nullo apparente, seu aqueo & fatuo, vel gustū astringente, seu acerbō austero vel acido vel dulci, vel vniuerso, vel nitroso vel salso, vel amaro vel acri (ad quē feruidus, linguam erodens, causticus, id est, vrens reducitur, vt ad dulcem melleus, suauis, iucundus (vel ex horum quibusdam misto vt vinoso, medicato, vel rei alicuius notę vnicū sapore, & ob id insignē, sed fere inexplicabilē nascit, vt sapore aloes, piperis: hoc illud est præstātius, vel deterius. Sed dū sapore medicamēta exploras, præsertim acria, aromatica, amara, salsa, ne gusta codē tēpore multa, vt nō tibi imponat gustatoria qualitas linguę ab his tradita: quam tamen aqua pura gargarizata, aut papyrus mansa delere putatur.

Odore vero, iucūdo, suauī, bono, ingrato, fædo, retro, acerbō, austero, acido (tot enim sunt differentię odorum quot saporum, sed nominibus non designat) odore item croci, Gal. lib. bituminis, cucumeris, vel alterius cogniti, & odore eximio præditi, sed indicibili, & qui in denat. hō nullā prædictarū differentiā rectē offerri possit. Sic odore vinoso aromatico medicato, minum. illud hos commendante, iucūdo. Hoc illud esse debet, non debet hoc grauius odoratū, alitu terram, hircū, picem, resinā pineā bitumen, olēte, viroso, aspero, est melius vel peius.

Colore deniq; nullo insigni, vel albo pallido, rufo, flauo, rubro, viridi, liuidō, nigro, vel horum medio (vnde hoc illud *ὑπολευκόν ὑπώχρον ὑπόπιρρον ὑπόξανθον* & similia Græcis dicuntur, vt latinis subalbum, suppalidum, subrufum, subflauū vel albicans, pallescēs, rufescēs, flauescens, vel in album pallidum, rufum, flauum inclinās) vel ex horum quibusdam misto, Colorum differētię vnde *λευκῶρον ὠχρόπιρρον, ὠχρόξανθον, πύρροξανθον* & similia Græcis sæpe dicuntur: nobis ex albo & in his pallidum, ex pallido rufum, vel in pallido flauū, ex rufo pallidum, vel pallidum in rufum ordo Gal. & in his libro 1. strius apparet in semotis coloribus quam natura propinquis. hanc verò naturę in coloribus propinquitatem ordo nobis Galenum lib. 1. cris. sequutis seruatus ostēdit. Albo enim Criscon. pallidus vt sitū hic est proximus, sic natura, & alij similiter.

Ad album verò reducitur color lacteus, niueus, fulgore & nitore alabastrī.

Ad pallidum cinereus, plumbeus, buxeus,

Ad rufum melinus. i. mali cydonij, fuluus, rutilus, igneus.

Ad flauum aureus, luteus, croceus diluti aqua croci color.

Ad rubrum, roseus, sanguineus, puniceus, purpureus, vermiculus.

Ad viridem, herbaceus.

Ad liuidū cæruleus, glaucus, cæsius nonnullis dictus, ferrugineus. & interdum cinereus plumbeus, buxeus. hæc enim ambigunt vt in suis in artē medicorū Galeni comentarijs appetē demonstrat Martinus Acacia, medicus longe doctissimus.

Ad nigrū tenebrosus, opacus, terreus, bituminosus, fuliginosus.

A figura quoq; non leuis est ad medicamēti delectum coniectura, quod hæc sint vtenda vel vitanda quę figura sunt eleganti, speciosa, circinata seu rotunda & circulari, trigonia seu triquetra & triangula, quadrata, quadrangula, multangula, mucronata seu acuta, obtusa, recta, obliqua, transversa, solida, fistulosa, spongiosa, multifida. Alia item figura, forma, specie, aspectu, effigie, imagine, modo, ritu oculi, oculi bubuli, capitis taurini, cornu caprinī, caudę scorpionis, pulicis, ricini animalis, vitulinę narīs, cyrriorum polypi piscis, testiculorum canis, vel alterius, capillorum, ligulę, ligulę bubulę, aurium muris, delphini: pennarū auis, geniculata raro, crebro fruticosa, iuncea, tuberosa, bulbosa, fibrosa, capacea, pomi, pyri, cotonei, glandis, oliuę.

Horū autem vel omnium vel plurimorū exempla postea leges frequētissima in particularium delectu, & in notis à similitudine sumendis.

Probantur præterea aut reprobantur nūc similia, nunc dissimilia, vel inter se, & in aliqua plantarum specie, vt absinthium ponticum sit simile fantonico: abrotonum mas, dissimile scemina.

Vel in aliquo genere superiore propinquo sumitur similitudo aut dissimilitudo qualitatum quarundam prædictarum, atque adeo substantiæ & quantitatē, & actionis: vt in

herbarum genere, absinthium seriphium est deligendum simile abrotano, sapore amaro, & foliorum habitu: vel in toto plantarum genere, vt chamædrys, chamæpitys herbæ sunt similes quercui pinui arboribus. Vel in genere diuerso, vt aloë optima sit similis hepatici: ascyri folium cribri modo foraminulentum, ambitu serratum verticæ folium, illud in arcum flectitur. Vel ancoræ modo est, vel crescentis lunæ ritu incuruū, venosum, gibbosum, dorso elato, galeri, petali, pileoli, lanceæ, lanceæ cuspidis, cultelli, securis, acetabuli, vasculi, calathi, dicii, clypeoli, fusi, pali, clauæ, pistilli, iunci, festucarum, fœni, vitilium modo formatum, inflexile, virgatum, velut lineis intersectum. alarum canis binis, pluribus, virgis arborescentibus specie capituli rotundi, verticillorū, pedum lecti, stellarum, tomentosa lanosaque pube obducitur dictamnus. bullæ in dipsaco spinosæ. los comici s perfonis hiantibus similis. radice hoc esse debet crebro geniculata vel gentulius duobus tribus crebris dissecta, tubarum modo in se inuicē infarctis radicibus, stipitibus condylorum modo do tuberculis quibusdam excrecentibus.

Horum nihil negligendū est ei qui probe volet medicamenta simplicia deligere, quibus singulis aliqua ex dictis insunt accommodatissima ad ipsa cognoscenda & deligenda non mediocriter pertinētia, quod exēplis q̄ verbis pluribus probare maius erit operæpretium.

Quarto plantarū & aliorum simplicium medicamentorum defectus sumendus est à situ & loco, nō modo generali & regione, vt castorium sit ponticum, cuminum Aethiopicum, glycyrrhiza cretica: sed etiam à particulari, in singulis regionibus, loco nēpe calido, frigido, humido, siccō, horū medio. Plantæ enim calidæ in locis calidis valentiores euadunt: præhumidæ locis siccioribus castigantur. Quæ ratio in animalibus quoque recipienda est. Sub loco autem & cælum, & flatus ventorum comprehendas oportet. Ob id ad locum calidum reducimus apricum, æstiuum, inter tropicos aut proxime ipsos, in solatum, qui in meridiem sit apertus austro perfletur, montes habeat septentrionibus obiectos, vt Galenus docet in secessu Tabiarum.

Ad frigidū vmbrosus, nemorosus, arboribus sepibus & alijs stirpibus confertus, quercetis, frutetus, dumetis defensus, muscosus, saxosus, montosus, opacus: parietibus, arboribus vel alijs: & item polo alterutri proximis, in parte Alpium aut Pyrenæi Septentrionē spectante situs, niuosus, glacialis, aquis niuosus & glacialibus riguus, borea & aquilonibus perflatus, soli auersus obiectum montium.

Ad humidū, quod in aquis viuit aut versatur, & ipsis dulcibus, salis, fluctibus, torrentibus, pigris, rapidis, stagnantibus, paludosis, paludibus ætate siccatis, lacubus, radicis, sine radice innatans, aut prope aquas easdem & icatebras, fontes, canales, fluuiorū ostia, alueos in conualle aquosa, loco vlginoso, pratibus, puteorum parietibus & muris alijs humentibus, saxis rosidis, stillicidijs, fossis vrbium. Hinc fluuiales, maritime, pratenses, aquaticæ plantæ alijs sui generis alio loco educatis præstantiores sunt vel deteriores pro varia ipsarum natura, & expetita nobis earundem facultate.

Ad siccum, editus, montosus, tumulosus, cliuosus, saxosus, petrosus, scrupulosus, topiaceus, pumicosus, salebrosus, sabulosus, arenosus, argillaceus, præruptus, scopulosus, promontorijs altus, asper, tenuis, sterilis, perflatilis, in semitis, vijs, itineribus, in aggeribus viarum & murorum, in ruinibus, & ruinis, aut circa ruinarum rudera, domos in parietibus, muris, murorum crenis & minis, in tectis recentibus, vetustis. Quanquam horum quædam aliquândo humectata esse possunt, vt petræ litorales, testæ piscium, quibus muscus marinus innascitur.

Ad medium horum seu temperatū reducitur locus regionum temperatarum, vernus, & magna ex parte campestris, planus, pinguis, fecundus, cultus, aruum, in segetibus, tritico, hordeo, leguminibus, vinetis, hortis.

Ad locum item & sitū connexio reducitur & vicinia. Plantæ enim masculicæ & ipsarum fructus sunt innocēiores si multæ simul ex eodē loco venenosam, sed sibi familiārē substantiam trahant, & multi fructus masculici ex vna planta. Ob id thymelæam, colocynthidem, scillam in loco aliquo solam recte damnat Mesues, præfert quæ multas congeneres simul nutritas habet. & colocynthidis fructū si vnic⁹ erit aut paucus improbat, numerosum præfert. Rationabile enim est vt plantas benignas si paucæ sint vberiorē succū benignum trahere, & ob id salubriores esse: sic masculicas venenosam loci malitiā exhaurire, & in se transferrere: quem & largiorem & vehementiorem paucæ quàm multæ in se trahant necesse est. Sublimis quoque situs, infernus, dexter sinister, anticus, posticus quidam est, sic misy chalcitis sori situ diuersa metallica substantiam indicant & facultatem diuersam, & tartarū in summo vase vinario melius quā in lateribus, & cadmia botryitis melior alijs, & pompho-

lyx spodio præstantior: sic densi fructus quia conferti & compressi male nutriuntur, male coquuntur, male dissilantur: contrarij contrà laxi enim & rari partus plantarū, & animalium, vberius alimentum trahunt. ob id meliores sunt si nobis salubre est id alimentum: peiores si insalubre, vt in colocynthide Mesues probè docuit. Et plantarū partes humi repētes re-
ctis alijs meliores, vel contrà: & in orbē circūacta radix, vel altera alteri infidens, vel sibi inuicē implexæ radices, & partes mutuo cōtactu inherētes, dissite, superficiarie, profundę. Cum verò tēperamentum medicamēti vt aliorū sit causa facultatis, & facultas actionis, & actio operis ipsius, vt docet Gal. lib. de facul. natu. & lib. de vsu partiū, quę ex naturali cuiusque potentia, deligendi ratio sumi potest, ea vobis ab ætione tanquam sensu notiore sumitur. Ab ætione igitur facultates, primas, secundas, tertias, quartas consequēte delectus medicamentorum sumitur, estque hæc nota maximarū virium. Quo niā tamen de omni genere harū facultatū nobis abundē est dictū initio lib. 2. nostræ methodi medicamēta cōponendi, necesse non putauī huc ascribere. Harum autē differentiarū & notarū, vel plurimarū, vel omnīū, vel saltem quarundā, in singulis simplicibus medicamētis exempla plurima tibi Dioscorides suppeditabit, non pauca Galenus, & qui post eum de materia medica scripserunt.

Adde quòd vt tota substātia nobis alimentū est familiare, sic plantis suū. quòd fit vt non omnis ferat omnia tellus, nō solum quia calidior, frigidior, humidior, siccior, aut per coniugationē quam ipsius plantæ vel animalis naturæ cōueniat: sed quia in ea alimentū plantæ & animali cognarū desideratur.

Nec tantū hæc in plantis totis, sed ipsarum partibus singulis sunt exploranda, (vt idem de animalibus, & ipsorum partibus, & terreis corporibus tibi persuadeas) quales sunt radices, trunci, caules, culmi, festucæ, rami, virgæ, surculi, germīna, sarmenta, viticulæ, adnata, capreoli, spinæ, cirri, pediculi, folia, flores, fructus, semina, siliquæ, vascula, capitula, calyces, vmbellę, corymbi, comæ, spicę, pappi, ligna, cortices, succi, liquores, lachrymę gummosæ, & resinosæ, & si quę sunt eiusmodi.

Quintò & vltimò tēpus in deligēdo medicamēto multiplex obseruādū est, grās scilicet, pars anni qua collecta sunt & reposita, aeris constitutio serena, pluuia, ventosa, his viuētibus aut repositis, pars diei varia, duratio & seruatio longa, breuis. Quæ alia tēpus indicet diximus lib. 2. nostrę methodi.

Virtus enim alia vt & tēperatura est neophytis & teneris, alia adultis & senescentibus. vis item alia euphorbio recens collecto, atque alia veterato. Plantæ item calidæ, siccæ, si aer sit calidus, siccus, sunt meliores. Ob id plantas Italicas aromaticas Creticis non cedere dicit Galenus, si aere non fuerint pluuio educatæ. In singulis tamen partes deligendæ sunt, omnīū præstantissimæ & maximè medicamentosæ, si his viribus egeat. Est enim quando ignobilioribus & imbecillioribus est opus, ob affectus ægri, aeris naturam. Præstantissimæ verò tum ex prædictis conditionibus, tum ex his quę in singulis particulatim dicendæ sunt coniectantur, ratione eadem quæ in plantis dicta est, in animalibus quoque & corporibus terreis seruata. De tēpore verò collectionis Dioscoridis verba hæc sunt. Imprimis curandū est, vt quæ in vsum reponenda sunt medicamenta, suis tēporibus singula demetantur. Ex hoc enim fit, vt quædam viribus magis valeant, alia sint inefficacia. Primum itaque cælo sereno plantæ legantur. Magni enim refert inter colligendū si vel squa-
lores & siccitates vel imbres infestent, quemadmodum si loca quibus hæc prodeunt sint montana, excelsa, perflata, frigida, sicca. In his enim locis vires habent longē valentiores: contrà verò quæ in campestribus, riguis, opacis, cæterisque locis à vento silentibus, plærunque degenerant, & minus valent viribus, præsertim si non suo tempore legantur, vel vitiatæ, & præ imbecillitate languentia. Ignorandum nanque non est, multa pro solī & celi natura ac temperie citius aut tardius adollescere, nonnulla vi propria, etiā hyeme frondere & florere. Sciendū præterea est, quædam in herbaceis medicamentis, vt veratrum vtrunque multis edurare annis, alia post trimatum inutilia. Quę verò herbę sunt fruticose vt stœchas, trixago, polium, abrotanum, seriphium, abinthium, hyssopum, & alia id genus, dum semine prægnantia sunt, demetenda. Flores verò, antequam sponte suā decidant. Fructus autem dum maturi sunt, vt semina dum siccari cœperūt, priusquam defluant, herbarum & foliorum succos elicies, cum primum cauliculi germinant. Iac & lachrymæ ex-
cipiuntur caule inciso per summum adolēcentiæ vigorem. radices & liquamenta corticesque ad recondendum eximantur, cum primum herbæ suis folijs exuuntur. Si purę sunt & nitidæ, siccantur & reponantur loco non vliginoso: quę autē terreno aut luto sunt fordidæ, aqua prius abluantur. Flores, & omnia iucundū odorē reddentia, arcusiliaceis æ-

dium parte siccissima reponantur. Est quādo chartarū inuolucris & folliculis suis semina vtilius & innocentius seruantur. Liquidis medicamentis densior materia, argentea, vitrea, cornea conuenit: sictilis etiam modo rara nō sit: & lignea, præsertim è buxo: quæ verò vasā oculariis medicamentis, & liquidis, & his omnibus quæ aceto, pice liquida, aut cedria componuntur. Adipem autē & medullas stanineis vasīs, seu plumbo albo recondi conuenit. Hæc Diosc.

Finem labori proposito imponemus, vbi locum Mesuæ, quo quædam medicamenta purgantia cælo & solo simili meliora euadere scribit, sed sine exemplis explicauerimus: sumpta ab animalibus analogia. Nam vt animalium naturæ, hoc est temperaturæ, & ætates, & morbi calidiores ad hyemem, regionem frigidam victus rationem refrigerantem tãquam contrario excessu frigiditas, illorum caliditatem immodicam corrigentia præsidia bene se habent, ad æstatem verò regionem calidam victum calefacientem ceu intemperaturam augentes causas, nales: & contrā naturæ ætates, morbi frigidiores ad æstatem calidam regionem victum calefacientem bene se habent, quod ab his contrarijs illorum tā temperato recessu corrigatur, male verò ad hyemem regionem frigidam victum refrigerantem tanquam affectus illos propter similitudinem aucturas causas, & simili ratione humidiores, sicciore, & sicciore ad humectantes melius habent: sic planè in plantis apparet, quibus vt animalibus instum est alimento familiari nutriri, quibusque vt animalibus consueta victus ratio naturam seruat, si est victus illarum naturæ similis, aut nouam facit si dissimilis. Ob id plantæ intemperiores, id est, calidiores, frigidiores, humidiores, sicciore, solo & cælo & alimento ipsis contrario emendantur, & ad temperatam mediam, quoad fieri potest, inclinant: nisi quas multum calidas frigiditas humiditas siccas expetimus. tales enim solum & cælum & alimentum simile conseruant: mirum nō etiam intendant. Quæ verò animalium temperatura est omnium extremorum media, intuitijsque omnibus omnium maxime resistit, illa similibus temperatis seruatur. quod Galenus dilucide lib. prioribus sanitatis tuendæ demonstrauit. Sic plantæ temperatæ cælo & solo temperato conseruatæ, meliores euadunt: nisi ad effecta alia has calidiores, frigidiores, humidiores, sicciore requiris. Tūc enim solo & cælo dissimili, & à sua natura temperata diuerso, hoc est, calidiores si calidiores, si frigidiores, si frigidiores si frigidiores, si humidiores si sicciore, si sicciore expetis, emendantur: & calidæ siccæ calido sicco solo & cælo. Ob id Creticas plantas plurimas ad thiriacam, & alia medicamenta, & Italicas si solum & cælum sicca fuerint, præponit Galenus. tamē in his est quadam prodire tenus, sed non datur vltra. Nam eadem ex India aut Aethiopia fuerint deteriores, licet illi tradunt plantas quasdam habeant eximias, vt Aethiopia cuminū, Trogloditæ myrrhæ, India nardū & malabathrū, & alia plurima, quæ inde largo prouectu Lusitani nauigationib⁹ ad nos cōuehūt. Quæ igitur ad methodum simplicia deligendi pertinent, vbi ex locis prius dictis memoria tenebis, eandē in particularibus ipsis exercere oportet, ordine illo quē in simplicibus seruauimus. De radicibus itaque delectu primum dicamus, in quibus vt alijs plantarū partibus, propterea quod nostrates communem quandam deligendi rationem sustinent, de his etiam cōmuniter scribemus: de exoticis verò singulatim, tum quod hæ sunt cariore, & ob id ab exteris adulterari solite: tum quod hæ quia infrequentes magis, etiam exercitatos fallunt.

Tempus colligēdi

Radices autē omnes incipiente foliorū defluuio legendas, & cælo sereno, censuit Dioscorides, cui in quibuscūq; Galenus & Auicēna & Mesues cōsentiant, in alijs diuersa sentiunt, vt post leges. Sunt contra quibus placet magis, radices esse legendas priusquā in caulem, folia, florem, fructum, semen, vis plantæ propē tota erumpat. Defluentibus autem folijs eas esse scitis animalibus similes, hoc est, velut semianimes ac multum imbecillas, nisi siquæ tantum habebant virum, vt etiam earū satis retineant arefacto caule, vt scilla. quomodo valida animalia etiam sceta adhuc robusta permanent: nisi dicas etiam in illis quæ viua & veteri radice repullulant, saluam vitalem plantæ velut sanguinē per caulem priusquam arefacta in radices, licet nō totum, refluere, vt in arboribus fit, alio quouis tempore colligi possunt, quæ hominum cultu & satione crebra in omnem anni partem vegete incidunt. quales ferē sunt hortenses, alimentosæ, vt apij vulgaris, buglossi vtriusque, betæ, lactucæ, intybi, oxalydis, raphani, napi, pastinacæ, sisari, cari panacis, cæpe, porri, allij: & præter hæ erraticæ, dauci, gingidij, caualidis, ari, dracunculi, cyclamini, periclymeni, cotyledonis: nā hæ quinque, vt bulbosæ quædam aliæ etiam ætate siccatis folijs, plenæ sunt, & frequenter autumnō regerminant, alimenti pinguis & crassī copia.

Quæ verò solius naturæ sponte crescunt, aut semel à nobis tempestiue seruntur aut plan-

cantur, fere sunt optimæ, solo aut vere aut (vt dixi) autumno, paucissimè æstatè, aut hyeme. Quin & hæc quas multis anni partibus communes diximus, sunt præstantiores cum tempestiue satæ adoleuerunt, & vident: alijs verò temporibus ignauiores, quando vt quadam & holitoris opera & irrigatione coguntur adolefcere, sub cælo sibi parum propitio: quale æstium est, ac autumale, & hyemale. Sic vere ipso, quâdo primum germinare incipiunt, nobis leguntur in annum, enula, althæa iris, acorus, symphytum, ruscus, asparagus, petroselinum, apium, feniculus, bryonia, cyperus, rubia, saxifraga, valeriana, eryngij, tormentilla, pæonia vtraque, polypodium, gramen, lilium: nisi recentibus aliquando sit opus, sed quæ omnino erunt imbecilliores, quam si quo tempore recentes colligi debent in vsum venissent. Omnes tamè integræ sunt, si fieri potest, vellendæ, & vnaquæque in solo & cælo suæ naturæ familiari, quod experientia confirmat. Nam tunc bene habitæ sunt, nec enormes ob alimentî copiam: nec strigose, & marcidæ, & tenues & rugosæ ob eiusdem inopiam. Mox aqua lauandæ sunt, & radiculæ purgandæ, multæ etiam elignandæ: quædam verò crassæ & magnæ etiam in taleolâ secandæ, post hæc siccandæ in sole, vêtio, interdum igni, vt in siccatio- ne lib. 2. dicemus, nisi recentes sint vtendæ. Igni autè præcipue siccantur, quando cælum est nubilum, aut hyems, aut quando mox siccatis opus est. Adde, quod in his & alijs plantarum partibus non solum tempus colligendi legitimum est obseruandû, quale multis radicibus est plenilunium natura humidissimum, sed etiam repositio commoda & duratio. Non enim sunt reponendæ nisi exquisitè siccæ, ne putrescât: nec loco humido, puluerulento, non persiato reponendæ.

Radices supra tres annos nō seruâtur Auicennæ. Quæ enim crassæ & densæ substantiæ sunt tandiu seruari possunt, vt radix bryoniæ, rha pōtici, peucedani, mei, aristolochiæ. Quæ verò tenui & rara constant substantia, vt asari, apij, petroselinî, saxifragiæ, dictamnî, tormentillæ, quotannis sunt mutandæ. Radices autem legendas cum folia cadunt, etiam censet Auic. canone 2. & Platearius in Aristolochia. Quædam tamen alijs temporibus saladi- nō leguntur, vt veris fine, aut æstatis initio, acorus, gentiana: aut mense augusto quando etiam spina alba vulgo bedegar, ruscus, bryonia, cyperus, iuis, enula campana, dictamnus vulgaris, pæonia, glycyrrhiza, vt septembri peucedanum.

Octobri cyclaminus, recens & siccus efficax.

Decembri eryngium ipsidem leguntur.

Efficaces autem illi quoque seruantur annum vnum, pæonia vtraque, peucedanum.

Duos, meum, iris, cyperus, maior & minor dictamnus.

Tres, acorus, chelidonium, enula, saxifraga, valeriana, pyrethrum.

Decem costus, cenanthe, rhaponticum.

Daucus autem asarum, & aliæ radices multæ recentes sunt meliores: recôdita autem prope omnia quia sunt essentia tenuis parum diu seruantur efficacia, præsertim puluerata.

Asari radix ampla, spissâ, odore tenui, sapore acri, & parum astringente.

Eryngij radix eligenda ampla alba tenera, quæ condiatur.

Radix satyrij plena & recens, non flaccida & emortua ad diasatyrium.

EXOTICÆ verò radices sic deligantur.

Acori radix similis ireos radici .i. complicata in obliquum, geniculis intercepta, candida, gustu acri, & modice amaro, odore iucundo, calida, sicca ordine tertio, densa, plena, carie nō exesa, qualis à Colchide & Galatia affertur: quæ à quibusdam galanga maior vocatur, quod sit vtraque crebro geniculata & odore aromatico: sed hæc iridis magnitudine, illa cyperi.

Vulgaris acorus huic diuersissimus tota sua natura, non vsurpandus, nisi medicus ad refrigerandum & siccandum imperauerit. Quod si qua huius generis in locis siccioribus educata & calidioribus naturam acori prædictâ aliquid inderit, vtraque acorus esto, ille indicus, hic nostras imbecillior.

Agaricus foemininus rectis intus venarum discursibus constas, sapore initio dulci, mox amaro, tandem etiam subacri & subastringente, liuior, rarior, mollior, albius, breuior, friabilior, splêdidior quâ mas, in fracturis suis, filiosus neruorû modo .i. grauis, densus, durus, niger, lignosus, longus, interdum rotundus, sed vbique compactior & obscurior, superficie nō densa, sed rara, tota foemininus præterea, sede vero & radice semiuliginosa & semiputrigignitur in Agaria Sarmatiæ regione, & inde appellatur: hodie ex alpihus metitur.

Hæc autè *irigavisa*, id est, superficies seu facies summa, seu cū Mesue pars superior, quauis tota vndique superficies intelligi possit, tamè quæ pro situ in arbore vario est agarici pars superior, vti à Mesue rectissimè dicitur, ea potior videtur, quia magis acra, & ob id leuior

Mesues
in simpl.
Idè initio Anti-
Ibidem.
Diose.

Diosc. gal.
Mesues.

rarior, &c. cum aerem ob insitam leuitatem sursum feratur, vt in eodem tertenum & aqueum deorsum: siue autem ea pars superior sola, siue etiã tota eius superficies optima est, non est nobis purgantibus agaricum excidenda & abijcienda quorundam more. Nec ita superficiem ad vium intellige, vt sola velut cuticula sit vtilis, sed ille partes quæ sub sunt quo ipsi optimæ sunt propiores, eo meliores.

Aristolochiæ clematidis longa radix nobis est persæpe quæ, lōga, rara, rotūdē vērō in agro Nemaufensi plurima, etiam hic crebrescit. Effodiēda est mēsisibus & desquamato terreno seruanda. Legēdā vtrāque plenilunio, vt alias propē omnes quidam contendunt: sic enim pleniores cum sint, siccando minus flaccescunt, alio tempore lectis magna sui parte siccando vaporantibus, & marcescentibus. Eligenda vtraque bene habita, & si est sicca, minus alte rugis striata, carne multa, firma, odore & sapore vegeto, sed suo, nō puluerulenta dum frangitur, nec situ obruta, nec carie aut teredinibus exesa. Quæ bonitatis notæ reliquis propē plantarū partibus sunt cōmunes. Pontica autē & Cretica est præstantior. Behen accipiantur Armenia, calida, humida, odora, rubra potius quàm alba: quæ verò hodie in Italia & Prouincia inodora reperiuntur radices, & pro behen supponuntur, vel alię sunt ab Armenijs, vel saltem his minus efficaces. Harū loco placerēt magis radices eryngij, Behen rubrum folio lapathi rotundi prope Burdegalam locis aquosis plurimū, ac inde in alias Gallię partes transportatur: album in Prouincia crebrius.

Serapio
Manard

Diof.
Gal.

Hor. Ma-
nardi.

Diof.
Gal.

Ibidem.

Mef.

Serapio.

Diof.

Mefues.

Diof.

Bryoniæ radix foris cineritia, intus albicans, ampla, cōsummata, colligatur veris initio. Calamus aromaticus, calidus siccus, ordine secūdo, partiū nō nihil tenuium, fuluus, intus albicans, odore fragrantissimo, densē genicularatus arūdinis modo, cetera mollis tactu, lentus in frangendo, cōfracti autem in assulas dissilit, nō totum raphani modo rumpitur, fistula intus plena arancorum, casij gustu, leuiter astringens, & cum quadam, sed minima acrimonia amarus, in mādendo glutinosus, ex India desertur, teredinibus facile tentatur. Qui verò in officinis, est nō calamus, sed radix est, neq; ea calami, sed plātē alterius: neque ex India videtur afferri, quia vili venditur, & sæpē recens multum cernitur. Ob id inter radices eū recensui, iustius inter ligna locandū: si verus habeatur, triennio seruatur. Centaurij magni radix, acris, astringens, subdulcis, subamara, rubescēs, crassa, grauis, solida, tripedalis (si integra est) succo p̄gnans dum recens est ex solo pingui & aprico Lyciæ, Peloponesi, & aliarum multarum regionum, annos decem seruatur. Radix autem centaurij parui, medicamentis est inefficax.

Costus subamarus, modicē astringit, acer aded & calidus vt vlceret, cādīdus, leuis, eximia odoris gratia, recens, abunde plenus, densus, siccus, à teredinibus non exesus, Arabicus. Post hūc indicus, tertius in bonitate Syriacus, grauis, colore buxeus, odore feriens. hodie Lugduni frequens est Arabicus, non tamen quē Arabici scriptores dulcem & amarum soli inuexerunt. Costi nigri mentio fit Diof. in rha pontico.

Dracunculi radix legenda vere, aut æstatis initio, ampla, completa ex loco libero, hæc etiam nostras est, raro externa huc conuehitur.

Dictāni radix Dioscoridi calefacit, alijs folia magis celebrantur calida, odorata, rotunda, parua, densa, lanugine vtriusque intecta. Cretica metitur æstate & autumno. Quæ verò radix dictamini ab officinis supponitur alba, tenuis, elignata, propē inodora, minimū amara, nullo exiguoque caloris sensu pseudodictamini fuerit porius aut herbæ nescio cuius qua abiecta, potius pulegio vtendum est.

Doronici, radix parua, foris subflaua, intus alba, dulcis, calamo aromatico similis colore & figura.

Elleborus albus radicibus nititur multis, tenuibus, ab oblōgo & exiguo capite exeuntibus, cæparum modo fibratis. optime sunt candidæ, friabiles, carnosæ, medioeriter extentæ, nec iuncti modo mucronatæ, nec in frangendo puluerem emittētes: sunt quæ medulla tenui, gustu feruente, nec tamen id vehementer, nec saluam subinde ciens. Quæ enim confertim eam contrahunt, stranguant. Laudantur ex montibus & asperis, Cyrenaicæ, Galaticæ verò & Cappadociæ & Italiæ sunt periculosiores. Omnis albus est periculosus Mesuæ, non item Græcis authoribus. Eidem minus acer & mordax, nec statim initio albus quam niger, sed amarior est ac diutius seruari potest quā niger, cetera nigro similis.

Cortex radicum fibrosarum, asari colore, fractu facilis medijs crassi tenuis, antiqui recentis grauis & leuis, aut potius leuior quam grauior, legitur vere & æstate Mef.

Elleborus niger radicibus cohæret nigris tenuibus à capitulo capē simili, cōfibratis, vt albus, quarum est v̄sus. Optimæ sunt corpulente, plene, in quibus sit tenuis medulla, acres gustu & feruentes in collibus, asperis & frigentibus locis, vt Anticyra, Helicone, Parna-

fo, Aetolia. Addit Mesues fragiles, leues, asperitatisque expertes, lauiore quā grauiore, tenuium & crassarum, recentium & vetularum medias. Salubrior est albo, colligitur vere & aestate. Mesues.

Esule minoris radice cortex eligendus, tenuis, leuis, fractu facilis, rubelcens casie fistulae modo post sex à collectu menses, ex loco libero collecta initio veris. In fine veris, autē lac eius colligendum est.

Galanga est radix sublubra, vel rufa, geniculata, intorta, grauis, sapore acerrimo, linguā admodum vellicante, calida sicca gradu tertio, odore & signa quadam cypri. Vnde quibusdam cyperus Babylonicus dicitur, indicta priscis, alba, odoris & saporis gratia carēs. puluerabilis multum abijcienda.

Gentiana notis tantum communibus nititur, ex Iura monte in Gallias totas distribuitur, eolore foris buxoe, intus crocātē, amarissima (ob id aloec Gallica dicitur) dura, parum rugosa, fragili contumax. In hortos Parrhisienses translata, minus efficax adolefcit. Aëuarius Serapio.

Glycyrrhiza quannis in Gallijs passim luxuriat, laudatur tamen Galeno magis Cretica, aut saltem Hispanica, vel ex locis alijs minus humidis: colore est foris buxoe, ligno lento & fractu contumaci, intus multum croceo, sitimque mansa extinguente, sapore subacervo, dulci. quibusdam melior est nigricans & lenta, quā buxoe & fragilis. Improbatur intus alba vel nigra, exucca, vetus, fragilis raphani modo, & inter frangendum puluerem edens: quae nota in omni parte plantae, si praeter naturam adest, vetustatem prodit. Diosc.

Hermodylus Mesue probatur radice rotunda, ampla, foris & intus multū alba, mediocriter dura, ex loco edito lecta, calida & sicca initio gradus secundū: laxa verò, rara, leuis, est imbecilla: rubra & nigra, mala. Quae in officinis est, affirmatur mihi ab his qui legerunt frequenter in Gallia Narbonensi & Prouincia, esse folio nigro, porraceo, flore per autumnum croci sine croco tamen, foris nigra radice: quae res declarat esse colchicum innoxium, tamen aut saltem innocentius experimur forte: quia siccatum est, nisi recens nobis usurpatur.

Iris illyrica veteribus propē sola laudatur. parua, densa, frangi contumax, subrufa, intus albior, amara, sternutamenta dum tunditur eiens, odorata. Florentina tamen sola nobis hodie inculcatur, cum Gallica alba purgata laudetur Galeno lib. 8. c. ph. part. Ex locis apricis & siccioribus Illyridis lecta ad me missa Venetijs à Martino Gregorio medico praestantissimo, in horti mei partem editam, & soli meridiano apertam translata, iam pulchre repullulat. Mesuae verò laudatur radix ampla, dura, densa, velut in nodos breues collecta, ex albo rubescens, odore violae nigrae, aromatico sapore, acri & mordaci, flore purpureo potius quā albo, veris initio collecta.

Nardi spica cum radice dodrantali, digiti parui crassitudine, astringente, subacri & leuiter amara, odorata, calida primo excessu, sicca secundo. Mihi Lugduno delata est à Ioanne Horneo Parisijs Pharmacopoeo löge peritissimo, & fidissimo, latine doctissimo, Graece & Hebraice mediocriter instituto, cum costo, acoro, & alijs non paucis.

Pyrethrum radice est longa, pollicari crassitudine, gustu seruidissimo & igneo, à quo non habet, quae mansa pituitam largam elicit. Diosc.

Polypodium radice dulci, austerā, digiti parui magnitudine, multum siccatē, sed sine morfu, probatur subdulce, subausterum, gustatu ad postremum subamaro, & non nihil aromatico, solidum, cirris seu nodis plenum, ex rubro nigrescens, colore intus herbaceo pistacij modo, recens quercuum & arborum aliarum glandiferarū truncis innatum: alijs murale & saxosum magis probatur, nisi loca sint vliginosa & vmbrosa. Diosc. Gal. Mesues.

Rha ponticum radix nigra, costo nigro foris, centaureo magno intus similis, sed minor, ruffior, fungosa & laxa, aliquantum leuis, sine odore, quae mansa colorem reddit pallidum, ad erocum inclinantem, terebinibus non exesa. Diosc. In quo praeter haec legit Serapio, astringens, si plusculum mandatur, subacris, &c.

Rha indicum & proximum ipsi rha barbarum, laudatur subnigrum in rubrum inclinans, graue pro raritate sua: contrafractum, ex rufo & glauco alternat, & croci modo tingit, recens, non adulteratum, astringens, amarum cholagigū calidum siccum ordine secundo. seruatur annis tribus, quatuor in psyllio milio, vel oblitum cera sola, vel ea cum terebinthina. Rauled sceni Mesue dicitur Gal. anti. lib. 1.

Scilla sit bonae magnitudinis (non tamen admodum magna & enormis) bene habita & nutrita, alba, recens ex terra sumpta, cum folia eius & caulis exaeste aruerint, seu quando triticum metunt, quia tunc potissimum viget. Huic pancratium simile gustu & viribus, sed imbecillius. Mesuae praefertur, quae sapore est dulci, acri, amaro, squammis delibrata, splendens ex loco libero prope alias educata. Gal. lib. 8. simpl.

Turbith Arabibus laudatur, cortex albus, gummosus lactis crassitie, vacuus, arundinaceus, fractu facilis, recens, foris autem cineritius & planus, ex locis siccioribus.

Mesues

Zingiberis radix sit candida, odorata, piperis sapore & viribus, nisi quod tardius calefacit: sed diutius, ut longum piper. Damnatur teredinibus exesum, puluerulentum, testorio quouis circumlitum ad pondus & magis ad exesionem tegendam. Terrâ meritam & columbinâ quod vocant male zingiberis loco supponunt, quoties pulvere eius est opus, licet pondere, colore, & reliqua natura radices sint diuerse.

Zedoaria radix aristolochiæ rotundæ æmula sapore, & colore zingiberis, calida sicca gradu secundo, eadem Serapioni dicitur zurumbeth: sed zurumbet sine, h, radix est diuersa.

HERBARYM DELECTVS.

HERBÆ propè omnes sunt nostrates, quanquā harū quædam ex alijs regionibus sunt meliores, ut absinthium ponticum, chamædrys, chamæpitys, scordium, Cretica chamædrys, campestris potius quam suburbana, calaminthe montana melior quæ domestica: tamen si nostrū hoc solum & cælum habeant persimile externo, vires quoque non ita dissimiles fortiantur, qua ratione plantas Italas Creticis non multum cedere scribit Gal. si pluuiū nō fuerit cælum, & herbæ acres digeranturque, quæ humores prauos afflictis partibus infixos vehementer digererēt, ex siccis & maritimis locis eligantur, in ampl. *δὲ βότρυς* initio lib. 6. c. p. sius.

Porrò ex herbis plurimæ solum virides in vsum recipiuntur, dum hæ vel harum succi in syrupos coquantur, & in apozemata, clysteras, forus, cataplasmata, & alia id genus in quos vsus postremos quouis tempore leguntur: in syrupos autem, vel formam aliam toto anno seruandam sunt legendæ, quando sunt efficacissimæ, cum scilicet florent aut etiam semine iam plenæ sunt ut fumaría, calaminthe, & aliæ ex sequentib⁹, in syrupos, vel alia composita diu seruanda recipi solitæ. Nam fumaría florentem veris initio, semine autē plenam veris fine legit Mesues.

Quod si herbæ nec caulem, nec florem, nec semen edunt, ut adiantum omne, asplenium, legendæ in foliorū vigore: quando foliis maxime & virentissima sunt. quædam verò dum florent, aut sementescunt, quia lignosæ sunt, & exuccæ: ante id tempus in vsum trahuntur, ut beta, brassica, cichorium, chodrilla, eupatorium, lappatha, plantagines, verbascum, verbenaca. In quo virium vigore etiam sunt colligendæ, quæ succantur, & in vsus medicorum varios anno etiā toto seruantur, ut absinthium omne, adiantum omne nobis (quibus enim abundat virens & virens vsurpatur) anethi coma, betonica, carduus benedictus, cichorium, centaurium parvū, calaminthe, mentha, chamædrys, chamæpitys, eupatorium, eufragia, fumaría, hyssopi coma, marubium, maiorana, origanum, polium, pulegium, ruta, rosmaris, salvia (licet hæ duæ etiam sine floribus sint efficaces) scordium, splenium, thymum, thymbra, verbascum: aut saltem cum vigent folia magnitudine, odore, colore, præsertim quæ cacumini sunt propiora. Absinthium autem vere legit Mesues, ad succū & aquam inde stilladā. flores eiusdem æstatis initio, hic autem æstatis fine, vel etiam autumno. Eupatorium quoque legitur, & ex eo succus exprimitur in fine veris Mesue. Siccantur autem in vmbra magis, nisi quæ sunt caule crassiore, aut folio humidiorē, & ob id apto putrescere. Vbi probè sunt siccate, reponuntur, ut radices, sed minus diu seruari possunt, ob id quotannis mutandæ.

Adiantum omne eligit Mesues bene habitum, virentibus folijs: quod autem gracile est immodice, & folio flauescente exanimatum est.

FLORVM DELECTVS.

FLORES ut plantarum partes reliquæ legantur cum maximè vigent, cælo sereno, non autem ut Bulcasis & indocti alij scribunt hoc vel illo mense. nam quibusdam regionibus & cæli constitutionibus celerius aut tardius plantarū partes perficiuntur, ut capparís in gemma, rosa expandi coepit legatur, reliqui ferè aperti: sed haud ita pridè, & ex quibus vis nondū exhalauit, nec folia tenentur, & sint decidua. Siccantur sole vel aere calido, magis, minus, pro varia ipsorum natura. Quidam siccandos volunt, donec ex ponderibus decem vnicū super sit, minus autē ex mōtanis floribus quæ ex campestribus minuitur. Reponuntur ut alia, quotannis mutantur, quāuis sphencanthū etiam decennium seruari possit: chamæmelum item diu vegetum est, ob fortem partium suarum missionem. Quam virium cōstantiam etiam tum validus odor demonstrat. Flores absinthij, chamædrys, chamæpitys, hyssopi, anethi, eufragiæ, fumaríæ, maioranæ, origani, roris marini, saluiæ, thymi, verbasci in herbis ipsis commemorati sunt, reliqui nunc dicuntur.

Balaustium flos sylvestris punicæ, cytino flore satiuæ punicæ est astringentior, præsertim

quod ex acerbis puniceis est. Vterq; hic flos punice, est ab arbore auellendus quo loco tunc gratum nullū gignetur. Nam qui cecidit, sæpè id illi ob alimentī inopiam, auferente & protrudente fructu cōtingit, aut ob vermiculū, aut aliam causam: ob id infirmior est, qualis agnoscitur facile: quia vna parte nigricat, foliolūque capillamentorum ipsis non hæret, vt in eo quē auulseris, qui præterea in vmbilico ipso, vt foris rubet. Hispana, rosæ modo lata, & brevia præstantiora sunt Narbonensibus longis angustis.

Caryophyllum laudatur, frangi contumax, odoratum, ex plano tumidulum, recens, quod vnguibus compressum humorem quandam remittit, acris, & aromaticum, calidum siccum gratū secundo, aut etiā tertio. Annos quinque seruari potest, loco temperato: nam in humidiorē putrefcit, ficiore arefcit, & rugosius euadit ac imbecilli⁹, vt quod in eo est enormius, quod barbari antophyllum vocant, interpretanturque antefolium natū, vt vox sit illis composita ex latina præpositione, & Græco *ἀντι* folium.

Crocus Dioscoridi optimus ad medicamēta, Corycius, recens, oblongus, integer, plenus, non fragilis, flauissimus, & qui cum humore tritus, suo colore manus saturat, nec situm nec cariem redolens, subacer. Galeno autem Corycius, à Coryco antro in quo nascitur, licet alijs sit procerior, non tamen alijs robore odoris aut diurnitate est præstantior. Eligendus verò est non procerior, sed odoratissimus & flauissimus, & longo tempore in vigore suo persistens. Præstantissimū igitur aliquē crocū apto quodam ædium loco repositū obserua sæpè, vt pernoscas. Nam id colorem odoremque pristinum diu seruabit: adulterati verò odor & color cito vanescit. Hæc Galenus.

Centaurij parui flores ex pallido flauos initio ætatis legit Mesues. Nostrates autem sunt purpurascētes.

Epithymum Arabum seu thymi casutha amplexicaulis, cum ramulis thymi lecta minus citò marcescit, & à thymo esse non herbis alijs congeneribus certitur. Sic flores ceteros & fructus cum ramis legendos Galenus docuit. Ex thymo autem montano, est præstantius quàm ex hortensū. Cretensē rusum præfertur à Mesue.

Epithymum Græcorum quid reuera sit, nondum planè compertum habemus, nisi sit flos saturæ, Picardæ vulgo dictæ, perpetuò virentis.

Hyssopus colligenda Mesue quando incipit florere.

Nymphææ flos tam albus ex stagnis, quam luteus ex fluuijs, vere legitur, cum apertus est: siccaturque luteus ob paruitatē, integer, albus, conspurcatis aliquot externis folijs purgatus, & cauliculo capillamentisque crocatis. Luteus verò fere hic in aquam etiam cum albo distillatur, raro siccatus seruatur. Narbonenses alba sola vtuntur.

Rosæ sunt præstantissimæ quæ longè omnium suauissimæ sunt, & alijs rubicundiores, quales ex montanis non autem conuallibus leguntur, siccandē loco sublimi meridiano, quo solis radij penetrerent, rosas tamen non tangant. Nam albæ, incarnatæ, inoscatæ, quauis recentes odoratissimæ sint, tamen siccate sunt in odore: rubræ contrā recentes parum odoris reddunt, siccate iucundissimæ & diurnissimæ iaculantur. Ex agro mōtoso petroso Pruni vrbis, vnus diei itinere à Parrhisia distitæ, in vniuersam propè Galliam omnium præstantissimæ cōuehuntur, in territorio tamen Parrhisino non insuauis præsertim vico cui fons Naiadū nomen etiam vulgo est, larga manu luxuriant sabulosis vinetis, quæ Vrbi toti satis esset possint, vt Pestanas & alias prisca celebratas rosas nō desideremus. Rubras admodum folijs paucis & planis præditas præfert Mesues. Rosæ tardius collectæ parū diu seruantur, & cito nigrescūt tēpestiue lectæ biennio seruantur, cū igitur mediocriter sunt apertæ, mox integræ insolētur sæpè mouedæ deinde folia auulsa vasē terreo claudātur, ne odor aut color pereat. Si quo die sunt lectæ sol nō luceat, raræ disponantur, ne se corrumpant densatæ. Similiter alij flores siccantur.

Schoenanthū seu schœnu anthos ex Arabia rarissime huc ad nos transferuntur eius iunctantum calami, si deferantur flores, solo odoratus vigore deligantur. Nam odoris illius gratia cito vanescit. Gal. lib. i. antidotorum.

Stœchas etiam exotica est, ex Creta enim habitior & melius nutrita, ob id melior. Petitur, multa tamen nobis domestica ex insulis stœchadibus Masiæ assidentibus, à quibus & nomen ipsa est sortita. Prouenit etiam multa in Arabia, vnde Arabica cognominatur, & à Mesue præfertur, flore præsertim, post folijs: sit amara modicè astringens: spica ex purpureo cærulea, odorata.

Stœchas verò citrea seu flaua Dioscoridis heliochrysum, & Galeni amaranthus coma floris aurea, densa: in Gallia Narbonēsi & Aquitania, agro Burdegalensī plurima & præstantissima gignitur, odore abrotani maris, & etiam sapore, sed minus amaro.

Viola nigra vulgo martia & quadragesimalis, à Mesue laudatur quæ prima floruit, Mes.

Lib. i. Antid.

Gal. lib. i. Antid.

IACOBI SYLVII MEDICIS

neque vim suam calore solis resolutam perdidit, nec pluvia obtudit vel diluit & dissipauit. Quæ iam diu aperta est, aut pluuiam sensit, aut in syluestribus nascitur, odoris gratia carer, ac vinibus.

Flores vix annum seruari possunt efficaces, præter chamæmelum, stæchadem, crocum, & alios paucos, qui annis post duobus aut tribus coloris & odoris gratiam retinent.

DE SEMINIBVS.

SEMEN à fructu quantum differat, abunde in nostræ methodi lib. i. docuimus. Semina verò deligantur matura omnia, bene habita, plena, & corpulenta, & quæ naturæ suæ vires proprias habeant efficacissimas, & odorem, saporem, colorem sui generis perfectissimum, si odoris, saporis est particeps. Multa enim sunt inodora & insipida non modo seminum sed aliarum quoque partium genera. Sine præterea, si fieri potest, delata ex regionibus, in quibus celebratissima crescunt maiorum nostrorum testimonio. Sintque recentia, aut his proxima. Quæ enim diutissime fuerunt reposita & alia, vires habent imbecilliores. Vbi autem pulvis ab ipsis diuidendo excidit, terraminum excesserunt. lib. i. alimentorum.

Amomum candidum vel fuluum, simplici tamen colore non vario, laxius in vna parua seminis tamen plena, diffusum, non alitius coherens. sit præterea odoratum, nares vulneras, acre, mordax recens, non cariosum. Amomum Scythicum laudatur lib. 8. cō. phi.

Ami Illyricum vel Aegyptium.

Anisum Creticum.

Cuminum Aethiopicum, deinde Aegyptium.

Ligusticum ex Ligusticis alpinis vnde illi nomen.

Seseli Masiense, alterum Aethiopicum, tertium Creticum Dioscoridi laudatur.

Sinapi Alexandrinum.

Thlaspi Cappadocium vel Creticum, sed maius & minus rotundum est præstantius Galeno. Vtrumque nobis est à Bursa pastoris herba frigida astringente, diuersum.

Diose.

Cardamomum eligi debet frangenti contumax, oclusum, plenum, farctumque, gustu acre amarumque, odore caput tentans, exaltans. quod tale non est, exolerum iudicatur. Hæc Dioscoridi. Nigrum palsim cognominatur Galeno, Nasturcio minus calidum, sed suauius & fragrantius eidem dicitur. An verò semen quod hodie noster Ioannes Horneus Lugduno aduexit, minus & planius grano paradisi, colore & sapore propè eodem, in siliqua breui triquetraque largissimum, sit verum cardamomum, affirmare non ausim ob historiam ipsius obsecuram breuitatem: tamen ipsum tum granum paradisi & quod cardamomum minus vocant & proferunt officinæ, semina sunt non indigna recipi in antidota, ob virtum in ipsis aromaticarum excellentiam.

Cenici semen sit amplum, plenum, medulla pingui, album, angulosum, læue Mesopysyllium eligit Mesues absolurum, amplum, tam graue ut aqua mergatur.

FRUCTVVM DELECTVS.

X FRUCTIBVS quanquam non pauci nostrates in medicamenta recipiuntur: quia tamen externi quidam præstantiores habentur, ipsorum quoque bonitatis notas paucis attingere fuerit operæ precium.

E Amygdalæ tam dulces quàm amaræ, probantur flauissimæ, plenæ, integræ, non contractæ, nec erosæ, tamè leues, duræ & siccæ quantum illis datū est, ob id fragiles, intus albissimæ. Ex his dulces, sapore delicate, prope indicibili in castaneam tostam & panis purissimi bene cocti qualitatem inclinantes: odore cante esum nullo aut perquam exiguo, inter edendum autem iucundo.

Improbantur albescentes, nigrescentes, rugosæ molles, tortiles, fractu contumaces, & quæ fractæ à candore illo ad pallorem recesserunt, aut nigrorem, oleosæ, natura aut vetustate odore rancido, sapore ingrato aut oleagino: quem omnibus vetustas affert. Ex quibus tritis etiam plus olei exprimatur, tamen olei amygdalini probatissimi dotes non assequitur, quod ex prioribus extrahatur excorticatis cultello potius quam aqua calida, ut in oleis dicemus.

Anacardus, seu cum Paulo & Aëtuario anacardion, sit plenior & habilior, fuscus, resina in cortice multa, acri nigra, nucleo intus albo: quo in melle cocto sit mel anacardinū. Hoc etiam tuso potest oleū exprimi, sed longè diuersum ab eo quod coctis in aqua corticibus supernat

& conchis colligitur ad confectiōem anacardinam.

Myrobalani citrinæ sint, flauæ, multum in viride inclinantes, densæ, graues, in fractu Mes.
ris gummosæ, amplæ, cortice crasso, denso, os paruum complectente.

Cæpulæ amplæ sint, & quo maiores eo meliores, subnigræ, in rubrum inclinantes, gra Ibidem:
ues, ob id in aquam promptæ mergi, cortice crasso.

Indæ, sint nigræ, magnæ, graues, substantia densa, sine ossibus. A quibus conditioni- Ibidem:
bus quanto longius abscedunt, tanto sunt deteriores.

Emblicæ, magnæ, graues, carne multa, densa, ossibus exiguis. Rara verò carne quæ Ibidem:
sunt, spiritu & vigore parent.

Bellericæ, magnæ, graues, carne multa & densa.

Ibidem.

Notæ igitur in his cōmunes aliorum fructuum & præcipuè sunt, vt sint bene habi-
tæ, & corpulentæ, carne multa & firma ac densa, & ob id osse exiguo, quibus os datum
est. Nam Indæ sunt exosses. Quæ verò notæ aliæ à colore ducuntur, & ossis figura, mi-
noris sunt momenti.

Balanus myrepfica sit ampla, vetus, cortice læui, tenui, pleno medulla, leui pingui.
Parua verò ex albo nigricans, vetus, plena medulla alba, læui, pingui, est innocentior.

Conij seu strobili vulgo pineoli, pleni, recentes, albi, sicci, quatenus illis datum est.
Videntur flauī aut etiam pallidi, oleosi, rancidi. Id quod his citò, vt fere sexto mense ac-
cidit, nisi prius saccharo interiecti hoc vitium effugiant: præsertim si prius ex fursure fri-
gantur, & sic probe siccentur: deinde cribro purgentur. quod remedium est, alijs quo-
que seminibus condiciendis, ne aut citra condituram, aut etiam condita ranceant.

Cupressi pilulæ, vulgo nuces, sint perfectæ, recentes, ob id molles, seminis plenæ,
etiam in ipsis hiatibus.

Cydonia seu cotonea sint bene habita, flauescētia, odorata, matura cum minus astrin-
gendum & refrigerandum est: cum verò magis, ante maturitatem colligantur.

Eadem ratio est struthiorum, quæ nos cydonia scæminina vocamus, alijs maiora, mi-
nus acerba, carnosiora.

Citrium & arancium malum, & quem vulgus limonē vocat, sint magnitudine quod-
que in suo genere mediocri, odore valido & iucundo, cuique suo cortice tenui, raro: co-
lore in limone pallido, in citro flauo, in arantio rubescēte: quāuis & arantia viridia etiā
per maturitatem inueniantur: carne intus multa, firma, & succo odorato, acido, inter-
dum dulci, est quando ex vtrisque misto.

Colocyntidis medulla cortice ablato sit pilæ mediocris in speciem cōglomerata, ve- Gal.
hementer amara, matura, ampla, rara, ob id leuis: & quāto leuior, tanto melior: alba ad-
modum lenis, eadem scæmina autumnō legenda cum flauescit abeunte iam virore.

Cucumeris agrestis fructus præfertur absolutus & maturus & virore deposito, flauus, Mes.
amarus. Ex quo succus albus, suppinguis, Elaterium dictum, quo modo sine valenti cō-
pressione extrahatur, docet Dios.

Carpobalsamum sit flauum, plenum, grande, graue, mordax gustu, & feruens in ore, Dios.
modice opobalsamum redolens.

Cassia fistula, seu nigra, seu cathartica, id est, purgatrix eligatur foris & intus nigra, Mes.
ampla, collucens, grauis, plenior, & quæ concussa clausis intus granis non strepat: pul- A&
pa intus pingui, splendente, succulenta, non situlenta nec putri: sapore prunorum deli-
cato, calida, humida primo gradu. Vtendi tantum tempore extrahenda: nam extra can-
nas, vt semen, sanguis, lac, extra propria conceptacula, prout corrumpitur, & in vasis
seruata peior euadit.

Cubebæ sint corpulente, plenæ, graues, acres, minus tamen quā piper, subamaræ,
admodum aromaticæ, subdulces, annis decem seruantur.

Coccum gnidium ex thymelæa eligendum, cui folia magna tenuia sint, quæ in locis
liberis crescit propè alias multas thymelæas. foliorū vsum celebrat Mesues nō granorū.

Daŷyli nobis, vt Græcis vulgaribus hodie dicuntur, fructus palmæ, à digiti figura.
Probātur magni, flauī, parum rugosi, molles, pleni tamē, & carne intus multa, subdura,
ad nucleum candicante, ad corticē rubescēte, non pertusi, non vermiculosi, & qui con-
cussi nihil aut minimum sonent, sapore vinoso. Deteriores sunt graciles, flaccidi, du-
ri, quia ex carnes, excusso pediculo pertusi: idem ferè vermiculati sunt.

Ficus passæ seu caricæ habentur præstantissime, quæ in calathō spartaceo digitis, aut
pugnis vtrinque pressæ, sic illis mollitiæ sua cedunt, vt mutuos partium distarum motus

sibi propè occurrentes sentias, odore sunt iucundo, nō calorem putredinosum aut vermiculosum referente.

Hæ verò si particulatim explorentur, pediculo sunt brevissimo, colore in candidum vergente, molles, tractanti facile cedētes, cute tenui, molli, succo intus & semine flavo, & plane melleo sapore, odore ante esum & inter edendum iucundo, graues, parvæ. Si Malsiliotides (quæ etiam saporis gratia cæteras longe antecellunt siue albicantes tantum sint, siue intus & foris albæ, sed flavo semine) maximè: si externæ sint, quales Hispania mittit musko mersas, vt dulciores sint, post ne cohæreant farina aspersas.

Vitiosæ sunt duræ, tum per se singulæ, vermiculosæ, graecolentes, foris nigre, intus rubentes, vel alio præter naturam colore præditæ, cortice crasso, duro, siccato, intus alieno colore, odore, sapore. Quædã tamen sunt nigre Prouincialibus & Narbonensibus dictæ, folijs nigrantes, intus ruberrimæ, omnium delicatissimæ dum recentes sunt: nam siccata liquefunt, aliæ ipsdē cineritiæ, aquosiores quàm vt siccatī possint: hominibus ingrata, auibz expetite.

Galla omphacitis, id est immatura, laudatur parua, seu magnitudine mediocri, nodosa, grauis, solida, nō perforata: minus vtilis magna, rotundissima, polita, leuis, laxa, perforata, flaua, aut saltē rufa. Gallia Narbonensis & Lugdunensis præfert rosmarinas vulgo dictas, omnium minimas, graues, solidas, asperas, pretiosissimas.

Iutubæ zizipha vel zinzipha Græcis dictæ laudantur recentes, amplæ, oblongæ, passæ, tamē tensæ, carne intus multa, succulenta, laxa, dulci, vinosa: plenæ, graues: sapore dulci & delicato: nucleo paruo, foris rufo ac verius rubentes, intus pallidæ aut albescētes, (Nam foris albæ nobis nondum visæ) ossē prunorū, rotundiore, paruo intus nucleo, dulci. Improbantur vetustate nigricantes, leues, siccæ, puluerulente, friabiles, ex carnes.

Myxæ, myxa, & myxaria vulgo sebesten, à mucoso lentore, quo abundat dictæ, prædictis affines, sed dimidio minores, acuminatæ, parum rugosæ, graues, nigre, carne multa ex rubro nigricatē, firmiore, glutinosa, dulci & subacida, ossē prunorum Damascenorum inæquali, nucleo intus exiguo dulci.

Malum punicum cortice seu corio integro, rufo, duro, & denso, graue, maturum, granis intus rubris vel roseis, succo prægnantibus vinoso plenissimum.

Myrti bacca recentes, plenæ, succulente, odoratæ grandes, & bene nutritæ.

Nuces auellana præferuntur ligno solido non pertuso, rubente, rotundo: corpulentæ, graues, nucleo intus si concutiantur sonante: si fracta nucē gustetur, gratissimæ, & sapore castaneam referente: foris flavo, intus albicante, pleno, duro.

His proximæ sunt, francæ vulgo dictæ, hoc est legitimæ, oblongæ, ligno simili, cute intus nucleum vestiente, rubentissima, carne dura & firma rubente. Infimæ sunt syluestres, ligno & nucleo candicante. Improbantur leues, perforatæ, quia vermiculosæ vetustate oleaginæ, rugosæ nucleo & exsucco.

Nux moschata sit grauis, oleosa, odorata.

Nux Indica aquâ intus dulcem habet, si recens est. Quæ quidem vtenda non cortex.

Oliuæ halmades, seu colymbades, quæ in sua muria conditæ innatant, præstantiores sunt, magnæ, ouales figura, pallidæ aut rufæ, plenæ, solidæ, carne multa, densa, subamara & subdulci: ossē intus paruo, longo, nucleum delicatissimum complexo. Quæ verò enormes aduehuntur, acuminatæ, carne multo largiore, sapore sunt minus delicato, vt armeniaca. Insita non insitis corpulentiora multo sunt, sed saporis iucunditate multo inferiora.

Opiantes & rha, & ribes vua legenda matura, plenior, acinis paucis, bene nutritis potius quàm densis, & paruis & strigosis.

Piper longum sit, corpulentum, integrum, recens, linguam tarde, sed diu commorans. Improbatur perforatum, vel adulteratum.

Mesius. Piper album ex hoc productum acius longo & nigro, maximum, plenissimum, graue non rugosum.

Piper nigrum alio maius cortice tenuiore, & minus rugosum, graue admodum.

Pistacia sint recentia nucleo, intus herbaceo, sapore iucundo.

Thamar Indi præferuntur subnigri, seu fusci, lucidi, molles, recentes, pingues ceu villis quibusdam, & radiculis intertexti, dulcacidi, seu ex dulcibus acidi, & vinoso sapore. Improbantur sicci, carne prunorum adulterati: in quibus nigredo est obscura, & prunorum odor & sapor.

Pruna passâ, vel acida sunt vel dulcia, vtraque sint ampla, & plena: carne intus mul-

In Gallia Narbone si quatuor locis inci se muria dies aliquot vt item post omphacio seruatur.

Gal.

ta, succulenta, firma: ossē exiguo, foris vel melle aërio incrustata, vel nigra, sed citra ab-
lutionem: non rancida, nec silulenta, nec puluulenta.

Damascena & armenia magis ad aluum subducendam, & dulcia alia humidaquē sunt
eligenda Mesue quā acida, vel horum media.

Senna folliculo (cuius precipuus est vsus) sit subnigro, in viride inclinante, modice a- Meſ.
maro & astringente, à natura cōpleto, recenti, semine intus amplo cōpressoq; Deterior
est subalbus, nondum iusta magnitudinis, aut maturitatis. Folia secundū tenent locum
si viridia sint, & plena, nō subalba, aut tenuia: furculi inutiles purgationi, ob id abijcien-
di. Mirum est hodie tam oblitos sui & Mesuæ pharmacopolas, vt folia pluris & faciāt
& vendant quā folliculos. Nostros verō hortensis senna inefficacior est orientali, vt
vocant, tamen non inutilis vsu quotidiano exploratur.

Vux passē, pingues, carnosę, cortice tenui sunt prestantiores lib. 2. alimentorum. no-
bis sunt Damascenę, Corinthię, vulgares.

Damascenę sunt deligendę amplę, fuluę, transparentes, carnosę, seminibus paucis,
paruis, sapore vinoso.

Corinthię omnium minimę sine seminibus colore purpurascēte, sapore delicatissi-
mo, rarę, & pretiosissimę.

Vulgares huc afferūtur, vel ex Prouincia capsulis abietinis, vel ex Hispania calathis
spartaceis. Prouinciales omnium post dicta duo genera Damascenas intelligo & Co-
rinthias prestantissimę, præsertim quę Prunellatę vulgo iudigenis vocantur, opinor
quod acino sint pruni æmulo, hoc est nigro, sed quem ros cæruleus intexit. Nō incele-
bres fuluę, Picardatę iisdem dictę, Damascenis toto habitu proximę, nisi minores es-
sent, & carne parciore, minusque solida. Ambę in palmitē siccantur intorto pediculo.
hę si pinguescant immo dicē & ob id digitis hæreant, farina aspersa vitium indigenę
regunt. Qui dolus est frequentissimus in Hispanis omnium ignobilissimis. Quas enim
habet Hispania optimas, sibi seruat: viles in alias septentrionis regiones transmittit.

DELECTVS LIGNORVM.

GALLOCHVM lignum, sit maculatum, odoratum, gustu astringens, & Dios.
subamarum, cute verius quā cortice aliquantū ve ruficolore, halitum man-

A su commendans, suffimentis expetitur thuris vice, eiusque modo in igne
liquefcens, sed tardius, & aquę iniectum mox subsideat, & bullulas edat.

Xylaloe dicitur Aetio & Aëtuario i. lignum aloes arboris, non herbę, cu-
iustamen succum nigredine & amaritudine pauca, & succo intus gummoso non nihil
repręsentat: vnde opinor illi nomē hoc accessit. Crudam vbiq; Mesues requirit. quod
enim à quibusdam coctum est excipiendi odoris gratia, vim amisit. Quod verō osten- Dios.
dunt officinę, verius est aspalathum: quod si optimum sit, graue & detracto cortice ru-
bens aut purpurascē, densum, odoratum, gustatu amarum: alterum deterius cādium,
lignosum, inodorum. Sunt tamen qui eius loco oliuę arboris matricem substituunt.

Lignum Gaiaci, siue ebeni species est, vt mihi videtur, quia ebenum toto habitu &
viribus à Galeno scriptis refert, siue aliud lignum sit, eligatur colore fuscum & flauum,
cortice ipsi ligno firmiter hærente, densum, graue, bene habitum, ex arbore ætatis
medię, si potes recentissimum (quo enim recentius eo est succulentius & vegetius) aut
alioqui gummosum, ac in eo non excorticato rami mediocres præferuntur. si vero vetu-
stus est truncus, (modo non sit putris aut cariosus, vel aliter vitiat, vt sæpe videmus)
quia ob crassitiem & duritię dissolutioni sui magis resistit, pinguior manet quā rami,
cortex verō siccior. Contrā verō recētis cortex internus pinguior, & succulentus ma-
gis, quia alimenti plātę vehiculum ferē fuit. Eligatur item sapore dulci, amaro, acri ex
insula meridiana sancti Ioannis, temperata, irrigua, resinosis: ex insula autē sancti Do-
minici in zona torrida aridius.

Palus sanctus quibusdam videtur ramus gaiaci, cui lignosarum fibrarū implexu va-
rio, matrice nigra hodie in ebeni locū substitui solita, viribus denique proximis est, sed
valentior si recēs est: imbecillior verō & ob tenuitatem citius exsiccat: si vetus, vt in
alarum plantarum ramis, & precipuē furculis. Alijs diuersus videtur quod albefcat ma-
gis suo cortice, & aljs quibusdam de causis. Iudiciū his permitto, qui arbores ipsas cę-
dunt, viribus certē ambo sunt proxima.

Santalum citrinum, optimū, & maxime aromaticū, sed inuentū rarū etiā Plateario.

IACOBI SYLVII MEDICI

Album pessimū, rubrum medium bonitate est: frigida omnia gradu tertio, sicca secundū. Quæ tamen sunt in officinis acri sapore linguam mordēt, præsertim citrinum ob id non vtenda.

Dios. Xylobalsamum probatur recēs, sarmento tenui, fuluum, odoratum, opobalsamū non nihil spirans.

Calamus aromaticus, quem officinæ ostendunt, radix videtur & rei alterius quàm calami, tamen viribus proximis pollere odor & sapor indicant, subalbus, odore & sapore aromatico, non puluerulentus inter frangendum, triennio seruatur.

CORTICVM DELECTVS.

Galenus
locis va-
rijs.

C IN AMOMVM deligatur tenuium partium, odoratissimum, seu indicibili quadam suauissimi odoris gratia super alia omnia præditum, gustatu acre, & valde mordax, admodumq; calidum, non tamen adeo vt molestè rodatur, manū verò rutam olere videtur, color illi est lacteus, cum gilno & cyaneo mixtus, seu cinericius, virgultis gracilibus, nodis frequentibus, læue, confringi facile. Leprocynamomum. i. tenue cinamomū pro optimo vocatur Actuario. Quod verò cannellam vocamus, vel casia est, vel pseudocynamomū, quanquā principum cinamomorum sex ipsi sint differentiæ generales. annos triginta seruati fit imbecillius, nec putes diutius seruari posse integris viribus toto habitu corticisq; tenuitate.

Casia quod cinamomo est similior, ac odore & gustu propior, eo est præstantior. Est autem rufa, rosam expirans, & vinum olens, gustum dulcem præferens. i. fistulosa & aromatu modo, vehementer odora, vnde casia syrinx, & casie syrinx fistula sæpe apud Galenum dicitur, à purgatrice & Aegyptia res diuersa, vt prius in fructibus admonui. illa corticem exteriorē, quem & fistulam dicunt, odoratu & gustatu valentē habet: quod autem intus est maximè imbecillum, ob id inutile.

Macis sit rufum aut flauum, aromaticum, odore suauis, sapore subacri, & minimum amaro, quoque recentius & succulentius eo melius ne putes cū quibusdam annos decem efficax seruari. Succus ex hoc expressus gummi hederæ figura, quā ipsum macis est valentius. Macer hodie desideratur.

Tamaricis cortex sit verus ex Gallia Narbonensi potius quàm ex fonte belle aquæ paradiso regia propè Melodunum. Hic cum sit nostras & passim luxuriat, vel lippis & tonforibus notus est, vt cortex radicis capparidis.

Dios.

Thuris cortex sit crassius, pinguis, odoratus, recens, læuis, nō scaber sine membranis, adulteratur misto cortice pini aut nucis pineæ, sed hi sine odore fumant nō incenduntur, sed thuris cortex ardet, & cum odoris fragrantia vaporem iaculatur, fere in glebis thuris mistis inuenitur.

SYCCORVM DELECTVS.

O LEVM ex oliuis maturis expressum, colore rufum, purum, perlucidū, tenue, odore exiguo sed grato, sapore dulci, subacri, & indicibili, recens, aut non ita vetustum, nisi vetusto egeatur. In quo trigenariū trimo, & quadragenarium quadrimo est plurimo valentius, vbiq; crassius, graueolentius, calidius, acrius.

Dios.

Oleum virgo quod vocatur est, præstantissimum: paucum sit, ob id pretiosum.

Oleum omphacinum ex immaturis vuis expressum ad viride inclinat, recēs sit, odoratum, morfus expers, sapore acerbum. Huius penuria ablutum capiendum est.

Vinum deligitur varium pro scopis medicorum varijs. Colore autem, odore, sapore, consistentia ferè probatur.

Mel sit
vernū aut
estiuū nō
hybernū
Auic.

Acetū albū tenuius ob id valētius nigro & medio, præsertim si æque sit acre & vetustū. Mel optimum sit purū adeo, vt totū perluceat, odorum, flauum, acerrimum, dulcissimumque gustanti & iucundissimū: consistentia nec crassa nec liquida, sed tam sibi coherens, vt continuitatē suam quasi linea longissima non interitū seruaret, si digito attolleretur. Idem coquendo paucam spumam emittit, nec thymum immodice olet.

Album etiam colore si fuerit, modo notarum bonitatis alarum nulla desit, nihilo deterius fuerit. Quin Hispani & Narbonenses mittūt albisimum, & longe præstantissimū, idemque prædurum, quale etiā flauum hic præferunt liquido: quippe quod humore aliquo est vitiatum.

Aeromeli autē. i. mel aerium seu manna Arabibus dicta, siue liquida sit, siue granulosa, Mesues. eligatur alba, recēs, dulcis, pura, & excrementorū, quoad licet expers, ex plantis odoratis & homini salubrib⁹ collecta, qualis laricea hodie probatur, anno seruatur. Sola prope granulosa in vsu est, liquida inuētū rara. quę in lapides incidit deterior, & hac peior cineritia: pessima fusca, cœnosa, antiqua, saccharo & folliculis saune adulterata: sed hæc tempore mollescit, & liquefit, dolumque prōdit.

Cera sit flauissima, odorata, pinguis, coacta, leuis, pura, & aliena omni materia cārēns. Maurica tingendis flauo colore alijs quamquam nigricat expetitur alba, vel natura, vel ablutione: sit viridis mista æruginē: rubea immissa anchusę radice, cennabrio tamen sepe tingitur.

Saccharū est præstantissimū, quod durū, solidū, & mutuo metarū allisū sonorū est, ligni siccī & solidi modo, tamen ob siccitatē & imperceptā raritatē leue, dulcissimū, candidissimū, & niuis in morē scintillans, cohærens, quale Valentinum in metas pyramidum emulas (panes vocant) coactū, paruas, ponderis librę vnus & dimidię, vel circiter, carissimum, & confecturis siccis aptissimū, penidijs ob siccitatē nimis friabilē, ineptū.

Illi dotibus istis & precio est proximū qđ Madere appellāt, sed in metas ponderis librarū 6, 7, 8, 9, decem formatur, confecturis expetitū, quia minus preciosum, non multo tamen imperfectius.

Tertium statuitur lentile, album quidem sed pinguius, ob id vilius neque confecturis siccis aptum, sed penidijs idoneum.

Quartū ex Canarijs nūc dictis insulis, olim Fortunatis, aduehitur, etiā intus albicās, bonitate inferius prædictis, præstantius sequēti, metis cōstat maximis, pōdere lib. 10. 12.

Quintū ignobilissimum sancti Audomari dictū, foris albidum, intus subrubrū, tanquam alio fartū, & foris dolo tectū, metis æqualibus, omnium glutinosissimū, cōdituris siccis ineptissimū, liquidis seruit & syrups, opiatis, conferuis, & similibus, quia vilissimum, & vilitate tegit aliorū mistura. Id si mare sentit (nam eo naues ob grauitatē faburrāt) rubrū vulgo dictū sit, quanquā sunt qui rubrū spumā & spurcitia omnis, sacchari se coquendo purgantis existimant. Ex micis horū collisū elisis etiam metas hic quidā cōgunt, quæ simplicium naturā sequuntur. Ex his quod generosissimum minimā coctionem sustinet ne pulueriscat: ignobilissimū cōtra: cætera pro accessu, aut recessu variāt.

Acacia nostras modo non putruerit, aut situlenta euaserit, bona adhuc fuerit vetusta, nisi recentem medicus exigat ob scopum aliquem.

Aloe optima sit pinguis, glutinosa, friabilis digitis, facili liquefcens, ex rubro ruffa, hepatis modo, coacta & intus foueata, proinde minus grauis, bono odore, myrrham æmulante, licet planta tota odore sit tetro eximie amaritudinis, sincera, nitida, transparentes, arenularum & calculorum expers, qualis est indica. Adulteratur Mesue & alijs, & notas istas non habet. Dios. Mes.

Elaterium, & Glaucium & Lycium si habebuntur, notas ex Dioscoride requirē.

Glycyrrhizæ succus ex Creta optimus, hoc est, dulcissimus, mollis, recens, purus, tenax, & qui contractus splendeat, nigerrimus, & qui linguae subditus tandem totas eliquefcet.

Hypocisthis licet quedā flaua, alia virens, alia cādida Dioscoridi dicatur, ante præparationem intelligitur. In offas enim conformata est nigra, lenta, sapore astringente, odore non ingrato.

Ladanū probatur odoratū, subuiride, facile mollescens, pingue, resinofum, quod arenas nō collegit, nec squalore oblitū est, quale Cypriū, sed Arabicū & Libycū est vilius. Dios.

LIQVORVM DELECTVS.

Pr̄os est liquor ex planta vulnerata, sterabrata, scarificata, castrata, sponte defluens, sed suauis gustu.

O Opus Cyrenaic⁹ sit acer, mordax, modice rufus, nō porraceus colore, trāf lucēs, myrrhę emulus, odoratus, & qui dilutus cito albescat. Ex Taprobana insula in mari Indico maxima hodie à Lusitanis cōuehitur belzoe indigenis dictus, & nobis inde belzoīn. (Nā Indic⁹ etiā, Mesue lau dat) corruptius bencoīn. Assa aromatica & odorata, quib⁹ correpte etiā dicitur nomine à lasere herba detorto à qua planta hic liquor defluit, vt etiā assa fœuda à lasere Parthico & Persico, & cū Mesue à Medico & Syriaco, cuius liquor vīrus & putrilaginem olet Dioscoridi.

Opium dictum, quod nigri *μυκνονος*. i. papaueris, sit opos. i. liquor, vt meconiū eiusdem Dios. b iij

IACOBI SYLVII MEDICI

succus.laudabatur olim Thebaicū & Hispanū,nunc Apulū in vsu esse frequentiore aũdio.Opiū habetur optimū,grauē,denſum,gustu amarū,odoratu soporiferum,quod facile aqua diluitur,læuē,cādidum,neq; asperū,neq; grumosū,quodq; inter colandum non vt cætera coeat, & in sole diffundatur,deinde admotū lucernis non atra luceat flāma,extinctū denique,odoris vim seruet.

Diosc. Opobalsamum probatur recens,validi odoris, sincerum, non ad acorem vergēs, di-
Mesues ſui facile, læuē, astringens, mordens gustu modice, in laneam vestem effusum, nec maculam facit, nec si eluatur notam relinquit, lac coagulat, in aqua, aut lacte celerrime liquatur, & colore lactescit. Idem senescens crassescit, deteriusque habetur Diosc.

Opopanax.i.panacis heraclij radicis incisæ, vel caulis liquor cādidus dū recēs est, dū aruit colore foris croceo, aut subflauo intus cādido, odore graui, seu cum Mesue odore bono, sed suo, amarissimus, læuis, pinguis, friabilis, tener, facile in aqua liqueſcens.

Damnatur niger admodum & mollis.

Diosc. Euphorbium sit lactēū, causticū, & vrēs, tenuium partium vel orobi magnitudine, far
Gal. cocollē modo emicans, vel in ouillis aut hedinis ventriculis exceptum & concretū, vitreum, translucens, acre, recens, albiſſimum vbi calore multo & igneo egetur: vbi modico, luteū & vetus. Recens enim albius est, & calidius, & leui gustatu os accensum diutius sic tenet, vt cætera gustata euphorbium respiciant. Calor autē hic caducus est, & citō euanidus, fitque verustate cineritium, pallidiū, aut flauius, & modice calidum. Bimum aut trimum adhuc mediocre viribus est, & interdū quadrimum: quinto autem aut sexto anno exoluitur, procedenteque tēpore totum elangueſcit, ne putes cū vulgo annis decem posse integrū ſeruari, etiam cum milio, lentibus, fabis. Recēs verō quia viribus est violentis, non vtendum nisi medici optimi consilio, præsertim sumēdo remedio. Mesue vero optimū est leue, fragile, pallidum, clarū, acerrimum, odore mordax, annotinum, nam recentius igneum est & venenosum.

Galbanum laudatur ligno purum, aliquid tamen seminis mistum habēs, odore graui, sapore abominabili, pingue, in hammoniacy aut thuris similitudinē cartilaginofum, humidū & aridi medium.

Hammoniacum probatur purum ligno, arenis, terra, fordibus, bene coloratū, odore castorij, sapore amaro, prædensum, & in thuris masculi similitudinem minutis glebis cartilaginofum.

Gal. lib. I Sagapenum laudatur perucidum, foris rufum, intus cādidum, acre, odore porri, seu
Antid. medio inter laſeris liquorem & galbanum, quibus adulteratur. galbano albiore est simile. Nā spumosa, coherēs, albiore, leuiſq; pars galbani in sagapenū degenerat. Altera deſior, & multo quā alii galbanum conſtrictior, sit galbanum optimū, sagapenū respiciens, eaque tanquam præstantissima vtendum si verum est. vino aut aqua ſtatum ſoluitur, adulteratū non liqueſcit. Mesue vero optimū sagapenum cenſetur ex albedo rubeſcens, odore porri, non omnino laſeris, nec galbani, quibus adulteratur, spissum, sed tamen leue, facile in aqua reſolubile.

Ibidem. Scammonia vel scammonia ex Myſia Aſiatica deſerunt laudatiſſimū, hoc est, nitrū, rarum, fistulis tenuibus, fungoſum, leue, taurino glutini, vel gummi colore ſimillimum, & clarum linguam parum vehemēter vrens, linguæ ſaliuoſæ tactu vel humoris allicuius albeſcens in fragmentis, & lacteſcens, tenerum fractu ac pulueratu facillimum, odore bono sed ſuo, non autem ſedo. Syriacū & Iudaicum graue & denſum improban-
Diosc. tur: tamen Antiochenū Mesues commendat. si verō linguam vehementer exurat, tithy-
Mesues. mali ſucco vitiatum iudicatur.

Ladanū maxime probatur, odoratum, subuitride, facile molleſcens, pingue, reſinoſum, arenis non miſtū, nec ſqualore obſitū, quale Cypriū est. Arabicū verō & Libycū vilius.

RESINARVM DELECTVS.

Diosc. cal. **A**STICHE laudatiſſima fulgore quodam ignis ſplendida, candore cere
M Tyrrenicæ, ampla, retorrída, friabilis, ſtridēs friando, odorata, minimū acris, Chia. i. ex Chio inſula, calida ſicca ordine ſecundo, parū astringēs.
Deterior est viridis & nigra, Aegyptia dicta aut pontica, bitumini nigredine ſimilis. Est autem lentice arboris reſina.

Terebinthina reſina ex terebintho arbore deſluens, optima est alba, vel cærulea, vel colore vitri, perlucida, odorata, terebinthum olens, ſubamara, chia, asperę arterię & ori

mordax, liquida. Huic primatū inter resinas dat Diosc. secundas tribuit mastichæ. contra Galenus, ob id eam statuimus primam.

Hodie ex Cypro insula & liquida & per siccationē coactior non cōtemnenda. Huic proxima est larix dicta seu laricea ex larice arbore, in qua mannam fere colligunt. Larici bonitate & tota natura est affinis, abieri na, quæ hodie ppe sola pro terebinthina ab omnibus officinis supponitur magno errore, cū sit multo inferior terebinthina. Quod si Galenus non modo terebinthinam exigebat, sed Chiam tanquā omnium præstantissimam requirebat, qua non dico ignominia sed poena mulcandi sunt rhopole, qui scientes abietinam pro terebinthina vendunt, vsurpantq; non sine medicorum id perimite ntium infamia & culpa.

Præter has picea, pinea, strobilina, cyparissina, Dioscoridi & Galeno memorantur, & liquida è pinu & picea, quæ quod olim à Colophone vrbe Asiæ minoris petebatur, colophonina vocabatur; nunc nescio, qua ratione fecem terebinthinæ destillatæ solā vocēt Colophoniam.

GUMMIVM DELECTVS.

VMMI ex acacia Aegypti spina, Arabicum vulgo dictum, & gummi absolute, laudatur vermiculorū in speciē contractum, vitri modo perlucidum, purum, refrigerat, densat.

Caneamū Arabicæ arboris lachryma, vulgo gūmi lacha, præstātus est ex Diosc. legēdū. Diosc.
Caphura Indicæ arboris ferulacæ lachryma, foliis Arabibus & Græcis recētoribus cognita, eligitur quæ igni vel sole ex rubro albescit, perlucet, friabilis est. Ea enim est melior & tenuior & duratior, eadem pani calido imposita madescit si sincera est: arefcit vero, si spuria.

Deterior est crassa, fusca, nigra, asulis ligni sui implicata, vase eburneo cū semine psyllij aut lini, annos quadraginta seruari posse quidam affirmant.

Gummi olcæ Aethiopice corruptè elemni dictum, melius est scammonio simile, fuluū, stillis exilibus constans, mordax.

Damnatur Hammoniacō vel gummi Arabico simile colore, nigricās, morsus expers. Quod proferunt officinæ est resinæ piceæ aut pinus, quam Burgūdicam vocamus, colore & consistentia & odore, primo deinde tamen valentissimo & multis graui.

Gummi iuniperi vulgo Vernix, quia verno tempore exudat & legitur, bonum est recēs, Diosc.
perlucidum, pallidum. dum veterauit, flauescit, & fit friabile mastiches modo: quam toto habitu multū meretur. In vsu frequentiori tamen est scriptoribus & pictoribus quam medicis, præterquam in suffitibus. qua autem ratione non video, cum ipsum vt & thus caput grauet, & vapore crasso & calido repleat.

Myrrha arboris Arabicæ lachryma eligēda, recens, squalore & situ obducta, levis, tota cō color, & quæ contractas vnguiū modo & læues venas ostendat, glebis minutis, amara, acris, odorata. Omnibus antefertur Trogodytica ex Aphrica, viridis, perlucida, mordax, odoris gratissimi, nullo vitia liquore. Post hanc secunda est tenuis, bdellij modo facile sub digito mollescens, odore grauiuscula, apicis nascens. Mala nigra aut colore picis, grauis, re-torrida, maturitate maximè exoleta.

Omnīū pessima, pingui carens, cano situ obducta, acris, ad gummis imaginem vergens, & viribus eius proxima. Ob id adulteratur gūmai macerato aqua, in qua myrrha maduit. Vera enim est rara inuentu, præcipue sincera. Nam in optima myrrha opocalfason inuenitur ab optima myrrha diuersum, vt in nostris simplicibus abunde docuimus: propter quod & alia. myrrhæ in sumendis parum tutus est vsus.

Myrrha stactæ, id est, ex myrrha recente. pingui, & solo lætiore nata exudans & stillans, cum ex aqua pauca tusa, deinde machina exprimitur, colore pallido, amaritudine præcipua, odoratissima, pretiosissima, minima portione efficacissima. multo rarior ipsa myrrha. Nam quæ styrax liquida vulgo dicitur, si verax esset, myrrha fuerit stactæ: sed cum odore sit cetero-rimo, à myrrha alienissima res est.

Quod stillis illis expressis magma myrrhæ superest, vulgo quoque styrax rubra dicitur.

Bellium lachryma arboris Sarracenice vel Sembrachenice cum Hermolao, optimum est carens cortice, ligno, fordibus, vt taurinum gluten, translucens & clarum, odore vnguis marini incēsum, gustu amaro, intus pingue, & si tactu subigitur mollescit.

Scythicum est atrius, resinofius, molliens magis. Arabicum resinofum, liuescens, lucidum, magis sicans, nisi recens sit & humidum, & tundendo facile mollescens. Indicum,

IACOBI SYLVII MEDICI

fordidum, nigrum, grandioribus glebis in offas conuolutum.

Adulteratur gummi, sed id minus est amarum, & minus sufficit odoratum.

Styrax lachryma arboris *syriacæ*, probatur flauus, pinguis, resinofus, fordescens, albican-
tibus grumis, acer admodum & amarus, quamplurimum in sua odoris fragrantia permanens,
& qui subactus mellei reddat liquorē. Deterior, niger, furfurosus, friabilis, cano situ ob-
ductus. Adulteratur multis modis *Dioscoridi*, sed dolus his norisprehenditur. Pretio-
sissimus erat & paucissimus *Galenī* ætate, qui ex *Pamphylia* in calamis & arundinibus affe-
rebat. Vnde opinor quitiis alius calamites hodie quoque dicitur. Accipe autem quod cali-
dissimum, & odore & gustu valentissimum est.

De *styracis* duobus alijs generibus supposititiis in *myrrha* diximus.

Sarcocolla arboris *Perficæ* lachryma, pollini *thuris* similis, rufa, emplastica, subamara
sine morfu siccans *Melusæ*. Item valentior est flaua quam alba, & quo amarior, eo melior.

Adulteratur gummi misto, puluerata etiam suspecta est adulterii. Vera enim rara est
inuentu.

Diose. *Succinum* vel *Electrum* est lachryma ex *pinei* generis arboribus exudans autumno, ex
Germania septentrionali & infulis maris *Germanici*, larga mitti solita, incensa *pineam* a-
perte olet, charabe vulgo & ambra dicitur: medicis in vsu raro.

Ambar vero seu ambarum seu ambra *Arabibus* & *Græcis* recentioribus est odoramen-
ti genus cineritio colore. *Arabica*, subalba. *Indica*, rufa, pinguis, odorata, succinum orienta-
le dicta *Hermolao*. *Nigra* omnium pessima.

Thus lachryma arboris *Arabicæ*, pinguius, albius, emplasticum, flauius, est siccius, & an-
tiquatum magis. Quod sceminiū vocant resinofum magis est ac molle, cito ardens:
quod masculum, primum albicat, tandem etiam rufescit & flauescit. Perlucidum est, si præ-
sertim guttarū formam retinet. Adulteratur resina *picæ* & gummi, sed thus ardet, gum-
mi non inflammatur, resina in fumum abit.

Mannam seu *malnam* *thuris* *Græci* proprie vocant *micas* *thuris*, ex magnis fasciculis cō-
cussu *elisas* cum fragmentis quibusdam exiguis, corticis *thuris* arboris.

Tragacantha laudatur alba, perlucens, gracilis, lævis, sincera, subdulcis. *Salua*, in ore diu
lentescit. Quæ verò est antiquata, magis pallefcit primum, deinde rufescit, tādē etiam
flauescit: quod lachrymis prope omnibus cōmune est. sitque *tragacantha* hæc annis amara,
ob idque calidior, dulcius cæterorum more. Ob id etiam vulgus *tragacantha* flauam anti-
doto aureæ *Alexandri*, antidoto *Hadriani* & *diacucurmæ* maiori & alijs quibusdam com-
positis miscet, quæ calida sunt præsertim vbi cocta sunt, & vt dicunt fermentata, post an-
num scilicet dimidium: alijs vero frigidis aut temperatis albam aut pallidam.

METALLICORVM ET TERREORVM DELECTVS.

VRVM & argentum indice lapide exploratur & probantur, colore scilicet fla-
uo in lapide relicto. Igni quoque & alijs explorantur fabris aurarijs.

A *Lithargyros* auri omniū optima, præcipue foliata, aureo colore. Liqueatur vt
cera sed non mox, vt lib. sequente in liquatione audies. materiæ solius in empla-
stris rationem obtinet. seruetur vase vitreo plumbeo, stanneo, argenteo, liqui-
dem aliam omnem materiam exedit, & defluere facit. **Diose.**

Lithargyros argenti & plumbi deterior. Est autem horum metallorum seigni purgantiū
vitium seu feruescentium spuma.

Arsenicum, id est auripigmentū optimū est, aureo colore, nulli materiæ permistum, cru-
stosum, & in squammas tanquam bracteolas fissile. Alterum globosum, glandis effigie, pal-
lidum, & colore *sandarachæ* imitans: vt trunque causticum est. In eisdem metallicis fodinis
quibus *sandaracha* gignitur in *Pontro* & *Cappadocia*.

Sandaracha arsenico affinis natalibus & natura, quin & in eam arsenicum vitione dege-
nerat: ob id auripigmentum & arsenicum rubrum quibusdam dicitur, probatur colore ru-
fo, saturatior seu *cinnabaris* rubro, sulfuris virus redolēs, friabilis, aliena materia carens, cau-
sticum est. Ne ergo posthac *sandarachæ* nomine gummi iuniperi accipias in compositioni-
bus *Græcorum*.

Diose. *AEs* vltum probatur rubrum, & quod tritum colore *cinnabarim* imitatur, nigrum vero
plusquam decet exustum est.

Ibidem. Squamma æris laudatur crassa, rufa præsertim si aceti resperfu æruginem contrahat.
Flos æris ære fuso & aqua affusa exilit subito, milij effigie & numero, optimus est brevis,

granis, splendens, cum teritur rufus, friabilis adulteratur æris squamma aut limatura, sed hæc dentibus dilatur.

Diphryges quasi bis tostus est perfecti æris velut sæx subsidens & cohærens imæ fornacis parti, ablato ære visitur, acere est vt æs vstum, præfertur quod sapore æris & æruginis habet, astringens & vehementer siccans linguam, quod exusta ochra sibi non vendicat, quæ tamen diphrygis vice venditur, adulteratur enim ochra vsta.

Scoria est metallorum omnium velut steruus. scoria plumbi optima est, densa fractu conrumax, cerussam plane repræsentans, nihil plumbofum habens, ad luteum colorẽ accedens, vitri splendorem imitatur.

Aerugo est æris velut rubigo, acris est & mordax & caustica. Flos æris Guidoni & sæpe idiotis alijs male dicitur.

Aerugo sincera compressu digitorum diffunditur, dentium quoque; appressu cedit, lævis est ac æqualis & sine asperitate post foscilem præfertur rasilis nobis hodie sola in vfu.

Sori, chalcitis misy & ex transmissa per hæc aqua & siccata calchantum, acria sunt, & vrendo escharas inducunt.

Sori in fodina infimum, crassissimũ, lapidosius, vehementius compactum, in humore non liquefit, friando nigrius ceu melanteria apparet ac scintillat vt misy, in multa foramina dehiscit, olfactu & gustatu virus olet, subpingue astringens est.

Misy summũ grumofum & frustulosum magis est durum, auro simile, & friando auri colorem repræsentans, & stellæ modo splendens ægræ liquefit. Cyprium ad ocularia medica menta optimum, ad cætera remedia Aegyptium efficacius. Diosc.

Calcitis situ & natura horum media æri similis, friabilis, non lapidosa, nec inueterata intercurfantibus oblongis venis splendentibusque promptissime liquefit.

Chalcantum optimum est molle, concretum, graue, cæruleum, translucens, quale est stil latitium concretitio & coctili præstantius.

Melanteria præstat sulfuris colore, lævis, pura, æquabilis, aque contactu confestim nigrescens, misyos modo caustica. Diosc.

Cadmia fornacaria melior est botrytis, id est, racemosa, in summo fornacis ærariæ affixa, densa, modicè grauis, in leuitatem magis inclinans, colore spodiij, & quæ fracta cingulenta & æruginosa est.

Cadmia lapis, calaminaris vulgo dicitur, cuius puluere æs rubrum pallore tingunt & auget etiã hodie fabri ærarij. Is alieno sapore madet est, & in farinã tritus, aceto subact⁹, in sole siccatus coit in lapide, in igne manet & fuliginem edit luteã vel æræã, quæ lapidi cuidã in lapidũ fodinis inuento à nonnullis male pro cadmia supposito non conueniunt. Diosc. Id quod dum fit, pumpholyx ceu fuligo quædã alba, tenuis summæ fornacis cameræ adherens parietibusque; actectis & spodos illi persimilis, sed grauior, in pauimentum recidit. Vtriusque magnam nobis copiam suppeditant fornaces ærariæ Parrhisij, in via diui Martini, propè Budæi, piæ vitæ functi, ædes.

Cerussa olim Rhodiaca Corinthia, & quæ Puteolis in Italia fiebat, cæteris albior, leuior, tenuiorum partium, ad emplastra alba maximè commendabatur.

Sulfur viuum est optimum præsertim si nitedule seu fulguris modo splendeat & perlusceat, nec sit lapidosum. vstum verò est melius virens ac præpingue.

Sulfur enim ignem experitum, quo virentius, oleosius, pinguius, eo melius.

Alumen scissile non in fila tantũ, sed digitis friabile, vulgo plumæ, omnium substantia est tenuissimũ & pretiosissimũ, aque innatat, lingue, & cuti integræ mordacissimũ, igni liquatur vt alia allumina: quibus notis tribus ab amatho lapide pro ipso supponi solito facile fecernitur. Liquidum maximè crassius est partium & vilissimi pretij, quia in omnibus regionibus inuentu est facile, crustæ & lateris figura. Quia facile opinor liquatur, liquidum dicitur.

Rotundum & astragali figura in medio est amborum.

Gypsum vrendo seu vt vocant coquendo vt petra in calcem vrendo coquitur. fit emplastricum: vstum verò præterea vt quũ in fornacẽ & camino lapides iungit, aut calcinatum vt vocant, minus est emplastricum.

Spuma nitri aphronitru, nitrum videri desierat, nec probò salem petræ ipsorum loco medicamentis misceri: mallẽ nitru candidũ, quod mihi ex agro Nauarrae datũ est minimũ falsum.

Nitrum præstantius est album rubro permistum, lucidum in fracturis laminosum, fragile, seque, spongiosum, falsum, mordax naturale.

Sal fossitius, vulgo sal gemma, quibusdam videtur, sed Mesuæ salnaphthicus, omnium valentissimus, secundo loco sal gemma, tertio mineralis, infirmissimus est marinus.

Sal Armeniacus, Hammoniicus quoque Dioscoridi & Galeno dici videtur, subacer est ac leuissimus.

Diosc. Stimmi vel stibium vulgo antimoniū, optimum, splendidissimum, & modo nitedularum emicans, confractu crustosum, terræ & sordium expers, friabile.

Diosc. Chryscolla laudatissima est armeniaca, colorē porri quā simillimū reddens, pura, terræ & calculorum expers.

Cyanus, in cuius fracturis velut stellę quędam aureę scintillāt, vnde lapis stellatus Mesuę dicitur, & vitione fit cęruleus magis : probatur maxime saturatus colore nominis sui Diosc. Mesuę verō est colore viridior & cęruleus, maculis aurcis interceptus, gravis, metallorum expers.

Armenius lapis præfertur lævis, perquam equabilis, calculi expers, colore cęruleo, friabilis. Diosc. colore ex viridi obscurus, terreus, & indus, maculis viridibus & nigris distinctus, attactu lævis & asperitatis expers, nondū exacte lapis, sed friabilis & pulueratu facilis Mes.

Ochra eligenda leuissima, & omnino lutea, friabilis, non lapidosa, vritur & lauatur vt cadmia. Diosc.

Lapidum in medicamentis Gręcorum rarissimus est vſus.

Iaspidem viridem Galenus, omnem iaspidem medicamentosum tradit Diosc.

Arabes quoque compositis quibuscum cardiacis sapphyros hyacinthos, granatos, sardines, margaritas commendant. De his Albertus Magnus, Serapio & alij plerique multa prodiderunt, quā vere æstimato.

Diosc. Hamatites probatur friabilis, saturato colore, niger, durus, & suapte natura æqualis, nulla sorde admixta, nulloque zonarum discursu.

Diosc. Magnes ferrum promptè trahat, sit colore ad cęruleum vergente, densus nec admodum gravis.

Lapis iudaicus merę striatę forma, tener & friabilis.

Corallus lapis Aethario dicitur. alius arbor lapidosa, ruber & niger est Diosc. Nobis etiā albus & aliter coloratus. Vſus mihi foris albus, intus ruber.

Sigillum Lemniū, in placentulas quasdam exiguas formatum characteribus turcicis signatum, colore nunc pallido nunc rufo, sapore parum astringente.

Bolus Armenia colore ochra, id est pallida vel lutea, promptissime in summum læuorem calcis modo soluitur pistillo aut quouis liquore, arenosa substantia caret. Tam callide hæc vt sigillum Lemnium & alia pleraque adulterantur hodie, vt pro veris recipienda non sint, nisi ab eo qui collegerit, fides sinceritatis fiat.

PARTIVM AB ANIMALIBVS SVMP TARVM DELECTVS.

S ANGVIS hirci quadrimi, bene habiti, aliquandiu nutriti vino albo & herbis, calculum frangentibus, vt feniculo, fœli, lauro, augusto mense iugulati, medius effluens eligatur: nam primus tenuior, postremus crassior putatur. Vase vitreo receptus, luteo raro testus, sole siccetur.

Sanguis draconis veterum, hodie ignoratur. Qui verō ostenditur, factitius est ex hirci sanguine, bolo armenia, & succo sorborum vel alijs.

Lac vaccę, caprę, asinę iuuenis, aliquandiu post partum exercitę, & bene pastę præsertim idoneis sibi pascuis, vernū largius sed humidius, autinale parcius ficius, & butyro diu seruando aptius. sit autem quatenus lacti datum est, dulcissimum, albissimum, consistentia medioeri, si vaccinum est: tenuiori, si asinum vel caprinum.

Serum lactis caprę iuuenis nigre, salubribus alimentis nutritę, paulō antè fœtę præfertur Mesuę, secundas tenet serum lactis ouini.

Adeps ex animali florente autumno lectus, reponitur vel incuratus, lotus, siccatus in vmbra, vel exemptus pelliculis fusus sole vel igni, in vase duplici. Alij tosto in veru animali cadentem excipiunt.

Medulla vt adeps sumatur a fine æstatis, ad hyemis initium, ex florenti animali: & reponatur loco sicco & edito, & septentrionē spectatē: reponatur cum folijs lauri siccis, ne putrescat, aut situm ducat. Recens etiam tenerorum animalium vsurpatur.

Cerebella passerum vere & autumno captorum reponuntur, cum vitello oui & melle, vel sole aut cinere siccata legitimum.

Cornu Rhinocerotis eligatur.

Mumia Serapionis cum sit Dioscoridis pissasphaltum, id est pix & bitumen, ex horum

notis noscitur. Quod verò nobis hodie est mumia, liquamen est hominum aloë, myrrha, & si datur balsamo in sepulchro conditorum. Carnes enim cum humanis ossibus retorridæ ad nos afferuntur.

Tunicam internam ventriculi gallinarum quia inutilem confirmat Galenus, de illa ne labora.

Iecur lupi si potes florētis & bene habitū aut etiam teneri potius, & recens quam siccātū est præstantius. Potest tamen siccātum in multis diebus seruari, vt pulmo vulpis.

Renes scinicorum, qui crocodili sunt terrestres, siccati seruentur, copulenti & non strigosi. Diosc.

Castoreum elige, id est castoris testes, qui ex vno principio committuntur, & quibus est intus liquor cerosus, friabilis, odore graui, & virus olente, gustu acri & mordaci, recens tamen melius veteri quibuscumque est. Nigrum autem fetidum, rancidum, die vno necare sumptū affirmat Auicenna de venenis. Diosc.

Ocypus, id est succidarum lanarum pinguitudo seruetur purus, ex ouibus integris non scabiosis. Hyssopus humida ineptè vulgo dicitur.

Ambra quam habeat originem ignoratur adhuc: præstantissima tamen fuerit rara, læuis, habitu rha Barbari, sed fusca magis interdum & cineritia & alba, odoris gratia multum commendabilis, nigra autem reicienda, & quam vulpes deuorant & vomuerint.

Moschus melior est sublauius quam nigricans, & qui pelui humectatæ immixtus leuior euadat, quam qui grauior. Ex Catay tamen niger præstantissimus hodie offertur. Ferrugineus fere est noster, non quæ Auicenna probat citrinus, Alexandrinum vocās, est odore in opum Cyrenaicum inclinante sed valentiore, præter summam aliam in eo fragrantiam glebulis exiguis constat. seruetur melius pyxide plūbea cera obturata per se. si autem odoris gratiam perdidit, reponere vase vitro aperto, & suspende in cloaca. sic enim recuperabit, si Planteario credimus. Diosc.

Cantharides probantur in frumento inuenta, versicolores, & quæ luteas in alis transuerfas habent lineas, corpore longo, crasso, præpingues. Sed inertes ac imbecillæ quæ vnus fuit coloris Capiantur vere, & phiala seruentur: necentur autem vt iubet Diosc.

Gallus ad ius purgatorium eligatur, rufus, plurimum annosus, sed tamen adhuc ad motū pugna, coitū alacer, & in dimicatio validus, macri & pinguis medius, hoc est bene carnosus. præparatio autem eius ex Mesue repetenda. Mef.

Vnguis odoratus, Blattæ Bizantis Aquario, blatta bizantia vulgo, conchylij, tegumentū est odore castorium referente, ad suffitus idoneum. ipsa enim testa mox liquatur igni bituminis modo, quod etiam improbe ipsa olet, quidam albicantem odoratā magis cōmendant.

Vniones seu margaritæ ex quodam conchaliū genere auulsi, sint corpulenti, integri, non perforati. Sunt qui à natura perforatos præferāt, quod per foramen excrementis sint purgatæ.

De viperarum delectu lib. 4. nostre Methodi in theriacis cōpositione, quantum satis est diximus.

Ladanum sit nigrū, molle, glutinosum, graue, odoratum, friabile autem vetustate elāquit.

Ex prædictis aromata sunt amomum, cinamomum, casia, calamus odoratus, nardus Gallica & Indica, partes balsami, crocus, folium, folium malabathri, ladanum, aspalathum, xylaloe, macer, & recentioribus Ambra, moschus, vnguis odoratus, caphura, cubebæ, doricum, galanga, cariophyllum, macis, nux moschata, santalum triplex, cornu monocerotis, cedaria. In his quæ odorata magis sunt, in suo genere sunt præstantiora. Sapore autem si explorabis, permulta continenter ne gusta, sed vel os interea ablue, vel papyrum mande, vel tempus interpone, donec prioris aromatis sapor exoleuerit, vt non prioris reliquæ iudicium tibi falsum afferant posterioris aromatis. Hæc cum sint essentia tenuioris, celerius exanimantur, præterim aere calido, parum fideliter operculata & inuoluta, aut etiam iam comminuta. Ob id vtenda cum vigentissima sunt, nondum verò cariola, foraminulenta, exoleta, exanimata, emortua.

Ex his item purgantia sunt agaricus, colocynthis, cucumer agrestis, elleborus vterque, rithymalli, daphnoides, opopanax polypodiū, sagapentū, sarcocolla, dracuncululus, scāmonei, euphorbium, casia fistula, myrobalanus quintuplex. Hermodastylus, lapis cyaneus & armenus, manna, rha barbarū, Tamar indi, turbit, senna, & alia quædam Mesue & alijs tradita.

Quæ maiore cura & studio sunt eligenda, reponenda & seruanda: & quæ vi malefica sunt prædita, castiganda, vt libro sequenti dicemus.

Adulteria, quod imprimis ad delectum conferant, ob id in hunc librum reieci, ea quæ sim plicibus ipsis dolo mentitis adscripsi, ne longius lectori disquirēda essent: fusius tamen hæc

ipsa persequi non placuit ob dictas à nobis causas lib. 3. methodi medicamēta componendi. vnde in hunc librum siqua de adulteratorum notis desiderabis, transferre potes.

Supereſt in hoc etiā primo deſcribere analoga quę vocant & antiballomena, quodd hæc ambo non parū ad medicamentorum delectum cōmodare exiſtitem, vt libro ſequenti agamus tantum de multiplici præparatione medicamentorum ſimplicium ad compositionem vtili, veletiam neceſſaria.

Cum nomen alicuius ſimplicis medicamēti cōmune multis ſcribitur ſine additione, quod ex illis intelligendum ſit quia ingignius vel rei propoſitę aptius . vt ammi, aniſum, anethū, apium, cnicus, cuminum, gith, lybiſticum, naſturtium, pſyllum, ſeleli, ſtaphyſ agria, ſemine ſunt efficaciora. Ergo apium ammi, aniſum, anethum, id eſt ſemen. Adhęc, aniſum Creticum, ammi Illyricum, melius.

Aloe optima qualis Galeno Indica, Meſuę ſuccotrina.

Acetum, ex vino. Nam ex hydromelite, ceruiſia, & alijs fit, ſed inefficacius.

Agaricus, albus & ſeminus & qui notas omnes optimi agarici à nobis prius ſcriptas habeat, & in cæteris ſimiliter.

Agnus, ſlos aut etiam ſemen.

Alumen, ſeiſile quia præſtantiſſimum.

Aristolochia, rotunda. In vnguentis vero clematidis.

Amomum ſcythicum, & cum notis ſcriptis.

Baſamum, opobaſamum.

Bryonia, alba potior quam nigra.

Bugloſſum vtrunque, id eſt, folia & flores.

Cafia vel caſſia in libris Græcorum noſtrum vulgare cinnamomum. quę in libris Arabum caſſia lignea dicitur.

Caſſia vero fiſtula ponitur quando medicamentum Arabum eſt purgatorium.

Cardamomum, maius.

Capparis, cortex radicis.

Coriandrum, Cuminum Aethiopicum, ſemen.

Centaurium, in purgantibus, minus in alijs, maius.

Calaminthe, montana: quia efficacior domeſtica.

Coſtus cum reuera vnius ſit generis ambiguitatem non habet. Radix autem eligatur. Nam dulcis coſtus arabum ignoratur.

Cypreſſus, pilule eius ſeu nuceſ recentes.

Cinamomum, optimū & cum notis ante ſcriptis.

Daucus, agreſtis. Nam ſatiuſ eſt paſtinaca, alimentum potius quàm medicamentum.

Elleborus albus Galeno. Niger Meſuę.

Eruca, ſylueſtris quia efficacior.

Epithymum Atticum Græcis. Arabicum Arabicis compositionibus uſurpandum.

Fœniculus, ſemen: ſed in colyrijs, ſuccus foliorum aut radicum.

Galla, ſolida: quia efficacior, quam perforata.

Granatum, acidum.

Gummi, Arabicum. Id enim omnium perfe&iſſimum.

Gluten, ichthiocolia his, alijs taurocolla, alijs maſtiche intelligitur.

Hyſſopus, montana hortenſis melior. Cilicium Dioſc. Creticam alijs laudant.

Hyocyamus, albus, ſeu album eius ſemen.

Iris, radix ireos Illyricę. Græcis, neotericis, florentinę.

Lupinus, amarus, Nam dulcis eſculentus eſt.

Laurus, folia.

Liguttiſticum, ſemen

Lactuca, ſemen: ſed in vi&us ratione, folia.

Lapathum, oxylapathum efficacius rotundo.

Lithargyrus, auri, quod aliquando tamen exprimitur.

Maſtiche, Chia: alijs etiam Aegyptia.

Marrubium, album præſtantius nigro.

Mel apum. Alterum aeromeli, ſeu manna.

Margaritę ſolidę, meliores pertuſis, niſi etiam ſint ſlauę, obſcurę: quia tunc ſolidis ſunt pares.

Medul la, ceruina in valenti medicamentorū mitiori, vitulina.

Nuclei pini: alijs, oliuæ, daſtyli Auicenne.
 Nux iuglans, vſualis vulgo & communis
 Naſturcium, ſemen
 Oleum, oliuum ex oliuiſ expreſſum
 Ozimum, in arabibus Cariophyllatum.
 Opum, Thebaicum. Tamen Apulum etiam hodie celebrati audio.
 Petroſelinum, Macedonicum: & in hoc aſtreoticum, à loco in Macedonia vbi creſcit opti-
 mū in præruptis: & huius maxime ſemen.
 Pruna, ſi alius deiſcenda eſt, dulcia: ſe aſtringenda, acerbæ vel auſtera.
 Papauer, album ſemen.
 Piper, album quia acrius.
 Pix liquida in ſuppurantibus & tergentibus medicamentis: ſicca, in ſiccantibus epuloticis,
 glutinantibus.
 Pæonia, mas ſeu ipſius radix, vel ſemen.
 Polypodium, quernum, murale alijs.
 Polium, in antidotis, minus ſeu montanum quia acrius, amarius, ob id efficacius.
 Quatuor emollientia malua, althæa, violanigra, acanthus.
 Quatuor ſemina frigida, maiora, melonum, cucumeris, cucurbitæ, citruli.
 Quatuor ſemina frigida minora, laſtucæ, portulacæ, intybi, cichorii.
 Quatuor ſemina calida maiora, cumini, cari, aniſi, ſceniculi.
 Quatuor ſemina calida minora, apijs, dauci, ameos, amomi.
 Quinque radices vreticæ, id eſt vrinam mouentes, apijs, petroſelini, aſparagi, graminis,
 ruſci ſeu apijs veri & eleoſelini.
 Refina, Galeno maſtiche: Dioſcoridi, terebinthina.
 Ruta, folia rutæ agreſtis, ſed ſere à Græcis exprimitur, aut alio nomine vocatur ſcili-
 cet moly beſafa hermola.
 Raphanus, ſylueſtris radix
 Roſmarinus, ſſos aut folia.
 Rhus, cortex fructus, ſumach dicti.
 Steechas, ſteechados Arabicæ ſſos.
 Styraç, calamites ſi habere poſſit, aut ſaltem calidiſſimus & vegetiſſimus.
 Santalum, ſſaum, quia odoratiuſ.
 Spica, nardi Indicæ.
 Sulfur, viuum, & igni non exuſtum.
 Tragacantha, alba in frigidis compoſitionibus: ruſa, in calidis miſcetur.
 Tres flores cordiales, violarum, bugloſi vtriuſque.
 Thymum, Attricum, aut ex locis editis & ſiccis.
 Viola, nigra ſeu purpurea: vulgo martia & quadageſimalis: & recens ſi haberi poteſt, &
 folia, ſi emolliendum eſt: ſſos, ſi cor roborandum: ſemen, ſi purgandum.
 Viſcum, quernum, ipſius baccæ recentis, aut recentis ſumma germina cū folijs & cortice.
 Zizipha ſeu iuiubæ, recentia & bene matura, aut ſaltem integra, non putria aut vetuſta-
 te exucca.
 In ſumma, intelligantur omnia ſuis notis prius dictis omnibus abſoluta inter quas etiam
 ratio regionis vbi medicamentum educatum eſt habebatur, Ob id
 Alumem, Miſcium
 Agaricus, Ponticus
 Caſtorium, Ponticum
 Miſy, Cyprium
 Nitrum, Berenicium
 Sinon, Syriacus
 Cuminum, Hiſpanum & Aethiopicum
 Meum, Hiſpanum & Macedonicum
 Ariſtolochia, Pontica vel potius Cretica
 Phii, Ponticum
 Erugo, ccruſſa, æs, æris ſquamma, ex Puteolis vrbe Italiæ.
 Lithargyros, optima Romana & Sicula.

Aniſum	} Creti- cum
Thymum	
Daucus	
Amaracus	
Glycyrrhiza	
Origanum	
Diſſamnus	

FRANCISCI SYLVII MEDICI

ANTIBALLOMENA seu medicamenta in locum alterius desiderati supposititia, magis consentanea rationi sunt, loco
 Aquæ pluviæ, aqua fontana pura.
 Acaciæ, succus & caro prunellorum agrestium.
 Asari, acorus vel carpesium.
 Absinthij, Abrotanum.
 Acanthæ, Arabicæ seu Aegyptiæ herbæ (quæ succha dicitur Serapioni) acantha leuce nostras, eidem dicta bedegar.
 Alicacabi, semen solani. Asphalthi, pix liquida Brutia,
 Aethiopice oleæ lachrymæ .i. gûmi elemij, gummi acaciæ seu gummi Arabicum.
 Anchusæ, hyacinthus.
 Amyli, sicca farina.
 Arsenici sandaracha.
 Amygdali amari, absinthium.
 Aristolochiæ cuiusvis, vna ex tribus.
 Adipis vulpini, vrsinus.
 Adipis cervini, anserinus.
 Aluminis, sal fossitius.
 Balaustii vice, malicorium.
 Buccinorum, ostreorum testa vsta.
 Balsami liquoris, myrrha stacte vel caphurelæon.
 Cinamomi loco, casia optimæ vel carpesij vel amomi vel seminis cardamomi, sabinae duplum.
 Casie, seu casia corticis, cinamomum etiam ignobile, nisi optima casia requiratur quæ cinamomo est proxima, vel nardus indica, vel malobathri folium.
 Chamæmeli florum, duplum foliorum & radicum.
 Costi, pyrethri dimidium, vel bacæ cedri, vel radix helmi vel ireos.
 Cimoliæ terræ, retrimentum ferri & molæ.
 Cerussæ, spodium, pompholyx.
 Caphuræ rei incognitæ & sapore ingrata, santala alba & rubra.
 Cardamomi maioris, minus: Calaminthe omnis, metastrum, pulegium similia sunt facultatibus: ob id inuicem sunt antiballogena
 Croci, corcomagma.
 Cyperi, iuniperus maior.
 Cumini, semen rutæ vel agni.
 Colocynthidis, semen ricini.
 Capparis radicis corticis, cortex radicis Tamaricis vel ericæ,
 Distamni loco, salvia vel nepitha vel pulegium.
 Doronici, caryophylli dimidium.
 Dauci, pastinaca.
 Elaterij vice, succus foliorum cucumeris agrestis.
 Ebeni, lignum gaiaci
 Eupatorij Mesuæ, asari & absinthij ana dimidium.
 Folij loco, folium caryophylli vel nardus indica vel casia vel macis.
 Ferruginis, squamma ferri.
 Fimi palumbis, fimus columbæ.
 Fellis suilli, fel perdicis vel piscium.
 Gentianæ loco, asari & radicis capparis ana dimidium.
 Glycyrrhizæ succi, pulvis radicis.
 Gnidiij cocci, semen lathyridis.
 Galbani, sagapenum.
 Hammoniæ loco, propolis.
 Hermodactyli, folium anchusæ & dimidium bdellij foris admoventur dolentibus iuncturis.
 Hederae gummi, gummi persici.
 Iridis Illyricæ loco, helenium odoratum.
 Lapidis Asij, gagates.
 Lapidis phrygi, magnes, pyrites.

Libyſtici feminis, ſemen dauci.
 Lanarię radice, radix Veratri nigri.
 Lycij, ſuccus radice centaurij magni.
 Mellis loco ſaccharum.
 Malabathri, caſia, nardus Indica.
 Myrrhæ, ſmyrnium.
 Myrrhæ Troglodyticæ, calamus odoratus.
 Marrubij, meliſſo phyllum.
 Meſpili tricocti, id eſt, azaroli, meſpilum noſtras quinque oſibus præditum.
 Naſturtij feminis loco, folia eius ſicca.
 Nucis moſchate, ſpica nardi.
 Nardi ſyriacæ, iuncus odoratus ſeu ſcœnanthum.
 Opopanacis loco, hammoniacum, galbanum, ſagapenum, bdellium.
 Opij, meconium.
 Ozimi caryophyllati, meliſſa in affectibus cordis.
 Olei laurini, oleum cedrinum vel cicinum.
 Olei omphacini, ablutum oleum dulce.
 Olei roſati, violarum, amygdalinum.
 Olei cicini ſeu ricinini, raphaninum.
 Opobalfami, apocarpafon vel myrrha ſtaete.
 Orizę farina hordei.
 Oſſis, medulla cerui.
 Omphacij, ſuccus rhois, id eſt ſumach vel vinum auſterum.
 Piperis longi loco, album.
 Piperis albi nigrum optimum, id eſt grauiſſimum.
 Petroſelini Macedonici in Thiriaca: alterius regionis petroſelinum.
 Pompholygis, ſpodium & antiſpodium.
 Rubiginis loco, ſcoria ferri.
 Raphani feminis, ſuccus.
 Roſarum, flos iſparum.
 Rhois coriarij, rhus obſoniorum.
 Staphydis agrię loco, pyrethrum.
 Struthij in ſternutamentis, elleborus albus.
 Spodij, antiſpodium aliquod, pompholyx.
 Stryracis, caſtorium, niſi odor quæritur.
 Salis indi, ſaccharum candefaetum.
 Sagapeni, hammoniacum.
 Spumę nitri, nitrum, aphronitrum, modo non ſit in corpus recipiendum.
 Sulphuris viui, coctum & uſtum.
 Satyrj, ſemen crucę, ſcincus.
 Sinapis, cardamomum, vel cardamum.
 Scammonij, ricinus.
 Stibij contuſi, ſquamma æris, ſtannum uſtum.
 Sepiæ oſis, pumex.
 Scillæ, pancratium.
 Terebinthinę loco, larix ſeu laricea reſina.
 Thapſiæ ſucci, cardami vel crucę ſemen foris adhibetur.
 Veratri albi loco, nigrum.
 Vini ſalerni, quoduis ſuluum, tenue, perlucens, odorum vehementer.
 Zingiberis loco, pyrethrum foris adhibetur.

Qua autem ratione pro deſideratis iſtis, alia hic aſcripta ſupponi poſſunt: ita & cõtrà ſi quod horum ſuppoſitiuorũ deſideretur & aliorum eſt poteſtas, in horum vicem ponentur. poteſt quinis alia multo plura pro varijs locis & affectibus & hominum proprietate facere antiballomena, ſed nolim pharmacopœo licere vel clementiſſimũ mutare ſine docti medici cõſilio, ne audaculus fiat etiam in alijs. Quomodo enim pluriſ eſt rex ipſe quam prorex: ſic maiorum eſt virum & compoſitioni propoſitæ aptius ſimplex quod à maioribus eſt aſcriptum, quàm quod illius pœnuria ſupponitur. Sit itaque religioſus & formidoſus in his permutationibus tam medicus quàm pharmacopœus.

De Medicamentorum simpli-

CIVM PRAEPARATIONE,

LIBER SECVNDVS.

H

AE C pharmacopœtię pars vilis & hominis eruditi ingenio indigna ne mini debet videri, cū medicamentorū cōpositorum facultates propemodum totę ab hac proficiscantur. Quę enim vis, quis vsus simplicium medicamentorū citra triturā, cōctionē, infusionē, & alia pleraq; post dictenda, esse possit? Quę mistio ad cōpositionē omnino necessaria sine his pręparationū modis fiat? Quām autem facultates nō simplicium modō, sed etiam cōpositorum, varient, vel sola pręparandi ratione tam aperte postea condiscas, vt neq; testibus neq; demonstratione longa opus sit. Quoq; difficilius fuit rem ā nemine hactenus tentatā ceu nouam excitare, & in hominū manus & animos ponere: eo mea sententiā erit & pręclarius. Quāq; enim Hippocrates, Galenus, alijq; celebres medici, vt interim empiricos taceā, leuiter simplicium medicamentorū quorundā preparationē attigerunt, & nōnullos se priores medicos de pręparandi ratione quēdā scripsisse testetur Galenus: tamē nullus hodie extat quē sciā, qui hac de re aliquid memoria dignū absoluerit: pręterquam quod pauca quādam, sed tamen legi dignissima, de quatuor pręparandi generibus, tritura, cōctione, vñsione, infusione, Mesues in sua methodo deligendi medicamenta purgatoria & castigandi perstrinxit. Nam quę feruitor nescio quis partim ex Dioscoride deprauauit, partim ex indoctis collegit quis ferat?

His nos rationibus cōmoti ex Hippocrate, Dioscoride, Galeno, alijsq; permultis quorundā simplicium preparationes passim dispersas, in ordinē congestissimas, multas ipsi & inuenimus & experti sumus, & ā doctissimis hac ætate pharmacopœis didicimus. Quę dum ā nobis stylo mediocri scripta legis candide lector, tecum reputa nos rudibus introducendis hac scribere, quorū captui seruire malui res nudas docēdo, quām singulorū rationem prolixius afferre: quanuis & id ad rem propositam felicius absoluendam, plurimum pertinere videatur. Porro pręparationem exequi statui medicamentorum simplicium tantum, non aliarum etiam rerū per quas omnes pręparationis ratio & virtus spargitur: vt nihil ā natura gignatur, augeatur, aut alio quouis modo moueatur citra preparationē: nihil artes tā mechanicā quām alię omnes tentant non adhibita prius pręparatione aliqua, per quam ars sæpe naturam vincere videtur.

Medicamenta preparare est, ipsa per artē vsui vel cōpositioni cōmodiora reddere, hoc est vel mitiora, vel valentiora, vel gratiora, vel salubriora, vel magis miscibilia, & vt paucis dicā meliora vel ad vtendū vel ad cōponēdum. Quēdā enim vbi ā nobis sunt pręparata, etiā citra cōpositionē mox vsurpant. Plurima autē pparata ante vsū ad cōpositionē veniūt. Ad pręparationis quoq; vim (de qua paulō post dicā fusius) reducēdū putamus cū vnā medicamētū facultatē nobis in præsens noxiā tollimus, vel opatā detegimus, vel nouā acquirimus.

At verō medicamenta omnis generis metallica in quā plantas, animātia, vt ex iisdem sæpe alimenta, paramus interdū adhuc viuētia frequentius emortua. Terrā enim Lemniā (quā dū adhuc in colle est ex quo effoditur, velut in matre viuere videtur) sacerdos Dianę dū su-
libr. 9. mir spatio tritico & hordeo pimenta ritu patrio faciens preparare videtur, vt hinc magnā
simpl. virium suarū partem, nisi etiā vires suas omnes cōsequi putetur. Nōne arsenicū in sandarachā & fori in chalcitē, chalcitis in misy promptius in vena ipsā transibit si specū ipsum soli meridiano aperueris? Ratione eadē vomica hydragryri si in solē erumpat tenuior euaserit, & sulfur in vesuio vel alio monte vñsum minus quidē oleosum sed tenuius euadit. An non longa & asperimā hyeme, qua ventres ac viscera terrę plus calidi habent, metalla omnia largius gigni & plenius augeri recipimus? Nā & mihi aureę quēdā velut arbores in durissimis quibusdā lapidibus visę sunt, & velut quēdā arbores ex auro & argento rudimenta, vt non ambigā quod doctē Augerellus in chrysopœia scripsit, metalla in momenta gigni, nutrirī, augeri, perfici, etiam si puteus Hannibalis & metalla Ilne Tyrreni maris, insulę inexhausta, & alia pleraque huius rei testimonia dare fidemq; facere poterant.

libr. 9. In fossam super collem in Cypro pluuiā recepta per venā misyos, chalciteos, foreos trās-
simpl. fusa in specū subditū, quēdam est chalcanthi pręparatio aut verius generatio.

Viuentem raphanum insertis in eius radicē fibris aliquot ellebori nigri, purgatricem

facimus, & fructus arborum purgatorios scarificato ipsarum cortice quo tempore salua cō Mesues in
scendit & immisso in plagas scammonio ceraque super vulnus data & deligata. canonib⁹

Tempus præterea expectamus idoneum donec matura sint vel vigenia vel sicca quæ le- vniuersali
turi sumus, & eælum plantę propitium, sæpe etiam lunę quadraturas spectamus, vt effica- bus,
cior sit planta tūc collecta. Dum arbores ablaqueamus, dum vites putamus, propagamus, sar-
rimus, decacuminamus, festuamus: harum plantarum fructus nō modo vberiores, sed etiā
meliores reddimus.

Idonea victus ratione nutritis lac præparamus, vbi nutritius affectu aliquo laborat, quo-
modo & asininum Galenus lib. 7. Meth. & vaccinum recessu Tabiarum lib. Meth. quinto.
Porcos, capros, arietes, tauros iuuenes castramus, vt eorū caro sit suauior, plenioris alimen- lib. 3. aliū.
ti, coctū facilius.

Glandulæ mammarum præsertim vaccinarum & suillarum dum lacte suo rument, me-
liores quam exuccæ: vnde & sumen porcæ recens scetæ à gancōnibus laudatum legimus.

Coagulum in primo ventriculo animalium lacte nutritorum ex lactis corruptione geni- Ibidem.
tum venatu animalis efficacius euadit, vt animalū prope omnium, non solum ferorū caro.

Gallum veterem venatu quoque exercemus, & meliorem ad purgandum clementer suo
succo niroso reddimus. Vulpes ætate florentes venatu multo fatigatas si bene habitas si o-
leo incoquimus, multo digerentius oleum efficitur. Si vero eas viuis impinguitas post vin-
demias capimus, esu sunt iucundiores.

Porci segetibus nutriti firma fiunt carne, glandibus vero præsertim faginis, laxa & flu-
xili & prompte liquabili.

Hircum quadrūm dum mensibus aliquot antequam iugulemus, herbis nutritimus calcu-
lum frangentibus, & vino albo generoso potamus, hoc modo sanguinem eius ad calculos in
renibus præsertim comminuendos efficacissimum paramus.

Cancros dum Aescchion capiebat & vrebat post canis ortum, sole leonem ingressio, die
vero lunæ eius decimo octauo, contra rabiem hac ratione efficaciores sperabat, hocque mo-
do præparabat.

Viperas non mox vbi latebris ereperant, sed iam exercitas, iam consueto ante hyemem a-
limento recreatas, iam suo exuuiio inter lapidum coagmenta deposito, velut rediuuias Gale-
nus vult capi, sicque præparare incipit.

Pullas & capos iure & carne viperatū cum pane subactis nutriuit Matthæus Gradi, ad
vsque depurationem curaturus horum esu elephanticos.

Gallinæum pane in lac acidum & serosum merso si ante nutritimus quam iugulemus, lib. 3. aliū.
vt testes habeant gratissimos & præstantissimos, & si ante coctū ne virus ex semine oleant
Sic enim boni sunt succi valide nutriunt, facile coquantur Ibidem.

Hepar *σπυρτὶς*, id est ficutum præsertim suum fisis siccis multis nutritorum est præstan-
tissimum, sic pastum iecur anseris albi seu iecur anseris nutriti alimentis lacte imbutis sua-
uius, coctū facilius, melioris succi. Ibidem.

Capra aut aliud animal scammonium aut tithymallos depastum, lac reddit phlegmago-
gum, & quod alio pituitam deducat.

Stercus pueri ad anginam idoneis alimentis, & sterus canis ad alia esu ossium in viuīs Ibidem.
ipsis animalibus præparamus, & alia in his generibus plurima. Sed ad hanc rem hæc suffi- lib. 3. aliū.
ciant ad probandum quædam nos cum natura viuīs adhuc medicamentis præparare. Cum lib. 2.
vero hæc præparandi ratio licet sit efficacior, tamen haud ita crebro in vsu venit, vt for- simpl.
tasse quis etiam præparationis nomine non esse accipiendam contendere possit: ob id de al-
tera eius specie agamus, quæ omnino latissime patet in singulis medicamentorum simpli-
cium generibus. Fit autem hæc generatim quidem additione & ablatione, nunc substantiæ
nunc facultatis, nunc vtriusque, particulatim vero tritura, coctione assatione, vstione & cæ-
teris post scribendis.

Ad ablationē vero reduci volo seperationē partiū nūc simul manentiū, vt in tritura, nūc
à seinuicem abeuntū vt in despumatione, desillatione, succorum & liquorum extractione.

In singulis autem differentiis quæ additio aut ablatio aut additio & ablatio vel substan-
tiæ vel qualitatis, & eius vel vnius vel multiplicis fiat, abunde postea docebimus.

Nunc hæc omnes præparandi differentiæ quam facultatem habeant, & quibus modis per-
ficiantur, singulatim dicamus, primumque de tritura omnibus prope communi non sim-
plicibus solis sed etiam alijs præparationibus, postea de his quæ calore perfiuntur, dein-
de frigore, post hæc siccatione, Hinc humectatione & cæteris post elencho comprehensis.

DE MISTA MEDICAM. SIMPL.

DE MEDICAMENTORVM SIMPLICIVM TRITURA.

Menses in
Canoni-
bus.

M

EDICAMENTA teruntur, hoc est comminuntur, percussu vel friatu idoneo, ut simul misceri exactius possint. vel ut facultas ipsis noua conquiratur, vel ut malefica tollatur. Quos tres terendi scopos in methodo medicamenta componendi fusius explicauimus. Terendi autem modus plurimum est varius. Primum quod plurima pistillo ferreo, aereo, plumbeo, vitreo, ligneo vel

alia constante materia in mortario fere simili materia conftrato teruntur: sed pistillus ferreus & aereus mortario ferreo & aereo magis seruiunt: iisdem & lapideo & vitreo mortario etiam ligneus, sed plumbeus plumbeo, vitreus vitreo est aptior.

Secundo loco multa teruntur diu ducta super lapidem durum, ut marmoreum porphyrium vulgo dictum: marinum, quem maris squammam vocant. Ducuntur autem simili lapide sed paruo & manu concepto, quem molulam vulgo vocamus, quod molae paruae is effigiem habeat, ut lapis suppositus, magne.

Tertio teruntur medicamenta quaedam molis trusatilibus vel versatilibus, ut quaedam etiam moletrinarum molis, qui modus Lugduni est frequens in terendis aromatibus, quibus constant pulvis minutarum specierum, & pulvis selectus, quem finem vocant, & alij permulti suo cuique more commisti. De hoc non sum dicturus, sed de primo praesertim, & pauca de secundo.

Nec omittendum mortarii operculum saltem simplex aut etiam duplex, quale veteribus in usu fuisse in nostra componendi medicamenta methodo commemorauimus, praesertim puluerantibus. Nam humida hoc non indigere videtur. Ad trituram quae praeparandi species reducenda sunt seu ipsi affines, posterius audies: ut quod quaedam rapaci serra comminuntur, alia minutim coeciduntur, ut proprii teri possint, vel humori cui coequuntur vires suas tradere.

Non modo autem instrumentis variat terendi modus, sed etiam ipsius percussione vi-gore & tempore & rerum terendarum situ & connexione & futura consistentia. Quaedam enim per se omnino sunt terenda, alia cum alijs quibusdam ipsorum trituram saepe etiam facultatem iuuantibus: alia tum per se, tum cum quibusvis teri possint, & hac omnia tenuissime vel crassius. Item quaedam diu terenda sunt, alia trituram breuem uti & decoctionem sustinent. Item alia valenter tundenda, alia tantum clementer frianda ducto per mortarium mollior & nunc celeriter nunc segnitur pistillo, interdum & valenter.

Praeterea attritu cuique moderato non autem vehementiore aut immodico sunt verberanda. Violento enim ictu & nimis diuturno exanimantur, viribusque dissolutis languent, magis tamen tenuia, rara, facultatem imbecillam aut superficialiariam sortita, minus contraria.

De his autem omnibus agam singulatim, ubi docuero quibus horum modis, & quot singula medicamentorum simplicium genera terantur initio à radicibus sumpto.

Comunis
eritura ra-
dices.

RADICES si crassae sint nec adeo siccae in particulis secant, & alijs siccioribus particulatim adiectae, multis scilicet paucis, puluerantur cum ipsis: si autem sicciores sunt, aut per se aut simul puluerari possunt, sed ante vel cultello concisae, aut forpicebus aut manibus fractae, nisi siquas ante ad siccandam necessitatem concideramus in taleolas.

Diutius autem terendae sunt quae crassae, durae, solidae, densae, nervosae, membranosae, & fractu contumaces si in puluerem mollissimum comminui consilium est. Interdum enim minus teri volumus, praesertim dum ad coctionem tantum eas apparamus. Tales fere sunt radix acori vtriusque, omnis aristolochiae, althaeae, bryoniae, costi, helenij, gentianae, polypodij.

Parum diu vero terantur contrariae, etiam si laeuissimum puluerem requiritis: quales sunt radix calami odorati officinarum, ellebori vtriusque, hermodactylorum, pyrethri, ut mediocriter quae in harum sunt medio radices, ut apij, asparagi turbitibehen vtriusque, diastani vulgaris, doronic, feniculi, galangae, glycyrrhizae, graminis ireos, petrosilini, paeoniae vtriusque, rha barbari.

Herbarum.

HERBAE item teruntur, nunc virides nunc siccae, & ambae vel crudae vel coctae, vel crudae semel, iterum post coctionem, idque in usus varios. Nam virides fere teruntur in succum vel cataplasma erudum, coctae vero teruntur ut vel in apozema exprimentur, vel in cataplasma cerantur, praesertim siquid durum aut lignosum sint sortite. At siccae teruntur nunc in coctionem sed negligentius: nunc in puluerem, diutius quidem crassae, durae, densae, lignosae, lentae, minus contrariae. Quae dum ad consistentiam qua cerni possint eribro hoc illo pro scopis medicorum varijs, peruenerint, teri desinunt.

Herbae tamen propemodum omnes ante vel secantur, vel manibus franguntur quam terantur: terunturque fere mediocriter, & cum folijs interdum, etiam cum floribus. Sed tunc paulo minus diu terende uti & adiantha omnia, calaminthe, maiorana, origanum,

rosmarinus, thymus, præsertim cum hæc postrema sunt florulenta.

F L O R E S prope omnes siccati, parū diu terendi, quia cito puluerantur, & faciliè pul-
uerando exanimantur ac exhalant.

vt crocus

Epithymum Græcorum & Arabum

Genistæ flos,

Leucolorum omnium,

Meliloti,

Rorismarinī,

Nymphææ vtriusque,

Periclymeni

Rosarum omnium

Schœnuanthos

si ipsum haberi

possit.

Si verò cum herbis ipsis expetantur, flores paulò diutius propter herbas & harū sur-
culos, quibus hærent adhuc, terendi sunt, quasi ab his essent se creti, vt ab sinthij coma,
anethi coma, abrotani coma, chamædrys, chamæpitys, eufragia, melilotus.

Adde quòd floris nomine hoc loco venit non modo quod in medio est, magna ex
parte croci capillamētis simile, sed etiam folia id ipsum ambientia, nūc alba, vt in cha-
mæmelo, nymphæa alba, rosa alba & moschata: nunc lutea, vt in nymphæa lutea, chry-
santhemo: nunc rubra, vt in rosa rubra, in balauftio: nisi quòd croci nomine tantum ca-
pillamenta (quod ea in vsu sint sola) intelligitur: vt & Galenus sæpe in Cōp. ph. p. flo-
rem rosarum appellat, non folia illa ampla, sed in medio capillamenta.

Mulum autem terenda sunt chamæmelum, quanquam id essentia tenuis sit, quia ta-
men densum est, & odore vegeto ac diurno: ac etiam stæchas Arabica vulgo dicta, vt
etiam cum primis, vt Turbith, cœpta teri, ad postremum adhuc semitrita appareat. &
item heliochrysos, stæchas citri vulgo appellata, & spica nardi in quancunque planta-
rum partem reponatur, etiam si prius minutissime incidatur.

Balaustum quoque, diu teri debet ob lignosa sua folia, quod autem intus est fibrosus
si per se terendum sit, promptius multo dissoluitur.

Capparis flos siue adhuc gemma sit, siue iam apertus, siue iam in fructum seminis ple-
num excreuit, fere muria conditus in vsu venit, & eius loco flos genistæ aceto & sale
conditus.

Si tamen siccatur, mediocriter diu teretur, & flos lupi salictarij foliosus, qualis etiam
vlmo est.

Caryophylla crassæ substantiæ ægre teruntur, siue flores sint, siue aliud.

Rosæ igni vel sole inter papyros siccata, forpibus minutim cōcise, per se aut cum
alijs teruntur: cum alijs autem etiam citra siccationem illam, atque adeo recentes solum
se & quomodo & quosdam incidere non terere tamen, vt saccharum rosatum fiat, scri-
bit Mesues. Cum vero specimen edis, ne sicca: sed cum alijs tere, vt vites calumniam.

S E M I N A prope vniuersa medio inter radices & herbas modo puluerari desiderat. **Fructus**
Ob id cum omnia hæc simul terenda veniunt radicebus iam cœptis comminui, semina & seminū
iniciuntur, quibus etiam abunde iam comminutis, herbæ minutim cōcise adijciuntur,
& omnia simul conteruntur.

Talia sunt

Agnus, Apium

Amomum

Anisum

Anethum

Ammi

Basilicum

Carum

Cardamomum

Coriandrum

Cuminum quando autem vreticum

volumus multum teritur

Coccus baphica

Eruca

Eruum

Erysimum

Fœnum Græcum

Linum

Lithospermum.

Lupinus

Lenis

Melanthium

Psyllium

Papauer

Seseli

Staphys agria

Sinapi

Thlaspi

Vrtica

Et ex fructibus pilulæ cupressi, colocynthidis medulla siccata & minutim secta,
Carpobalsamū, cubebæ, galla, nux moschata, piper, & præter hos dactyli, iuniperi bac-
cæ, ficus, zizipha, myxa, pruna passa, vux passæ. quāquam fructus hi molles sint, purgati
tamen nucleo & incisi cum alijs quo dixi ordine teruntur, si in compositionem veniant:
& in puluerem abeunt, si pauci siccioribus multis miscetur, aut tritici cernuntur per cri-

brum manu, aut cochleari ad mollem medicamenti formam, vt dactyli in diaphœnico.

Myrobalanos verò omnes multum tenuiter conterere iubet Mefues, quando earũ substantiã in corpus rapi volumus, & viscera ipsa astringere, & cõtrahendo velut obstruere consilium est. Eadem ratione, rha barbarum.

Siccata diu in sole semina cucumeris, cucurbitę, melonum & similia, quę postea cultello concidi docebinus, per se in farinam puluerantur.

Ex seminibus autem coriandrum, cardamomum tam maius, id est, granum paradisi, quam minus, lithospermum, & cuminum, vt sit vreticũ: & ex fructibus myrobalani Arabum omnes vt nuper dixi, ac folliculi sennę tam diu quàm radices ipsę teri postulat: ob id cum ipsis iniicienda.

Quę verò seminum vel fructuum medullę sunt oleosę, vel cultello super papyrum identidem mutandam incidantur, vel cum saccharo purissimo & siccissimo pauco seorsum terantur. Tales sunt medulla seminis cucumeris, cucurbitę, citreoli, melonis, bombacis, enicis, staphydos agrię, & fructuum medullę, amygdalarũ, anacardorum, balani myreplicę, pineorum nucleorum, pistatorum, castaneę, auellaneę.

Nux autem moschata ferẽ postrema iniicitur, vt in puluerẽ minutari specierũ. Nam si prima iniiciatur, reliqua puluerari prohibet, suo lentore oleagino.

Semina prædicta incidi solita, si humidis miscenda sunt, per se teri possunt: si siccis, cum horũ multa copia semina hæc pauca teri possunt, vt succus glycyrrhizę, bdellium, succi, liquores prius particulatim concisi, possunt etiam (vt dixi) diu insolati per se puluerari.

In diaprano quoque semina frigida maiora & similia si addatur, cum saccharo multo hæc pauca teri possunt: sic in diaphœnice amygdalę possunt incidi, vel cum saccharo teri. Sic papaueris semen quidam per se parum prius in mortario quassant, vt verberatum excipiat cultelli. Deinde cultello, vt prædicta incidunt.

Hęc verò medullę si compositis cardiacis sint miscendę, vtendi tempore inciduntur & miscantur potius quàm cum alijs terantur. Nam vix bene mensurę vnum seruantur integrę, sed rancescunt, & compositum vitiant, nisi parcum sit compositum, & mox absumendum.

Succorũ
& aliarũ
plãtę par-
tium tri-
ture.

s v c c i siccati, liquores, gummi, resinę si rectes sunt, ob id humidi & molles, ele-ctarijs mollioribus, catapotijs, vnguētis, ceratis, emplastris per se misceri possunt, vel cum alijs mollita & subacta, vel aliquo his remedijs idoneo humore soluta.

Vbi verò iam paulo mediocribus sicciores euaserũt, vt iam cõminui possint, in mortario, interdum quidam horum friantur magis attritu blando pistilli, præsertim calfacti elementerq; ducti per fundum & latera mortarij, quàm verberado tundantur. Nam sub violento ictu latefcunt, mortarioque contumaciter, hærēt lentore omnibus communi, his tamen maiore quàm illis, ac exhalant, exanimanturque. Quod si immodicę siccata sint, quanquam tunc facilius puluerantur, tamẽ velut exanimata, & viribus priuata reijciuntur. De moderate siccis igitur aut paulo siccioribus nobis sermo est futurus.

Scammonium igitur (est enim id aliquãdo succus, vt etiam Mefues docuit, sed multo inferius scammonio liquore) & siqui similes succi ad consistẽtiam tam corpulentam siccando ducuntur, per se friando in mortario teri possunt: sed ferẽ longius requirunt tempus, & si parua sint copia, bonam sui partẽ mortario affixam relinquunt: quod damnum in magna mole negligimus, tamen multo satius est in eo mortario prius amygdalas triuisse, præsertim verustate oleaginas, quę suo lentore liquidos succos adherere prohibeant. Id quod pistillus oleo intinctus, vel oleum paucũ mortario infusum & aliquandiu pistillo ductũ per mortarij fundum, & latera præstabit diutius & felicius. Sit autem oleum vel dulce, vel amygdalarũ dulcium, nisi succus astringens omphacinum magis postularit. Id verò oleum succos adherere non modo prohibet, sed virtutem ipsorũ exhalare, & pollinem tenuissimum euolare non permittit. Adde quod tritauram & breuiorem & commodiorem & faciliore reddit. Qualem vim Galenus opobalsamo tribuit in terenda Theriace. Acacia tamen nostras etiam siccior frangi contumax est, vt minutim sit potius concidenda, & particulatim miscenda puluerandis alijs.

Aloe verò cum friando teratur, percutiendo autem hæreat mortario, verum est Mefusæ de ipsa dictum quod friabilis sit simul & tenax ac glutinosa, quod etiã digitis explorabis. His enim friabilis est, ac his hæret ante & post friationem.

Succus glycyrrhizę, & hypocistis, & lycium nostras pistillo calfacto siccatur & friatur, nisi admodum sint recentia & præhumida, vel minutim secta: tunc additur, & cum

alijs puluerisatur, cum ea sunt iam cerni apta, alioqui semitrita in composito apparent.

Ex liquoribus quoque qui sunt ficiores ac minus glutinosi, per se friari possunt, vt opus Cyrenaicis, euphorbium, thapsia, & (vt dixi) scammonium cum oleo amygdalarum dulcium friatur, non teritur.

Opium verò cum alijs ficioribus particulatim iniectum cōminuitur, vt cum humidoribus dissoluitur, quomodo opopanax, galbanum, ammoniacum, sagapenum, si pauca quantitate multis alijs ficioribus particulatim coniiciantur, cum his puluerantur, vt in hiera diacolocynthis secca, alioqui humore aliquo idoneo, vt aceto, vino dissoluenda, & calfacta colantur, post percoquuntur ad competentem rei propositae consistentiam.

Purgata eadem à lignis & cæteris excrementis pistillo calido quibusdam molliuntur ad fingenda catapotia, & emplastra: sed hoc modo ferè impuram reddunt compositionem. Vel dissoluantur humore idoneo, & colantur per stamen. Sed tunc quantum excrementi colando sit abijciendum cōiecta, & ob id largiora quàm scriptura postulat dissolue.

Lachrymæ denique tam resinosa, vt mastiche, terebinthina, pinea, laricea, abietina, strobilina, colophonia: quàm gummosa, vt gummi Arabicum, tragacantha, cancamum, myrrha, bdellium, styrax, sarcocolla, thus, succinum, gummi, amygdalorum amborū, cerasi, pruni, hederæ, iuniperi, multum siccata, friando per se, aut cum alijs excepta mastiche & pinea, puluerantur: vt caphura quoque, siue ea sit gummi, siue succus, siue factitium aliquid. Eodem verò lachrymæ recentes alijs liquidioribus, excepta mastiche, mistæ dissoluantur, vel medicamenta alia paulo ficiora dissoluant.

Quod si lachrymarum aliquæ suo lentore mortario hæreant, oleo paucio ipsum prius illinendum est, vt si myrrham veram nec vetustate ita exuccam teris: nobis enim consuetior myrrha, maximè est per se puluerabilis. Adde quod mastiche ficiori ne exhalet aut euolet, aquæ rosacæ paululum affundi potest, & alijs horū ob siccitatem maxime friabilibus. In emplastra tamen satius est mastichen & myrrham puluerare.

Ad hæc gummi Arabicum & tragacantha, si prius pistillum & mortarium calefeceris, multo promptius friando puluerantur. Citius adhuc si paucum aquæ vitæ immittas.

Thus teritur solum non resolutur quibusdam, sed aqua & aceto resoluī in emplastris consistentiam & oleo, sed tunc coalescere grumis non potuit.

Mastiche teritur cū paucio oleo in catapotijs Hermetis ex trochiscis colocynthis.

Myrrha vera primo die crassius teritur, postmodum tenuissime pulueratur: sic bdelliū thus vtrunque siccus, sarcocolla, styrax, euphorbium, ladanum tempore aut pistillo & mortario calido siccatur pulueratur, recens verò soluitur oleo calente, vel alio liquore idoneo.

TRITURA LIGNORVM ET CORTICVM.

LIGNA vt agallochum, aspalathum, gaiacum, santala, xylobalsum, & lignorum cortices vt cinamomum, casia, cortex radicis oxyacanthæ, tamaricis, capparis, quantum radices teri postulant: stipitum eadem ratio est & malicorij, quod est mali granati cortex lignosus, sed macis: moschatæ nucis cortex mediocriter diu terendum est.

Corticis autem radicum apij, petroselinij, fœniculi, raphani, similium herbarū tritura in herbis ipsis est declarata. Turbith mediocriter terendum Mesue est.

Ne mireris autem cinamomum omnium æque calidorum tenuissima substantia præditum, diu terendum. Id enim fit, quia interno cortice multū fibroso & neruoso est fractu contumaci.

METALLICORVM ET TERREORVM TRITURA.

METALLICA omnia quia terrestres sunt substantiæ ob id crassum partium, in profundum, vt ad pñctum, neruum penetrare nō possunt. Quapropter illis tenuitatem comparamus, subigentes diu in sole æstiuo cum aceto vetustissimo, acerrimo, tenuissimo (quod sit ex vino nō austero) vini qualitatem, nihil vel minimū gustu referente: quæ quāto pluribus diebus teruntur, tanto sunt tenuiora, ob id melius purgant, tenuant, siccant.

Ex vino autem similiter trita, dein siccata sole, vel si aliud est tempus, igni, sunt meliora ducendis cicatricibus.

Lib. 3.
C. ph. 9.

Lithargyros friatur, non tunditur, ne plumbum eius si chrysitis est parcius, si argyritis largius latefeat, quod cernendo per pannum rarissimum remanet: scoria autem eius lotionē separatur, & sic emplastra fiunt alba.

Lapis armenus si inuenitur, ad lotionē teratur in mortario lapideo, idq; diu satis: sed lapis cyaneus seu stellatus longiorē sustinet triturā Mesue. Teritur in mortario marmoreo albo prius per se vniones, coralia, ne odorē, colorē, saporē alienū trahāt. Lapidum preciosorum sapphyri, hyacinthi, granati, smaragdi fragmenta postea super lapidem porphyrium affusa pauca aqua rosarum, vel borraginis vel buglosi tenuissime friantur. Sic enim fit vt promptē distribui possint, nec obstruant, adhuc nullam mortarij partem terēdo deradunt, quā puluerem augeat. Qua de causa etiam Galenus simplicia ad theriacam in pila Aegyptia durissima cōteri iubet. Per se etiam teretur vnguis odoratus.

Tritura
partiu a-
nimalis.

Partes animalium, aut animalia tota si assatione, vel vitione, vel aliter multum siccata sint, puluerantur aliorum modo: si humidæ & molles sunt, pauca cum multis siccioribus teri possunt, aut sine his teruntur, & per cribrum cochleari cernuntur. Quædam etiam liquari possunt, vt adipēs, medullæ ocyppus, deinde colari.

Stercus canum, luporum, infantum siccatur etiam puluerabile est, & cātharides repositæ & castorium siccius, sed inefficacius, & cancri fluuiatiles vts, hirundines vsq; lepus vltus, renes sciniorum siccæ, iecur lupi siccatur, pulmo vulpis siccatus.

Fel autem ferē alijs siccioribus dissoluendis miscetur, raro siccatur.

De vnionibus qui sunt velur cōcharum quarundam partes dictū prius est, & de vngue odorato. Sanguis hirci siccatus facili pulueratur.

Dentes apri, lucij, elephantis limandi aut radendi, post terendi potius quā vrendi, si vires eorum integriorēs postulas: sic ossa alia & cornua, vngulæ. Tamen hæc vrenda interdum, vt in vitione audies.

Ambra interdum minutim concisa iniicitur in humore calidū, vt in eo liqueatur, vt in Anti. diacoccu baphices interdum teritur, deinde dissoluitur affusa aqua rosarū, vt in Ant. alepto moschata, & in alijs multis. interdum prius in mortario teritur due tres amygdalæ. sic moschus caphura.

Os à corde cerui, ebur, pudendū cerui, tauri, cornu cerui rhinocerotis, & similia prius rasa, post concisa minutim cum alijs teruntur, quædam etiam vtra promptē puluerantur.

¶ Nunc ad id quod initio proposuimus reuertamur.

Terenda
per se.

PER se terēda sunt primū metallica omnia & terrea, vt lithargyros, arrhenicon, sandaracha, es vltum, squāma aris, scoria eris, ærugo, chalcitis, sori, misy, melantheria, chalcantum, cadmia, pompholyx, spodium, si hæc duo non sunt satis læuia: plumbum vltū, cerussa, sulfur, alumen, nitrum, sal quicuis, stummi, chryscocolla, gypsum, pumex, cyaneus lapis, armenus lapis, calx, lapis spongiæ, iudaicus, smiris, ætites, magnes, hæmatites, amethystus, amiathus, gagates, iaspis, sapphyrus, hyacinthus, pyropus, eranus, sigillū lemnium, terra Cimolia, Cretica, Armenia, corallū quoduis. Potes tamen simul metallica multa aut terrea terere, non autē cum partibus plantarū aut animalū. Hæc autē ferē teruntur super marmoreū lapidem, aut porphyrium, aut marinū, aut alium similiter durū.

Possunt tamen & in mortario teri partes plantarum similiter duræ, anacardi in confectione anacardina Mesue.

Aloe, scammonium, saccharum & saccharata, penidia: nam alia reddit glutinosa saccharum, & ea teri prohibet mastiche.

Rha Barbarum.

Spodium Arabum. Caphura.

Gummi Arabicum & sarcocolla.

Tragacantha, thus magis, sed tragacantha incisa etiam cum alijs teritur ne euolet.

Ambra, Moschus, Schœnuranthos & festuago, crocus

Semina pusilla, vt papaueris,

Hyoscyami, maioranæ, portulacæ, amomi vulgaris. Hæc enim si cum alijs terantur, pistillum eludunt, præsertim quæ cum paruitate sunt læuia, & propè integra manent. Illorum autem pars bona, si cum alijs durioribus & teri contumacibus terantur, euolant & exhalant, priusquam sint probe comminuta.

Animalium partes duræ vsq; vel rasæ vel imatæ, ossa, dētes, cornua, vngulæ, ebur, spodium vulgi quod est ebur, vel os elephātis, vel alterius grandis animalis vltum, ventriculus interior gallinarum res Galeno damnata, cerebella passerū siccata, iecur lupi siccatur, pulmo vulpis siccatus, stercus canum, & luporum & infantis, mumia pissasphal-

thum Dioscoridis putata, sanguis hirci siccat, sanguis draconis dictus, cantharides, sericum vstum, vel incisum, moschus, margaritæ, testæ ouorum, ostreorum vstæ vel limatæ per se teruntur.

Cum alijs quibusdam sæpe ipsorum trituram, sæpe etiam facultatē, colorē, odorē, saporem iuuantibus teruntur simplicia plurima & composita quædam, vt Moschus, ambar, mastiche sicci, & alia eiusdem generis ob siccitatem friabilia, teruntur aqua rosacea pauca affusa ne portio tenuior euolet. Sunt qui & mastiche oleum nucū affundunt, vt in catapotijs Hermetis apud Mesuen.

Gummi Arabicū & tragacantha citius teruntur aqua dulci, rosata, vini, seu vitæ pauca affusa si affectus non repugnet: aut pistillo & mortario calefactis ad propiorem siccationem, hincque albiora euadunt.

Tragacantha etiam, vt os à corde cerui, rasura eboris, cornu cerui & similia minutim concisa, etiam cum alijs siccioribus teri potest.

Tragacantha verò & penidia si mortario & pistillo bene siccis cum alijs teretur, minus eorum perit & exilit.

Myrobalani siccae quales ad nos ferē aduchūtur, affuso pauco oleo meliores redduntur, non exhalant, promptius terūt: vix itē passæ & mel cum ipsis tritum ne vētri hæreant & ipsum corrugent, impediunt.

Scammonium cum oleo amygdalarum dulcium friatur.

Colocynthis medulla prius modice pistillo fracta, vel potius minutim forpibus incisa teritur affuso paulatim oleo pauco dulci, vel amygdalarū dulci, vel rosato. Sunt qui ipsum pistillo vel mortario allinunt, alij amygdalas aliquot prius in mortario terūt, alij papyro inuolutam sole ardenti vel igni è longinquo parum diu siccant, vt crocum, rosas. Postea etiam per se facilius puluerant, vel cum alijs siccis siccata forpibusque se&ā terunt. Alij in trochiscos prius fingūt, quales allandal Arabes vocant, priusquam puluerent.

Quæ necessitas agarico adest prius enim ferra quadam rapaci negligēter separatur, post cum vino albo pauco quo zingiber purgatū sit maceratū in trochiscos formatur, siccatur in vmbra, pyxide vitrea reponitur, & cū opus est friando leuissime pulueratur.

Caphura teritur in mortario, cui duæ aut tres amygdalæ prius fuerint affricte, aut in co tritum, aut ipsarū oleū pistillo & mortario paucū sit illitū, ne terēdo euolet ac exhalet.

Turbith quia per se tritum latefcit (est enim gummosum si legitimum est) vbi est modice cōfractum, alia ei sicciora sunt miscenda cum quibus teratur, vt piper, zingiber, & cætera in diaphenico & electario Indo vtroque. Per se autem cum amygdalis, vel oleo amygdalino pauco teritur ne exhalet.

Sericum crudum, incisum facile teritur mistis tribus aut quatuor amygdalis, ipsum ne subterfugiat lentore suo cōtinentibus, & pistillo sistentibus. Sunt qui papyro inuolutum sole vel igni parum siccant, post minutim concidunt, & cum alijs leuissime terūt.

Cinamomum cum paucis amygdalis terūt quidam in hippocraticum quod vocāt vinum, ne odoris gratia expiret.

Rhabbarum cum amygdalis facilius quidem teritur, nec euolat nec exhalat, sed minus fit purgatoriū: vt crocus iura minus tingit si ex oleo teratur, id quod quibusdam pro secreto est. Crocum enim ad iurium, carniū, & aliorum ciborum condimentū, vel etiam ad frontes librorum tingendas nouo quodam modo terunt. Papyro enim interpositū, vel sine hac sartagine impositum igniq; admotum longule, sed parū diu, vel solū diutius siccant, vt villosa eius natura promptius terēdo rumpatur. Ne verò exhalet, ac vt propius teratur, & coloratior euadat, olei dulcis pauxillum vt guttas 4. 5. in vncias singulas affundūt, vel pistillo illinunt interdum tam largiter vt improbe rubeat ob idque ab archipharmacis damnatur. Sed vt sit coloratior, minus tamen tingere putatur quàm qui sine oleo tritus sit.

Opulentis verò cum saccharo pauco potius teritur, si verò humorem alium olei loco acceperit, etiam coloratior euadit, sed humore in vaporem soluto flauitiem natiam reperit, & minus vulgo probatur. Verū tamen croco nostrati hoc mangonio ad coloris gratiam opus est, ceu parum cocto ob soli & cæli naturam frigidiorē. Qui verò crocus à Galeno laudatus est colore flauissimo, odore vegetissimo, etiam diu postquam seruari cæpit, acquisitio hoc colore nō indiget. Crocus verò vt spica, macis, colocynthis, sericum, rosa & alia plurima ante trituram inciditur.

Euphorbium dum teritur per se puluisculo acerrimo in nares euolat & oculos, has

partes valenter mordet, sternutamentoque implacato hominem torquet ob id ea molestia nouitios fatigant, vt sæpe illis nates sanguine fluant, plurimis caput vehemēter doleat. Has autem ab euphorbio noxas prohibebis, si oleum paucū aut amygdalas miscueris, quæ lentore suo etiā puluisculum illigent ac retineant.

Sunt qui myrrham, bdellium, cancamum, gummi hederæ etiam ex oleo terant ne tenuior portio euolet ac virtus exhalet, neve mortario hæreant.

Opopanax, galbanum, hammoniacum, sagapenum, bdellium, ladanum, acacia vulgaris opium, hypocistis, asphaltum, siccor terebinthina, qualis frequens Venetis conuehitur, & alia nō pauca succorū liquorum & lachrymarū genera, vel minus siccata, quam vt per se puluerari queant, vel neruosa & velut membranosa & coriacea, & fractu contumacia cum alijs siccioribus terūtur, sed prius incisa, vel aliter in portiones paruas redacta, quantitate tamen parua multitudini aliorum sicciorū immista paulatim cum illis puluerantur, vt in hiera diacolo cynthidos, & alijs compositionibus multis, sic crocus, flores etiam recentes buglossi vtriusque, rosarum & ceterorum. Sic trochisti Gallie moschatæ & alijs, sic dactyli intus & foris purgati ficus, vuae passæ, nyxa, zizypha passa, baccæ lauri, myrti, iuniperi, oxyacanthæ, visci quercini, anacardi, amygdalæ, auellanae, strobili, pistacia, nucum, reliqua genera & glandium, semen cucurbitæ, cucumeris, melonū, citreoli, citri, cydoniorū, sinapis, cannabis, enici, xyli, cerafi, psillij, lini, & similia. Sic sericum, lana, pili minntim concisa cum alijs siccioribus teruntur potius quàm vsta eadem per se: nani vrendo vires amittunt priores & nouas ab igne, & ijs quibuscū vruntur acquirunt, ob id non vrenda, nisi medicus doctus iusserit, vt nec ebar, cornu cerui, capræ, rhinocerotis, pudendum tauri, cerui, siccatum. Hæc enim vel in longum rasā & incisa, vel etiā limata, vulgari lima, aut rapaci ferra cum alijs siccioribus puluerantur.

Addē quoddā quædam aut per se, aut cum humore aliquo teruntur, & cum eodem bibuntur vel aliter vsurpantur, vt vinca, coma amarāthi cum vino seseli satyrion, pæonia gnaphalium ex vino austero teruntur & bibuntur.

Aristolochia rotunda ex aqua lupini cum posca bibuntur, aut cum melle linguntur, & alia permulta eius generis exempla apud Dioscoridem & Galenum in medicamentis simplicibus & compositis inuenies.

Sic Bdellium salua matutina & hominis icinijs subactum digitis in emplastri consistantiam vsurpatur. & alia alio modo in vsum veniunt cum humore aliquo trita, vt in compositis latius leges.

Lib. 3. c.
ph. p.

Ad aurium vlcera vino, vel dulci, vel austero, vel veteri, vel medio ætate vel aceto, & eo acido, vinoso, acri, pro scopis varis ipsorum remedia non simplicia solum, sed & composita teruntur, sic ad oculorum affectus collyria sicca ex humore idoneo teruntur, & applicantur & in aliarum partium affectibus similiter.

Clementer frianda in mortario quorum virtus attritu violento promptē exhalat, aut substantia sub ictu valido latefcit & mortario hæret, aut quæ multum sunt friabilia v. caphura, ambra, moschus, mastiche, myrrha, bdellium, thus, gummi, iuniperi (vermicem vocant) cancamum, sar cocolla, opus cyrenaicus, euphorbium, aloë, scammonium, styrax calamites, bolus Armenia, terra semniā, & terrea ppe reliqua. & metallica, amylum, cerussa, quin hæc duo sæpe tantum cribro affricamus, saccharum, sanguis draconis, castorium, radix ari, draconij hermodactylorum, ellebori vtriusque, turbitch, rha Barbarum, spodium Arabum, trochisti agarici, dum scilicet quæ aliquando humida fuerunt, iam siccata sunt.

Quorum siqua adhuc sint paulo humidiora, pistillo & mortario calefactis mox siccantur, & simul puluerantur, friando continenter. Quod auxilium succis, liquoribus, gummis, resinis etiam mediocriter fluidis confert: sed eo frequentius & diutius calefacienda & terenda quo illa fuerint humidiora, vt spes sit etiam oleum ipsum & terebinthinam venetam hoc ingenio pulueratum in atque adeo argentum viuū cū saluæ succo.

Sed lapides pretiosi & metallica felicius puluerantur super lapidem marmoreū, porphyrium, aut marinum per molulam ducta, liquore idoneo paucō ne puluisculum euolet identidem affuso qui postea euaporet.

Argentū viuū sublimatum & præcipitatū cinnabrium vulgare, alumen scisile, quia cæteris tenuius sic puluerantur, vel etiam in mortario metallicorum aliorum modo.

Valenter tundenda reliqua vt quæ ob duritiem, crassitiem, lentorem, densitatē egre separantur vt radicem, corticem, lignorum, herbarum, seminum plurima.

Qualia sunt radices althææ apij, asparagi, aristolochiæ, asari, asphodeli bryoniæ;

behen, centaurij magni, cyperi, cyclamini, costi, calami aromatici, cucumeris agrestis, dauci, doronici, distanti vulgaris, helentij, eryngij, feniculi, filicis, galangæ, gætanæ, glycyrrhyzæ, graminis, iridis, mandragoræ, nardi, petroselinij, pyrethri, pæoniæ vtriusque, polypodij, zingiberis, cortex radicis capparis & tamaricis, & alij, & ligna omnia. Herbas item omnes præsertim siccas, flores chamemeli, schœnanthos, & eius farrago nobis confecta pro flore, spica nardi, balaustium, caryophyllū, & flores reliqui tam recetes quàm sicci, semina anisi, anethi, cari, cumini, coriandri, feniculi, fenigræci, lini, lupini, & reliqua, folliculi, fennæ & fructus reliqui, succi, liquores, gummi, resinæ in particulis scædæ, & alijs inter terendum particulatim adiecti.

Limaturæ & rasuræ, & rapturæ ossium, cornuum, pudendorum.

Quædam parum diu sunt terenda quia rara, tenuia, friabilia, virtutem superficiariâ aut imbecillam sortita, quæ paucam sustinere trituram vulgus ait, viribus scilicet integeris, de quorum quibusdam sic Galenus scribit lib. 4. c. ph. 9.

Quæ ex succis & liquoribus, & lachrymis resiccatis proueniunt: vt myrrha, aloë, acacia, scilicet vera, & quæ his sunt finitima *ωλιδιωτα* sunt, & facillè leuia fiunt, ac propè in puluerem mollissimum abeunt, ob id non diu terenda, ne ipsorum & virtus exhalet, & substantia tenuior euolet, vt caphura, ambra, moschus, & alia prope vniuersa, quæ clementer terenda scriptisimus.

Quin & euphorbium parum diu terendum Mesuë est, & spodium Arabum ex cænarum vstis radicibus: nam ex ebore vsto spodium, quod vocant, medicocriter terendum. Quod autem Græcis est *spodium*, id est cinerula, & huic affinis sed præstatur pōpholyx non teritur, tantum linteo cernitur per lotionem, aut etiam sine lotionem.

Ad hæc quæ acria & facile inflammabilia sunt, vt resinæ, liquores, gummi, quædam parum diu terenda. Nam tenuē horum substantiam calor motu accensus dissipat, & reliquum inflammat.

Sunt præterea quædam tam friabilia, vt etiam digitis attrita læuigētur: vt agaricus bonus, ari & dracunculæ radicis siccata, asphodeli radix vsta: quanquam illas multam coctionem sustinere dicat Mesues. Nam recentes intelligit non siccas. Sic amyllum, cerussa, calx, ex teneriori lapide. Nam ex duriori vix hora post vna, etiâ affusa aqua solui incipit, ea quæ ad lithocollam multo præstator iudicatur, quanquā minus multo alba est.

Quædam multum diuque terenda sunt, vt cōpositioni sint apta, vt quæ crassa, densa, dura, lenta, virtutē profundam aut validam, & ægre solubilem sortita, quæ multam sustinere triturâ dicimus, viribus seruatis, vt metallica, lapidosa, lignosa, netuosa, membranosa: quæ tamen ob scopos medici varios nūc crassius, nūc in pollinē mollissimum terenda sunt, vt cum oculis applicanda, vel vreticis miscenda. Sic enim asariū, cuminū, & alia pernulta leuissime terēda sunt cum per hæc obstructa expedire distributionem alimentī in corpus iuuare, vrinas mouere consilium est.

Myrobalanos quoque omnes quando per earum substantiam viscera contrahi & roborari volumus, mollissime teri iubet Mesues. Eadem ratione rha barbarum, quāquam tunc etiâ magis vreticū est, vt purgatorium magis si crassius teratur. Quod autem purum est ac probatissimum intellige: nam rarius & laxius à vehementi & diuturna contritione resolutum exanimatur, virtutemque perdit Mesuë. Sic radices aliæ etiam aromaticæ vt exacte puluerentur, diu terēde sunt acorus, aristolochia, bryonia, centaurium maius, cyclaminus, cucumis agrestis, Mesuë, costus, cyperus, enula, galaga, iris, pæonia, pyrethrum, polypodium, zingiber. Pauca autem tritura fiunt læuia, agaricus trochiscatus, & radices aliæ clementer friandæ.

Metallica quoque (inquit Galenus lib. 4. c. ph. 9.) galla, cytinus, malicorium, Aegyptiæ spinæ fructus, & id genus omnia sunt *ωλιδιωτα*, id est, egre leuia & tenuia puluerâdo euadunt. Metallica autem illa intelliguntur, lithargyros, arsenicum, sandaracha, æs vstum, ærugo, chalcitis, chalcanthū, cadmia, tam fornacaria quàm lapidosa, plumbum vstum, molybdena, sulfur, alumen, styxmi, chrysocolla natiua (facticia enim facilius pulueratur) gypsum, cyanus lapis, & armenius: sed ille magis, & lapides reliqui, & bona pars aliorum quæ per se terenda diximus.

Colocynthis accuratissime debet teri ob causam à Mesuë dictâ in simplicium purgatoriorum facultatibus etiam si ea ob valentem vim purgatricem prius vacuari quàm amaritudo eius agar & tergeat, dicatur Gal.

Scammonium quoque exacte terendū, nisi cum in catapotia venit. Tūc enim crassius

DE MISTA MEDIC. SIMPL.

tritum diutius in ventriculo manet, potentiusque agit.

Sic ossa, cornua, etiam vsta, pili, lana, sericum.

Plenam quoque trituram sustinet centaureum paruum, etiam cum floribus, Mesue, herbae etiam aliae, quae siccae seruantur.

Mediocriter puluerado terenda sunt prope caetera, ut radices apij, asparagi, asari, nisi mouendum sit locum, cichoriū, calamus aromaticus officinarum non teredinofus, doricū, distans vulgaris, feniculum, glycyrrhiza, gentiana, gramē, hermodactylus, iris Illyrica & Florētina, meum, radix mandragorae, nardi, cenanthes, petroselinū plātaginis, phu, rubiae, rufci, raphanici, zingiber, zurumbet: sic herbae acres & aromaticae, ut hyssopus, thymus, nisi mouere menses, aut vrinas volumus, & ob id diutius terimus.

In summa, quae diu coqui possunt, debent etiam & teri: quae parum diu coquenda, parum diu terenda: quae mediocriter illud, hoc mediocriter ferunt ob id trituram nonnihil clariorem tibi reddet coctionis cognitio.

Nec te moueat quod quaedam audis parum & mediocriter, vel multum & mediocriter terenda. Nam cum huius medij magna sit latitudo, in ea quaedam sunt extremis tam propinqua ut vix fecerni queant. Sic agaricum medicum sustinere trituram Mesues scribit, alijs placet paucam, non tamen paucissimam. Qua ratione etiam de primariū qualitatum ordinibus dissidia scriptorum illustrium concilianda scripsimus in methodo medicamentorum componendi.

Quaedam tenuissime sunt terenda, ut promptius id actu fiant quod esse potestate dicuntur, ut quae celerius in partes omnes afficiendi corporis permeent siue fermentationem (ut dicunt) quærimus, siue firmationem & robur, siue materiæ incisionem, tenuationem, terisionem, vacuationem per vrinas, menses, sudores in sensile transpirationem. Sic cordi, hepatis, & partibus caeteris internis, praesertim longe ab ore dissitis roborandis idonea. ab his vacuatura, obstruiones liberatura, vrinas aut menses motura tenuissime pulueramus, ut essentia quadam tenuitate inde acquisita, & corporis sui mole exigua promptius per oscula vasorum angusta, & per corporis habitus poros sensum latentes permeent, agatque citius quod agere nata sunt. Ob id species omnes in hiera Gallica mollissime terantur, & cribro serico cernantur, ut aloes & aliorum vis in angustos ventriculi & partium vicinarum meatus penetret. Sic in theriaca Mithridatio, aurea Alexandri antidoto, & similibus polychrestis compositionibus leuissime terenda, ut promptius in se agendo & patiando, velut fermententur citius, & sint vsui. Dum enim recentia sunt hec opata medicamenta, stupefaciendi vim præpollentem retinent. Non tamē omnino tenuissime sunt pulueranda: Nam sic eorum vis aromatica exhalaret.

Omnia stupefacientia dictis Antidotis, vel alijs miscenda, aut etiam per se vtenda, sunt tenuissime pulueranda, ut in paruos meatus & longe positas, profundasque partes stupefaciendas penetrare aut pertrahi possint.

Affectibus hepatis puluerata tenuiter debentur, tenuius lienis, tenuissime renum & vesicæ affectibus, ut per ora vasorum angusta subeant. Sic thymus, asarum, cuminum, & similia tenuissime teruntur in aurea, in hemagogo, in diacurcuma maiore, in dialacha maiore, & alijs similibus: in alium verò subducentibus diospoliteo, coëctione Hamech, v. Indo maiore crassius eadem sunt terenda. Omnino etiam tenuissime puluerentur debita affectibus oculorum, ne si crassiusculus sit puluis, aspera inaequalitate, & attractu oculi tunicas eximie sentientes dolore afficiat: praesertim si metallica sunt, aut lapides, aut similiter dura & sicca corpora. Saccharum enim candum, bolus Armenia, etiam si minus exacte trita oculo imponuntur, humore ex ipso delachrymante mox soluantur.

Terenda quoque in puluerem mollissimum, quibus crassius tritis vis noxia & malefica inest, ut ea terendo vanescat, ut in colocynthide. Crassius enim trita cum sit spogiosa, humore superfluo imbuta tumescit, negotiumque tunc magnum facit potere, mole, morfu partibus quibus incubuit. Quae incommoda puluisculis eius accidere nequeunt, quia humoris non sunt capacia. Crassius tamen terenda cum in trochiscos alandal est formanda, sed ter quater puluerandi trochisci & reformandi, ut ea tenuissime tandem pulueretur. Eadem ratio est de agarico substantia illi simili. Sed cum sit non paulo clementior, trituram minus accuratam postulat.

Rha barbarum quoque curiose terendum, quando viscera astringendo roborare, aut etiam vrinas mouere oportet, uti & myrobalani.

Quaedam crassius terenda quae in ventre diutius morari volumus, nec promptè va-

forum ora subire: sic purgantia medicamenta crassius teruntur, ut in ventrem partē minus principem, & vacuationi expositissimā ex corpore reliquo trahant. Non autem ad partes principes tota ferantur, easque offendant cum ad has facultate, aut saltem vapore ferri, vel quod plurimum sit, portione paucissima sufficiat.

Crassius etiam teruntur, quorum virtutē multa tritura dissipari metuimus: sic scammonium vim purgantem multa tritura perdit.

Eadem ratione stomachica crassius terenda, ut mora in ventriculo longa coctionem felicius iuvent, neque cibo facili vis eorum obrundatur. Quae praeterea sunt aromata virtute colato datura, & odoris ac saporis gratiam non auctura substantiam: sic cinamomum negligētius terimus quoque colatur aromatizamus: & cardamomum, zingiber, caryophyllum, macis, lignum aloes, spicam, crocum negligētius teris, per haec & pannum rarum colaturus cœnomeli.

Quae item flatus dissipatura sunt, eadem ratione crassius pulueranda sunt, ut in dio spolitico seu diacymino simplicia ut purgent, & diutius in flatus agant, licet tardius & imbecillius quam si tenuata magis essent. Id quod si fieret, parum diu flatus dissiparet, tum quod vires citius eis frangerentur, tum quod per vrinas mox secederent easque mouerent cum calida sint & tenuia.

Quaedam praeterea tantum crassius sunt frangenda ad vitionem futuram, ut lithargyros vendus frangitur in partes magnitudinis iuglandis, lapis phrygius vendus in partes nuci auellanae aequales.

Dios.
Gal. li. 4.
c. ph. p.

Quaedam etiam teruntur ut purius lauentur, de quibus in locutionibus abunde.

Ex his patet eadem medicamenta, nunc tenuius, nunc crassius terenda pro variis medicorum scopis, ut rha barbarum, asarum, nitrum, thymum, calaminthen, itin, hyssopum, pulegiū, origanū, cuminū, curiosissime teri volumus cum Galeno & Mesue, quando his vrinas mouere nobis studiū est: negligētius verò, cum alium mouere cōstitimus.

Sic scammonium, colocynthis, & alia valenter purgantia, nunc crassius cum illud in pilulas, haec in trochiscos transit: nunc tenuius ob dictas prius rationes. Rha barbarum tamen ferē tenuius teritur, ut colocynthis tenuissime cum mox & citra aliam per trochiscos triturā sumenda. Scammonium quoque crassius teritur si coquendum est cum alijs aut diu ante vsum seruari debet medicamentū. Idque ne vis eius coctione per ignem aut longam fermentationem exhalet.

Et quae partes remotissimas petere volumus, leuissime: si eadem vētriculo, intestinis, & primis venis, haerere diutius, crassiuscule terenda sunt.

Ex his omnibus simplicium simul terendorum ordo quidam instituitur, ut prima iniiciantur mortario & terantur crassa, dura, lenta, ut radices, haecque quaedam. Semina prope omnia, ut quae etiā glutinosa medulla cōstant. Paulo posterius aromatica etiam aequae teri cōtumacia, ut iuncus odoratus, calam^{us} odoratus, zedoaria, zingiber, galāga, iris illyrica & Florentina seu nostras alba, costus, & cardamomum, carpobalsamum, cubebe, piper, nux moschata. Posthac autē simul cum his xyloaloe, xylobalsamū, casia, cinamomum, caryophylla.

Deinde succi, liquores, lachrymae puluerabiles cum alijs de quibus ante, & quae cum quibus aut per se terenda sunt diximus.

Semina verò oleosa, ut cucumeris, cucurbitae, melonis, citreoli, cnicī, cydonii, pistacia, strobili, amygdalae, & similia sunt excorticanda, deinde incidenda scalpro, ut mox audies, ne puluerem reliquum glutinent, & per cribrum transmitti prohibeant.

Mineralia etiā ferē per se & seorsum teruntur assuā interdum ob eorū siccitatē aqua pauca, ne substantia eorū tenuior euolet, aut vis exhalet, ut ante docuimus. Chalcitis autem chalcanthū, aerugo, sulfur, sandaracha, & alia quaedam adhuc non nihil humida, humectari nolunt.

De succis, liquoribus, lachrymis, & animalium partibus abunde prius est dictum.

Mortariū papyro vel corio etiā interdū duplici est tegendū (ut in Theriacis cōpositione diximus) interdum ne puluis tenuior, praesertim preciosus foras euolet ac pereat: interdum ne is qualitate malefica praeditus nares batuetis mordendo male habeat, ut in Euphorbio & Turbith, & alijs non paucis euenit.

Ad triturā preparatā, vel triturū loco sunt attritio in cote medica, mansio, seatio, fractio, rasio, limatio, raptura.

Atteruntur in cote medica (qualis est rōsoria) cū albuminis oui liquido, vel lacte, vel succo rosarum, vel seminis scenigræci, aut cydoniorū, aut malug, aut altheae, ipsa collyria

ficca, siue iam in pastillos formata, siue adhuc integra: sed tamen atteri apta, vt materia hæc tenuior & mollior contactu suo dolentem oculum non exasperet.

Ad attritionē confratio amyli, aut cerusæ ad cribrū facta vt pulueretur, est referēda. Manduntur ad oris partium, faucium, asperæ arteriæ, pulmonis, œsophagi, ventriculi affectus: vt ad dētrium dolorem vinca, ligustri folia & germina, radix chelidonij, plantaginis, anemones, Galeno manduntur in simplicibus.

Secantur radices crassiores, longiores herbæ, virentes ambæ aut siccæ, & flores magni, vt nymphææ, rosarum, croci, & medulla colocynthidis, & acaciæ nostras, & troch. Galliæ: & capillacæ, vt fericum, pili, lana: & ligna, vt gaiacū, santala, berisiliū: & ramēta & velut bracteolæ ferramēto, abraçæ, cornuum, vngularum, ofsium, eboris, pudēdorum, coriorum, ichthiocolle, taurocolle, & similiū. Secantur autē quouis ferramēto incidēte & forficibus: ligna autem etiam ligneo pistillo acies ferreas acutas habente. Horum verò quædam post sectionē in decocta & infecturas veniunt, vt gaiacum, berisilium, & quæ ex alijs volēs. Alia, vt felicius & citius pulueretur, ante raditū post secantur. Sic de fractione, risione, rosione, raptione, limatione cōsēdum est. Ea scilicet nūc ad triturā intruerenire, nunc ad cōctionem tantum, vel vsum alium.

Scalpro autem sutorio huc illuc inclinato identidem ac reclinato, vel cultelli verberatu crebro, vel duobus tribusve cultellis inter digitos manus, vel alterius rātum, vel vtriusque prēhensis inciduntur minutissimē semina, oleosa & maiuscula, quia sub idū pistilli lateſcunt & pinguescunt. Inciduntur autē aut per se, prius tamē depellata aut cum pauco saccharo, ne etiam sic immodicē pinguescāt & oleosa fiant. Supponitur autem ijs folium papyri purum, sæpe mutādum, quando scilicet iam discissum est, & huic folio lignum læue & politum.

Sunt verò secanda hoc modo semina cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, bombacis, cerasi, pruni, amygdalarum, pistaciorū, strobilorum, anacardorum, balani, myrpeſicæ, castaneæ, auellane, iuglandis, tribuli aquatici, cnici, staphydis agriæ, quæ aliter quoque teri posse prius docuimus in seminum tritura vniuersali.

Daſtylos quoque intus & foris curiose purgatos similiter incidimus, si condita cardiaca ingrediuntur.

Est tamen quando eos negligenter incisos cum alijs siccioribus terendos iniicimus, præsertim si pauci sunt & multum sicci. aliquando tantum aceto horas aliquot vt 12. maceramus, terimus, per cribrum cochleari, vel manu impellente cernimus, vt in diaphœnico, in quo etiam amygdalas cultello depellatas cum daſtylis aceto maceratis quidam terunt & cernunt.

Frangimus manibus tenera & minuta, vt herbarum pugillos intorqueōdo digitis abrumpimus & radices pusillas & fragiles, cortices parum frangi contumaces. Aegre enim fragilia ferramentis secamus, aut pistillis tundimus.

Raditū vt ante dixi ebur, cornua, & vngulæ, pudēda siccata, coria siccata, ichthiocolla, taurocolla siccior, lignum gaiaci, berisilium, & quædam alia vt facilius vel coquendo vim suam humori cui incoquantur, impartiantur, vel terantur. Raditur & cortex turbith exterior, donec album appareat, Mesuicū. Sic radix glycyrrhizæ, ante trituram raditur, & alię radices, & ipsarum vt aliorum cortices. sed id ad purgationem magis pertinet, de qua postea dicemus.

Raduntur quoque rapaci serra, lotus, lignum gaiaci, buxum, suber, ebur, & dura alia quæ etiam dum serra vulgari secantur, scobem reddunt non dissimilem illi quā rapaces ferræ ac veluti rudes & crassæ limæ elidunt.

Ferri præterea albi lamina tenui curuata, foraminibus multis exasperata comminui-mus affricando agaricum, nucem moschatam, zingiber. Mala item cydonia, vt succi hoc plus reddant, quàm si in mortario terantur.

Limantur præterea aurū, argentū, æs, ferrū, chalybs, plumbum: quædam vt vrantur postea terantur: alia vt etiā citra vsionē in vsum veniant, vt aurū, argentū. sed horū duorum limaturæ loco satius est aurū & argenti folijs vti. Limantur quoque ligna prædara, gaiacum, santala, berisilium, ossa cranij humani. Limantur quoque ligna prædara, erri, & castoris, cornua cerui, capri rhinocerotis, & vngulæ quorundā ex his ac ebur. Pendendum quoque tauri, cerui, ichthiocolle, taurocolla, quæ etiā radi & secari docuimus.

Rasio autem limationi finitima est, sed ramenta sunt maiora limaturis, quia horū instrumenta sunt insignius sed rarius dentata quàm lime. Radendi quoque, modus est alius in lignis edolandis, quā ad trituram quoque & cōctiones vsui esse possit.

DE CRIBRATIONE.

H^{is} terendi differentijs ordine optimo succedit cribratio, qua purum & minutius fecernimus, quomodo pistores similaginem, & farinae florem puriorem ac tenuiorem à fursurea & crassiore separant. Cribrationis ratio eadem est quæ triturae ob id quæ tenuiter puluerâda tenuiore cribro sunt cernenda: quæ tenuissime, tenuissimo, vt pulueres dicti cordiales cribro fericeo, tafetû vocat vulgus, inter manus agitando cribrantur metallica ad oculos tenuissime terenda, & cribro tenuissimo cernenda: sic vrinæ mouëtia, obstructions liberantia. Contra verò quæ alium mouere & purgare volumus, crassius terenda, & cribro crassiore ac rariore cribranda sunt. Et quæ per se teritur si cribranda sunt, per se cribrâtur, vt metallica quæ alijs mista citius, & ante iustam puluerationem descendunt.

Cribramus autê interdum ad trituram meliorem frequëtius ad misturam aptiorem rerum iam mole minimarû. Quæ enim cribrû non permeauerunt, tritura redduntur: quæ crassius terenda sunt, rariore, vt dixi, cribro cernenda: quæ tenuius, densiore. Vnde varia cribrorum multitudo fuit necessaria. Quædam enim cortice tiliaceo, angusto, sed æquali cancellatim connexo constant cribrando scobe gajaci, vel agatico insectorum, & similiter crassiuscule tritis idonea. Vidi & ex asiculo terebella passim pertuso cribrum argillæ colandæ idoneum. alia his minus lata habent foramina, neque vt hæc quadrata sed rotûda, vel oblonga in pergamena circulo ligneo substructa, quibus triticû, hordeum & alia cerealâ sæpe etiam legumina seminibus alienis, sed minoribus purgamus. Hæc enim per lata foramina ob paruitatē facîle descendunt, semina bona foraminibus maiora retinentur.

Alia seta equina in telâ modum cancellatim contexta constant circulis duobus ligneis vtrinque tensa, quorum inferiore hæc prehendantur, atteruntur, & impinguntur: superiore verò materiæ cribrandæ continentur, horû verò cribrorû copia & differentia magna est, & vsus plurimus. Quædam enim solum in medio ligneorum circulorû habet velut telâ illam equinam, & his manu tantû molliter succussis puluis in subiectum catinum ligneum, vel papyrum descendit superna eius parte interim papyro tecta ne puluis euolet. Eoque vitur in pulueribus parum pretiosis.

Alia præterea fundum & operculû habent exemptile, sed vtrunq; corio veruecino clausum. illo puluis per cribrum trāmissus excipitur, & probe ne exhalet aut euolet cohibetur, hoc ne portio cernenda exhalet, aut euolet, prohibet. In his verò multæ sunt in raritate & densitate differentie, quarum singularû suus est vsus, non modo ad medicamentorum terendorû genera, sed etiam ad cõponendorum specie variâ constituendam.

In his itē quædam telæ equinæ loco sericû habet (tafetû vulgus vocat,) & id vel album pulueribus electiorû alborû, vt dia tragacathi diatriis destinatû: vel rubrum debitum, puluerib^{us} electiorû rubrorû, vt diarhodi, dia triû fantalarû, diacubebe, diamargaritô.

Vt utatur itaq; id cribrorum genus alijs pretiosis, ad pulueres etiâ preciosos, & vt vocant cordiales: neque vt præcedentia fetacea lignæ mensæ, aut alteri solido corpori violentius impinguntur succusando, sed manibus tantum mollissime versantur, vt sine violentia puluis tantum tenuissimus descendat.

Est etiam linteum magis minus, rarum, densum, cribri loco in metallicis, præsertim & terreis corporibus: Laxius autem, id est, remque cernendam comprehendit, ac inter pyxididis alicuius lignæ vel alterius, sed grandiusculè operculum & corpus cõcluditur & cõstringitur, deinde vna manu fere violentius succutitur super abacum phar macarium, vncia vel simili pôdere, sed plumbeo in linteum etiam prius immisso vt id suo motu & pondere res has cerni difficiles, acceleret. quæ cernendi modum cicotrinizare vulgus vocat voce ex *νοτινίζω*, id est, cribrare corrupta, & in id contorta.

Vt autem radices, herbæ, semina, fructus, & alia pleraque cruda & cocta terantur, etiam cribrâtur: sed fere vî manus aut cochlearis quomodo cassiam & tamarîndos sine tritura cernimus: sic radices eryngij, satyriorû, raphani, dracontij coctæ, tritæ, cribrantur in diasyrio.

Sed hæc cribratio immoto sit cribro, quæ vero puluerum esse cribratio fere fit cribris abaco incusis valenter, sed numerosè, vt tarantara audire videaris. Alia cribro manu suspensa agitato, alia vt cardiaca cribro inter manus versato, non in abacum incusso, ne etiam horum partes crassiusculæ vt impacit per cribrum permeent. Alia pyxide duro corpori manu vna valenter allisa.

Cerusa & amyllum, & cerusâ serpentaria cribro affricâtur manibus: sic quæ citra trituram cernuntur.

DE MISTA MEDICAM. SIMPL.

Quæ autē cribrū non superauerunt ob crassitiem, teruntur donec ob tenuitatē tota cernantur: nisi quod dū paucissimū superat, idq; tenuissimo, proximū, ceteris iam cretis commisceri solet aut seruari, vt alijs eiusdem generis, vt postea terendis & cernendis iterum misceatur.

Colatio cribrationi licet genere & natura sit affinis, quia tamē non est siccorum, sed magis liquidorum ob id in alium locum referenda fuit tāquam dissolutioni, coctioni, infusioni, clarificationi, & alijs plerisque præparationum differentijs necessaria.

DE DISSOLUTIONE.

DISSOLVTIO autē seu dilutio tritura quædā esse videtur, q̃ per hanc medicamentum simplicia quā compoſita læuia fiant, sed adiecto humore aliquo, non etiā sicca permaneāt si prius erāt, vt se ad triturā habeat hæc quomodo colatio ad cribrationē.

SOLVTIO igitur seu dissolutio, seu dilutio est medicamentū vel simplicis, vel cōpositi consistentia crassioris in humore quopiam idoneo facta resolutio in consistētiā, vel mediocrem, vel paulo hac crassiorē aut liquidiorē, pro medicamenti soluendi, & humoris soluturi quantitate & consistentia, & alijs medici scopis.

Quod enim minus erat crassum & humore perliquido, eodemq; largo est solutū, erit liquidius, contrarium crassius.

Huius autem dissolutionis multæ sunt causæ. nunc enim dissoluimus vt medicamentum facilius & iucundius deuoretur, & citius distribuatur & subducatur. cum facilius sit & iucundius sumere liquida quā crassa: vt facilius & gratius est impleri potu quā cibō. Sic opiatas cassiam & alia plurima quotidie dissoluimus.

Nunc vt alijs ad compositionem promptius misceatur, & vnā cum his aut etiā per se coqui possint, quod sicciora ipsa promptē vrerentur, sic succos, liquores, lachrymas frequēter dissoluimus, vt euphorbium recens oleo dissoluitur, Vetus autē fortasse non dissoluitur Mef.

Nūc vt in partem affectā possit medicamentū penetrare, aut illi applicari & adherere Sic in aurem iniicienda, in intestina, in vterum, in vesicam, in sinum aliquem liquidiora reddimus.

Sic ladanum oleo largiore soluimus in capillato, aut etiā modice tōso quā in raso.

Nunc vt colari, & colādo purgari ab excrementis possit, vt liquores aceto vel alio humore idoneo soluti colantur, & purgantur, hammoniacū opopanax, galbanū, sagapenū: Sic succi siccati, gummi, resinæ recentes aliquando & veteratæ ad electariorum mollium, catapotiorum, linimētorum, vnguentorū, ceratorum, emplastrorū mitionem, sed lachrymæ resinosa, oleosis, gummosæ, aquosis humoribus melius soluitur: vel ipsæ recentes alia sicciora dissolunt, sed vt dixi similia magis, idque dum molle medicamentum est futurum, in quem vsum multa quoq; huius generis coquuntur. Eadem portione parua cum multis siccioribus teruntur, vt in puluere hieræ diacolocynthidos.

Lycium aqua diluitur Galeno ad hæmorrhagiam.

Pix liquida cum melle lingitur.

Tragacantha in oui albumine soluitur in arteriacam.

Fel scari piscis cū myrrha stacte miscetur stomatica medicamentā dissoluitur aqua vel multa ad gargariandū, dissoluntur humore quouis & sine calore, prōptius cū calore.

Bolus Armenia vera, terra lēnia vera, calx, sal, saccharū, saccharata omnia, māna, cerussa post longam velut bullationem chalcitis chalcāthum, ærugo, rubigo: sed hæc oleo citius mollescit.

Dissoluntur aceto forti, præsertim destillato vel succo limonum vniones seu margaritæ. Testæ ouorum, lapides renum vesicæ. Coralium vtrunque, cæque post siccata promptē friantur. Præcipitatū & sublimatū & cinnabriū, & in argentū viuum redeunt.

Etiā aurum & argentum & metalla alia suis valentibus aquis dissolunt chymistæ. Soluuntur ergo simplicia quidem hammoniacum, sagapenū, galbanū, opopanax, thus masculum, opium, scammoniū, aloe, hypocisthis, succus glycyrrhizæ, pissasphaltum, mumiam intelligo.

Aqua simplici, aqua vini, vino aceto similibus & his frigidis, sed longiore tempore quā calidis. Feruentibus enim his humoribus prædicta cito soluantur: priora quinque in lacteum quendam succum, posteriora totidem in nigrum.

Opium soluit saxa Galeno in trochiscis dia opiu.

In oleo frigido prædicta etiā horis 6, non mollescunt quidem, in calente opium, scammonium, aloe, hypocisthis, succus glycyrrhizæ etiā soluantur, cetera mollescūt t:

Lib. 8.c.

ph.p.

Lib. 4.c.

ph.p.

Hęc ī succo porri soluitur in pilulis fœtidis, in succo brasicæ ī pilulis ex opopana ce.

rantū postea durantur praesertim hammoniācum. In eodem oleo & praedictis humoribus etiam calentibus ladanum, mastiche. Myrrha bdellium, sarcocolla, styrax, gummi Arabicum, Sarcocolla in aqua rosarū dissoluitur in pilulis sarcocollae.

Castorium, mumia mollescunt statim; tragacantha tardius. sed in oleo haec mollita non multo post durefcunt praeter mastichen, quae soluitur in oleum, nec ad naturam redit nisi igne valentiore coquatur, vt deest oleum mastichinum.

Acacia nostras, sulfur gagates in his omnibus humoribus etiam feruentibus, nihil mutantur, sed acacia paulatim pistillo ex humore aliquo friata soluitur, vt succi alij & liquores sulfur & gagates igni liquantur, vt liquores omnes, opium, ladanum, chalcitis, calcanthum alu men omne, xylaloe vera, vnguis odoratus.

Soluuntur humore quouis calido calchantum, chalcitis, & haec etiam aceto frigido.

Erugo fori, nitrum alumen, in aceto frigido nō liquefcunt, vt nec creta: sed haec multum diuque feruet, sitque multo fragilior, vt & praedicta.

Saccharum, manna, quouis humore soluantur. Saccharum autem ad syrupos, iulepos, apozemata, electaria solida, penidia, trochiscos, & alia opera plurima variē soluitur, vt in Antidotis Mesuae leges. Saccharum aqua & melle soluitur Mesuae in diazinguibere. Manna vero fere soluitur iusclo calente. & colatur ad foliorum laricis in qua frequentior colligitur, & aliorum excrementorum separationem.

Manna, cassia, tamar indi in succis purgatis dissoluantur & colantur in diamanna, & in alijs melius sic miscentur quam coctione. Manna dissoluitur in succo rosarum rubrarum in altero mannae. Moschus, ambra, caphura fere humore aliquo soluta alijs miscentur.

Tartarum vsum in oleum vi frigidi soluitur, alio solutionis modo.

Sed vide ne dum acetum vel humorem alium quo hammoniāci vel alium liquorē soluitur, coquendo consumis, fallaris. Nam saepe humorem alium ex se remittunt: quem si consumere pergis, ipsorum liquorum humidum consumis: suntque hi siccissimi, & exucci, & emplastro ob id inepti.

Quae vero composita quibus humoribus soluantur, non est operis praesentis docere, sed ad modum componendi singula medicamenta pertinet.

Composita tamen plurima, vt electaria, purgatoria cum aut ingrata sunt aut aegre deuorantur, aut citius descendere volumus, neque nausea metuitur, pistantur aqua, hydromelite, vino, vel alio humore idoneo dissoluimus. Trochiscos in cote medica ex humore idoneo etiam in collyria humida saepe dissoluimus, eclegmata in ore salina soluantur.

Ex his constat solutionis nomen hic minus late patere quam cap. 6. libr. 4. meteororum, vbi ad mollitionem & liquationem quoque extenditur.

DE MOLLITIONE.

MOLLITIO solutioni & liquationi proxima, fit eū medicamēta tam simplicia quā composita redduntur molliora, idque vel affuso humore aliquo sed pauco vel solo calore nostro, solis, ignis id vulgus malaxare vocat verbo detorto ex futuro *μαλάσσει*, verbi *μαλάσσει*, id est mollio & subigo: quae duo per malaxare etiam intelligunt. nec eo libenter vtuntur alibi quam tum in catapotijs cum succo aut syrupo aut humore alio remolliendis & subigendis, tum in emplastris oleo, adipe, vel simili emolliendis.

Calore mollescunt cornua, vngulae, pili, succi, liquores, lachrymae, vt etiam digitis calentibus tātum tractatae, cerae modo ductiles fiant tanquam a frigido concretae non solum sicco duratae. Calore modico mollescit ferrum, & alia metalla immodico liquantur.

Zitho (qui potus erat Alexandrinorum, nostrae ceruicis similis) ebur mollescit.

Vniones, corallia aceto distillato mollescunt, & vt dixi soluantur.

DE DVRATIONE.

DVRATIO mollitioni cōtraria nobis interdū est in vsu in cōditis electarijs, ceratis, emplastris, gelatinis vt vocamus. Ea autem fit nunc mistis siccioribus, nunc multa coctione, nunc frigore coagulante. De siccatione autem postea fusius agemus adhibenda medicamentis plurimis nō vt durefcant, sed vt seruari possint & ob causas alias inibi dicendas. De calfactione quoque & refrigeratione paulo post dicemus, quarum tractatio durationem abunde illustrabit.

DE LIQVATIONE.

LIQVATIO seu fusio est eorū quae a frigido concreuerunt in liquidiorē & fluxilem cōsistentiam a calore facta resolutio: ita, vt quae a frigore imbecillo aut non diurno sunt cōcreta, vt mel, cera, oleum hybernū, butyrum, adipēs, medullae, resinae a calore moderato glaciei niuis & grandinis modo liquantur. Quae vero a vehemēti & diurno frigore concre-

ta obriguerunt ægre multo calore funduntur, vt aurum, ferrum ægerrime, argentum æs facilius, stannum his facilius, facillime plumbum, stimmy arsenicum, sandaracha, sulfur, alumen omne (quanuis scissile tantum mollescere videatur nõ etiam liquari & fluere) chalcitis, chalcanthium, misy & ærugo tardius, tardissimè sori (quia terreum & saxum) vt lithargyros. Is tamen cum æruginè vel oxelæo duplo citius liquefit quàm cum hydrelæo duplo.

His promptius liquantur gages, succinum, vnguis odoratus, id est blatta bizantia, asphatum, pissephalum (muniam intelligo) xylaloe.

His promptius, ladanum Ocfypus, castorium, sanguis hirci, Gummi Arabicum, tragacantha, cæcamum, caphura, myrrha, bdellium, styrax, mastiche, sarcocolla, gummi hedere, iuniperi, cerasi, pruni, amygdalarum.

Resinæ his facilius. Aequè autem facile liquores opium & mophorbum, hammoniacum, sagapenum, galbanum, opopanax, scammonium & succus glycyrrhizæ, hypocisthis, aloë, claregium, lycium nostras.

Cera omnium facillime. Mel, aeromeli seu manna, saccharum, humore etiam frigido vt sal soluntur.

Acacia nostras & sapæ non liquantur, sed humore aliquo cum pistillo, aut cochleari aut manu paulatim soluntur.

Prædicta quoque omnia succos, liquores, gummi, resinas intelligo, calenti humore, vt dixi mollescunt: quædam etiam soluntur: nonnulla item liquantur.

Ambra minutim concisa liquefit Mesue in E. dia coccubaphices.

Porro liquationis necessitas magna est ad mitionem electariorum, catapotiorum, vnguentorum, ceratorum, emplastrorum, & reliquorum prope compositorum.

Quoniam in superioribus præparandi differentiis virium caloris, frigoris, humectationis & siccationis meminimus, & in sequentibus eorundem mentio frequens nobis est futura prius de his est nobis agendum, quam ad infusionem, coctionem, aflationem, vstionem & alia multa, caloris & aliarum primarum qualitatum opera transueamus.

DE CALFACTIONE.

De calfactione autem agemus non quatenus soluit, mollit, liquat, coquit, assat, vrit, vel aliud insigne opus præstat, sed quatenus calorem rebus præbet moderatum, mitioni necessarium, vel etiam alicui præparationum differentia, vel ipsi denique medicamentorum simplicium, vel compositorum vsui dextero.

Calefit in sole meridiano acopum, Galeni populeum lib. 4. sanat. tuende, vt fermentetur & probius misceantur eorum vires.

In sole teri vult Galenus metallica vel lauanda vel in aliud vtenda.

Colanda calfactione tenuantur, vt promptius permeent, frigida enim velut concreta nõ percolantur, nisi erant multum aquosa & liquida, vt oxymeli Galeni. calidiora autè cum foribus tota colum penetrant, nisi sint glutinosa. Talia enim multum calida colanda. Tepidà damus aquam, vt sit vomitoria.

Calidas modice damus potiones medicas non solum purgatorias, sed etiam corpus firmaturas, vreticas, menses aut sudores moturas, obstructionem viscerum aperturas, præsertim coelo frigido & ventriculo frigidiore natura, aut ex morbo.

Calefacimus aquam & alia omnia quæ aqua fluente, aut niue circumposita volumus frigidiora reddere, quod in humorem calore rarefactum frigus se altius insinuat vt ferru candens aqua frigida & astringente temperatur, vt fit durius.

Calefacimus modice infundenda, vt vires suas promptius in humorem cui infunduntur transmittant. Calfactus enim humor tenuatur & infusa res rarefit. quibus fit, vt eorum vis calore promptius trahatur. Alia prope innumerabilia calfactione egent, sed admonendi gratia magis quàm docendi calfactionis, refrigerationis & humectationis meminimus: siccationis autem maior est necessitas.

Refrigeramus aqua fluente, aut niue, aut glacie etiam prius calefacta, quæ febrim vehementi, aut aeris intemperiei calidæ opponimus pocula medicamentosa. Et quæ à frigido cogi volumus, vt ius carniū glutinosarum in gelatinam vulgo dictam.

Refrigeramus omnia calore præparata priusquam reponamus.

Refrigeramus quæ calore soluta frigore volumus conrescere, & durescere, vt electaria sicca, cerata, emplastra.

Quæ calfaciunt, & refrigerant etiam per accidens siccant, ob id ordine bono iam de siccationibus agamus.

DE SICCATIONE.

SICCATIO est cõsumptio humiditatis, aut noxiæ, aut excrementosæ, ob id nauseabundæ, vel promptè putrentis, vel puluerari prohibentis, vel caliditatem quæsitam obruentis. Ab-

fumitur interdum, & naturæ humiditatis aliquid, plurimum autem in assatione & vstione.

Scillæ partes maxime mediæ dreptis viuo tenus tunicis, frustatim confectæ coquuntur murata, sæpe aqua donec ipsa nec amaritudinem, nec acrimoniam habeat, traiectaque lino frusta illa sic, vt se non contingant siccantur in vmbra dies. 40. His segmentis ad oleum, vinum, acetū, scillinū vitmur. Hæc Diosc. vbi neque cultrix ligno pini vel cupressi scillam diuisiui meminit, neque acus lignæ, cum Mesue in aceto scillitæ, nec medium eius abijciendum iubet, (quod hodie solenni quodam more fieri ab omnibus video) sed tantum tunicas externas ad vsque viuas & integras.

Triticum electum negligeret tritum aqua per noctem maceratum, postridie manibus expressum reddit cremorem: qui dum resederit, inclinato vase quod supernatatur sensim effundendum, reliquum bombace vel sole æstiuo mox siccandum ne acefeat, repositum operculetur metu vermium: hoc amyllum, hyeme igni siccetur. Sic ex oriza & hordeo, & alijs fieri potest.

Rosæ mediocriter apertæ sereno cælo mane lectæ eodem die vt sunt siccantur sole, si potes, sæpe vertendo. Nam vix vmbra siccauerit, quanquam id esset optatius, siccata auellæ, & reconde vase vitreo operculato, vt odor & color perseuerent. Meliores montanæ campestribus & minus minuuntur siccando, cum ex harum libris decem siccatis libr. vnica super sit quibusdam idem, de violis. Scilla siccatur in eclegmate Mesuæ ad asthma. Ad saccharum rosatum & violatum rosas, & violas modice siccata Mesuæ, hyssopus in eclegmate sano, menta in eclegmate aromatatum, ruta in altero diacymino Mesuæ, vt in Galeni diospolitico, sed modice. Nam supra modum siccata, acrior, amarior, calidior euadit. non siccata flatus minus discutit, quia humorem quandam excrementosum nondum percoctum retinet.

lib. 4 fanit.

Herbæ item reliquæ vmbra siccantur, nisi vtendi necessitas cogat te quadam igni vel sole siccare. Nam in manipulis ligatæ, in granario pensæ siccantur, vbi siccata sunt, sacculis cannabinis ibidem reponuntur.

Radices herbarum lotæ, à lignosa matrice secreti, mox insolentur, nocte in aere secco perflatili seruentur, iterum soli reddantur donec erunt probe siccata. Quod si cælum est nubilum, sicca fumo aut potius prope ignem, in calatho stramentitio vel saligno: aut si vtendi celeritas vrget sartagini calfactæ, & ab igni remotæ ipsas toties impone identidem vertendo, & sartagine recalcitrando exemptis tunc radicibus, donec abunde erunt siccata. sic radix enulæ valerianæ, acori nostratis siccatur. Idem in radicibus quorundam fruticum, vt cappamariæ: & arborum, vt fraxini mori, faciendum est.

Radices ita siccata si ægre puluerantur, papyro insertæ igni siccantur, vel calidæ sartagini imponuntur & igni exponuntur, igni, autē vel in sartagine vel papyro vel furno vel supra, aut intra furnum à quo panis extractus est. Radices eedem & aliæ magnæ recentes, lotæ, radiculis purgatæ, ac per tessellas incisæ, filoque transfixæ paruis intervalis ne se tangerent in aere ventoso & perflatili siccantur, vt radices ireos, aristolochiæ rotundæ, & longæ bryoniæ, & similia: quæ tamen etiam citra diuisionē probe siccantur, vt radix ari, dracunculæ, cyclaminæ, asphodeli, vti eligatæ prius istæ, mādāragoræ, et yngij, apij, petroselinæ, sceniculi, rusci, turbiti, ellebori vtriusque, diētami vulgaris, thapsiæ. Paruæ radices aliæ citra elignationē in vmbra quoque siccantur, vt asari, asparagi, graminis.

Colocynthis septembri legitur dum flauescit, maxima, & cum alijs multis producta insolatur diu, quia ægre siccatur, & nocte in aere perflatili reponitur, aut si cælum est nubilum filo transfixa fumo siccatur, post excorticatur, vt teratur. itē quarta parte hore inuoluta papyro insolatur, vel igni, aut fumo admouetur.

Mesues.

Aloe decocto aromatum imbuta siccatur, primò in vmbra, deinde in sole. sic myrobalani trita oleo amygdalarū dulciū, æstate triduo cōfricata, & quoties opus erat irrigate siccantur primum in vmbra, deinde in sole. Trochisci tamen ex his facti in vmbra tantum siccantur.

Ibidem.

Pulmo vulpis sanæ venatu captæ, iuuenis, aqua abluitur, incidatur secundum arteriam venosam, & magis multo secundum venam arteriosam, sanguine purgetur, vino albo odore modice calido lauatur, ollæ impositus clibano parum calido siccetur, refrigeratus & folijs abinthij inuolutus reponatur. Plura de his leges in fine in his quæ pluribus modis præparantur.

Amygdale & nuclei pinci cortice tenui ablato in pelui super prunas ignitas per se vel potius cum fursure ducantur, & succutiantur donec humiditas rancida, aut excrementosa cōsumatur, alioqui pectori nocent, & tussim excitant qualitate rancida. Pruna, ficus, vuæ, zizypha, myxa, pyra & alij fructus multo sole feruidissimo, aut eius penuria igne siccantur: sed vuæ oxycanthæ vmbra siccatur.

DE MISTA MEDICAM. SIMPL.

Fructus quoque rubi immaturi elibano siccantur ad maiorem astringentiam, & mora viridia aut subrubentia. Fella in folliculo parum cocta ex aqua calente in umbra siccantur. Coagula animantium parum salita in solatu siccata seruantur.

DE HUMECTATIONE.

HUMECTANTUR nunc aqua, nunc lacte, nunc aceto, nunc oleo vel alio humore medicamenta non modo simplicia, ut felicius & innocentius in compositione vel usum veniant, sed saepe etiam composita, ut cum crassa humore diluimus, quo facilius & iucundius deuorentur.

Caryophyllum, zingiber, myrobalanos, cepulas, & emblicas ad conditura qua industria humectat docet Mesues initio lib. sui de antidotis & in simplicibus. Mastiche moschos ambraterendo humectantur aqua rosata.

Gumi Arabicum, tragacatha aqua etiam vini, myrobalani, scammonium, colocynthis, caphura, turbith, sericum, crocus, euphorbium & alia pluraque, terendo humectantur oleo amygdalarum dulcium.

Amygdale, strobili, pistacia, parum humectantur aqua dulci aut rosata ad meliorem tritura & saporem delicatum si emulsionem, amygdalatum, marci panes, facturus es, alioqui pinguescunt & palato ingratae fiunt & ventriculo, ut etiam nauseabunde fiant.

DE INFUSIONE.

HUMECTATIONI proxima est infusio, in hac enim medicamenta parum trita aut concisa, nisi minuta sint, macerantur & temperantur humore aliquo scopis nostris apto, eo magis minus calido a sole vel igni potius quam frigido. Tempus autem quo id fit varium est. Nam nunc infunduntur semihoram, nunc hora nunc horas plures, dies, menses pro varia medicamenti natura & alijs medicorum scopis. Ut enim quaedam parum diu terenda & coquenda, sic infundenda quod virtutem habent vel imbecillam vel superficialiam, & rara sint admodum. Contraria diutius infundenda. Varij praeterea scopi medicorum faciunt, ut nunc minus diu, nunc diutius quaedam sint infundenda, & quaedam (ut nuper distinximus) minimo aut mediocri, aut valido calore in id fouenda. Medicamenta infundimus, ut facultatem eorum maleficam quidem auferamus vel castigemus bonam vero augeamus, vel in humore ipsum utendam transferamus, quos tres infusionis scopos praecipuos abunde Mesues docuit lib. 1. & nos lib. 3. de ratione componendi medicamenta.

Infunduntur autem hodie potissimum purgantia medicamenta, sed etiam alia in apozemata, syrupos, olea, & alias compositorum medicamentorum differentias.

Humor vero cui infunduntur maxime varius est pro scopis varijs: purgantia tamen frequenter sero lactis infunduntur, quia purgatorium, & ori iucundum. alia humoribus alijs, ut post audies.

Mesues. Thymelaeae fructum aut folia & tithymalorum & similiter lactiarum aceto infundimus. Turbith lacti recens mullo infusum & siccatum ventrem turbare desinit.

Mesues: Aloe decocto aromatum vel specierum hierae, & aliorum quorundam calidorum macerata, citius etiam in ventriculi tunicas alte recepta vacuat, illi autem decocto si colocynthis aut turbith addatur, etiam a longinquo trahet aloe facultate acquisititia non insita.

Ibidem. Myrobalani obstruere desinunt si infundantur in serum lactis vel succum fumarie addito praesertim absinthio vel agarico vel rha barbaro. Senna contrita horis. 24. in succis maceratur, semel aut bis feruescit, colatur, exprimitur in syr. Saporis.

Ibidem. Manna maceratur succo intybi feruescit, manibus fricatur, colatur in syr. acido ex manna. Rha barbarum infunditur aquae cichorii vel intybi vel apij vel plantaginis, adiecto interdum vino albo pauco, & cum Mesue spica, pro varijs medicis scopis. Id autem ante infusionem scalp pro aut cultello in tenuia velut folia incidatur potius quam vulgi more teratur, ne vis eius exhalet.

Ibidem. Thamar Indi infunditur sero caprino, aut succo fumarie vel lupuli, modos eorum infundendorum varios lege in simplicibus Mesue.

Ibidem. Rosae & violae infunduntur aquae aliquoties, ut syrupus inde purgatorius coquatur. infunduntur & aceto, quod ab his rosatum & violatum appellatur.

Alia prope omnia simplicia purgantia varie infundi docet Mesues in simplicibus.

Cuminum in diospolitico seu diacymino maceratur. 2. 4. horis aceto, deinde vase terreo bene cocto frigitur, & siccatur. id autem fit vt citra calorem altius penetret ac incidat. libr. 4. sante tun.

Radices vreticę calentes eadem ratione aceto .2. 4. horis ante vsum macerantur: si autem postea sint coquendę ex aqua, satis est prius horas. 6. aceto macerasse. Eadem ratione semen anisi, anethi, apij, ameos, amomi, cari, feniculi.

In oxymelite melanogogo simplicia macerat Mefues horis .2. 4. aceto albo, aqua, succo buglossi.

Coriandrum aceto cui incoctus sit sampsuchus maceratum recte corrigitur.

Dactyli aceto macerantur triduo in diaphœnico Mefue.

Semen erysimi aqua macerandum est, ad obtundendam igneam eius caliditatem, prius quam eclegmatis miscatur. Gale. libr. 6. simpl.

Nuclei pinei virides aqua macerandi, vt acrimoniam in ea exuat. In ꝑ. hamech simplicia infunduntur sero lactis quinque dies Mefue. Lupini aqua fluuiali diebus. 6. 7. 8. macerati miscunt & dulcescunt, vt aqua priore abiecta cocti.

Cicera, triticum, hordeum lacte aliquoties infunduntur Mefue, & siccantur in puluere impinguante. Cicera aque incoquuntur in diasatyrio secundo, vt trunq; sit vt pars eius nitrola, & tergens, in lac & aquam transferatur, reliqua eius substantia feruetur.

Semen abietis & flores populi macerat dies. 4. o. oleo Galenus, sæpe tres. 4. & plures menses, postea exprimit oleum digerens & acopum. libr. 4. sante nit.

Sericum crudum coco baphica tinctum maceratur succo pomorũ, succo granatorum, decocto corticum citri & alijs syr. ex succis simplicibus & cõpositis, donec ij succi rubeant, & serici simul & cocci facultatem acceperint.

Infusio hæc dum facultatem medicamenti vel maleficam emendauit, vel bonam auxit, aut in humorem transiit, finem suum assequuta est: sæpe tamen fit, vt præparatio quædã sit coctionis, sic ante coctionem simplicia aliquãdiu macerata passim reperies, immo & post coctionem, ante ipsam colationem præsertim, dum vis quæ sita ægræ in humorem trahi potest ex materia dura, crassa, densa. Sic lignũ gaiaci, ebeni, buxi, fraxini, geniste, iuniperi etiã tritũ aut limatum diu etiam ad tridũ ante coctionem humore aliquo idoneo maceramus, vt vires eius incidentes, tenuantes, tergentes tandem in decoctum trahantur.

Quin & medicamenta nodulo ligata, iusculo vel alteri leuiter incoquimus infusionis loco: & quæ infudimus, sæpe semel aut bis feruefacimus ante expressionem aut colationem.

Infunduntur præterea quædam tantum, vt tenerescant idque, ad condituram vel coctionem celeriorẽ,

Sic Mefues myrobalanos ad cõdituram aqua & hydromelite humectat, & dies octo sero caprino macerat, post semel feruefacit. Mefues in simpl. & conditus.

Capita papaueris forpicibus minutim concisa macerantur cum semine aqua pluuiæ vel fontana d'vno: vel si iam sicciora sunt, etiã biduo & triduo, vt tenerescant ad diacodij compositionem. li. 7. c. phar & Mefues in antidotis.

Myrobalani oleo amygdalarum dulciũ vel violato vel rosato vel sesamino imbuuntur & irrigantur, postea siccantur: id quod ipsis infusio seu affusio seu perfusio quædam est. Dum item hæc tritę oleo amygdalarum dulcium triduo per æstatẽ confricantur affuso oleo quoties opus est, deinde siccantur. Altero autẽ triduo similiter in sole confricantur ex aqua saccharata vel sero saccharato, vt postea formetur in trochiscos Mefue. Nisi nutritionem esse maus de qua mox dicemus, vt i & dum species hierę hermetis tritas inuoluit bis succo cucumeris agrestis, & siccet, vt eius succi vires puluis in se trahat.

Alia infunduntur vt dissolui possint: sic hammoniacum, opopanax, galbanum, sagapenũ, & liquores alij aceto vel humore alio super cineres calidos fere infunduntur vt soluantur. Fraxos eosdem hydromelite in fundit in hiera archigenis ex Paulo, vino autem infunduntur in hiera hermetis, in hiera autem diacolocynthidos rufi myrrham solam vino infunduntur sagapenũ & opopanax cum alijs terit, vt nos hodie in hiera diacolocynthidis pacci factus: in qua tamen scribonius opopanaxem & sagapenum in mortario terit adiecto melle tenui, id est quam liquidissimo. infunduntur eadem ratione gummi & ichthyocolla, vt dissolui possint, vel vt in mucaginẽ abeant, quo fine etiam semina & radices lentore aliquo præditæ, humore calfacto macerantur. Sed de his in succorũ extractione mox audies.

Ad infusionem reducitur insectio seu tinctura, vt sericum succo cocci baphicę tinctum ad cõpositionẽ cardiacam celebrem diacoccu baphices, & in syrupo de pomis & de granatis, & de corticibus citri. Quanquam idem sericum sic tinctum præterea succis illis infundatur, donec succi rubeant, & serici atque cocci vires in se traxerint.

DE MEDICAM. SIMPL.

Filum purpura marina tinctum, si postea viperā strangularit, ad paristhmia est efficacissimum Galeno.

DE NVTRITIONE.

N V T R I T I O quoq; quā vocant, fuerit infusionis species, sic autē est appellata hæc præparationis differentia loquentibus abusue, quōd quemadmodum per veram nutritionem sit vacuati repletio & etiam incrementum, quando scilicet id fieri ex partium sequaci mollitie potest: sic medicamenta quæ humore aliquo imbuta, macerata, tribulara, cōfricata, præsertim calfacto velut augētur.

Sarcocolla alba, magnis glebis constans, lacte muliebri nutritur, sed paucō. Nam multo lacte operta liquefit, & lac ipsum priusquam sarcocolla siccetur, accescit: paucum igitur ex mammis ipsis irrigandum confectum sole siccetur, iterum & tertio, quarto, quinto, similiter irroretur & siccetur, & tandem reponatur. Aspergi etiam alinæ, capræ, equæ, lacte, vel alio potest. Semen cari calfactum lacte caprino horas duas quidam nutriunt in vase mundo, exemptum siccaturumque reponunt ad fluorem alni.

Myrobalani oleis, sero saccharato, butyro vaccino, succo cydoniorum, vel alio humore dum irrigat, macerat, fricat, frigit Mesues clementer, & his humoribus imbuat vel ad cōdituram, vel ad noxas earum castigandas, siue solæ vtendæ, siue in composita veniant, vt trypheram sarracenicam & persicam, trypheram Galeni, elec. stomachicum Mesue, & elec. alhari & sequens quodammodo nutrit. Sic & species omnes elec. Indi maioris, dum oleo amygdalino confricat idem.

Colocynthis quoque seminibus solis extractis si impletur aqua cum pauca spica & mastiche, & coquitur in cinere calido ad partis tertiæ consumptionem: hocque decocto paulatim affuso sagapenum iriget, donec pinguescat, nutrirī dicitur sagapenum. eodem modo & opopanax. Decocto myrobalanorum vel succo enulæ campanæ aut rutæ aut feniculi cum felle paucō auium rapacium, & spica & mastiche ad dimidium coctō & colato idem fieri potest.

Folia etiam thymelææ aceto nutriuntur in elec. diaphysalidon. Eadem in acetū infundit & siccatur in pilulis thymelææ, vt eadem sint vel saltem omnino proxima infusio & nutritio. Ambæ enim humore fiunt & calore blando, qualis ad nutritionē veram est aptissimus, cum immoderatio vrat: imbecillior sit inefficax.

Metallica fere in aere calido non tamen super ignem nutriuntur.

Metallica etiam sæpe nutriuntur humore aliquo vt dissoluantur promptius vel etiam liquentur, vel pinguescant, & velut aucta tumescant.

Scoria ferri in aceto nutritur dies quinque in tryphera minore, Mesue & tryphera mortifera, & tryphera Galeni.

Lithargyros nutritur oxelæo sic, vt vnciæ eius triti quatuor tandem olei libram vnam, aceti quartaria quinque ac eo plus ebibant: idque omnino sine igni, multum diuque pistillum per mortarium ducendo. Nam lithargyro etiam vncia vna corpus dar plurimum, vt etiam sine cera emplastrum perficiat, sed initio diu tere primum cum paucō oleo postea affuso vicissim paucō aceto. Nam multo sic mergitur, vt corpus non assequatur. Vbi autem initio paulatim nutrita est & cōsistentiā crassiorem friando assequuta, tū largiorem vtriusque copiam ebibit. Continenter autem friatur ad horas duas, tres, nisi quod per initia potes aliquānsper cessare, vt interim velut in ocio largius combibat. Sic & chalcitis, & scoria ferri, & ærugo & metallica cætera ex oxelæo in vnguenti formam diu friando duxi, sed bibacissima est lithargyros opinor, quia siccissima & rara modice.

DE EXPRESSIONE.

E X P R E S S I O est humidæ & tenuis substantiæ separatio, à sicca & crassa duro aliquo & valido cōpressu facta. fit autem sæpe torculari & eo multiplici, quale vinum ex vinaceis exprimitur, & quale pinxit Mesues in oleo amygdalarum dulcium, quale item vsurpamus in exprimendis oleis & succis alijs & decoctis, & carnibus & similibus, siue id torcular est siue prælum libratium, vt in oleo amygdal. dulciū. Mesue diximus. Fere autē exprimēda, ne diffuantur aut dissiliant inuolutum panno forti, vt cannabino, caprino, setaceo. Est quādo tantū caprino aut lino inuoluimus, & manibus ac digitis prælorum loco vtimur, vt dum medicamēta purgantia infusa exprimimus. Adde quod nunc densō nunc raro panno exprimimus, interdum elementer, interdum

valenter pro scopis medicorum varijs. quædam item frigida exprimimus, alia etiam calida. quædam solum calida exprimi possunt, vt oleum amygdalarum dulcium, & similia in Mesue. Sic portulacæ, cotyledonis, semperuiui, buglossi succum exprimimus calentem, alias humore aliquo liquidiore affuso, vt dicemus in succorum extractione.

Expressio nis vsus igitur latissime patet in infusis apozematibus, & coctionibus propè omnibus, in syrups, in oleis, & id genus alijs: quo autem instrumento & quatenus calidum aut frigidum vnumquodque est exprimendum, in singulis compositorum remedium differt: melius confides.

Neque solum colationi succedit expressio imò eam sæpè præcedit, & quando eam sequitur blanda admodum est facienda: ne quod crassum & terreum colo adhæret, id totum vi in subiectum humorem colatum elidamus.

DE CONFRICTIONE.

CONFRICATIO rerum insularum, aut etiam coctarum manibus facta colationem & expressio nem adiuuat, ob id ante has sæpè obitur interdum expressio nis vice est: sic crocus panno lineo ligatus inter coquendum, infricatur in syr. Saporis, de pomis & quibusdam alijs compositis.

Manna succo intybi macerata fricatur manibus antè colationem in syrupo acido ex manna.

Rha barbarum panno lineo ligatum fricatur, & exprimitur in syr. cichorii composito. Scammonium panno tenui ligatum sæpè confricatur in syrupo acetato cholagogo.

Elleborus niger nodulo lineo ligatus in oxymelite melanogogo sæpè confricatur.

Medulla cnicici, turbiti, zingiber, in panno lineo ligata confricantur sæpè in oxymelite phlegmagogo.

Elleborum nigrum, agaricum, salem Indum fricat, Mesues in apozemate epithymicafiam vero manibus fricat antè colaturam in apozemate adianti, colocynthis forficibus incisa in oleo rosato fricatur ad componendos ex ipsa trochiscos Mes. in trochisc. & simpl.

Sic manibus fricatur, & post colantur simplicia in electario Hamech. Simplicia in succis macerata fricantur & colantur in elec. diaphysalidôn. Simplicia pilularum aromaticarum post coctionem fricantur, & colantur.

Fere autem hic nodulus in medicamento humido manet. Sic scammonium panno lineo raro ligatum suspenditur in syrupo fumarie, & noduli aromata continentes & compositum condientes in ipso suspensi manent, vt post leges, titulo de aromatizatione. Quam consuetudinem hodie plerique seruari video in syrups purgantibus, præsertim contra morbum longum, aut in hominis delicati gratiam compositis.

Aliquando tamen vbi vis eius noduli tota in compositum confricando est expressa, abij- Gal. lib. 7. citur. Sic Soranus cum melle & capitibus papaueris myrrhæ, crocum, hypocythidem, aca- c. ph p. ciam nodulo ligata incoquebat, post vbi vires suas diacodio impresserant, tollebat. Quod exemplum eo adscripsi, ne id nouum putes, & Arabibus acceptum referas.

Alia tamen est confricatio, quæ ad infundendum, imbuedum, molliendum, & humectan- In simp. dum magis pertinet, vt cum myrobalani omnes butyro vaccino fricantur, cætera species Mes. oleo amygdalarum dulcium inuoluuntur in tryphera sarracenicæ, & phœnonis. easdemne partes nutritorias valenti astrictione sua exasperant, oleo amygdalarum dulcium vel rosato vel violato vel sesamino, vel alijs lenientibus tritas mergit, confricat, & lubricas facit. Possis tamen non modò manibus fricare, sed etiam in sole aut igni clementiore frigare cum aliqui nec ipse rarefient, nec butyrum aut oleum quoduis liquabitur, vt ipsas promptè totas permeet ac imbuat: ob id in tryphera minore phœnonis myrobalani assentur in butyro vaccino. legimus & nos in tryphera sequente: hæc butyro vaccino inuolutæ frignantur vertimus, vbi legebatur fricentur, & alibi aliquoties. Vbi (vt dixi) etiam fricentur legere possis, cum vtrumque patiantur, hoc est manu fricentur, & in sartagine aut vase alio blandè frignantur.

Et in Elec. a nobis inuento, frige bis vertimus pro frica, tamen potes si libet lectionem priorem retinere: vel istam præsertim cum in simili Elec. alcanzi, myrobalanos, & simplicia alia bis seruet faciat.

Friguntur tamen vere quædam, vt cuminum aceto maceratum frigitur Gale. libro. 4. sanit. tuendæ in vase terreo bene cocto. Plura huius exempla leges in aflatione.

Q V A N Q V A M loco hoc coctionem infusioni (vt ante memini,) viribus & præparationis modo proximâ, doceri exigit ordo rei: quia tamen rerum ante tractatarum conproxiuatione quadâ in expressione transluimus, succorû autem extractio tritura constat & expressione, iure optimo succos exprin. edi modû hic inter serimus: *χλῆρος* autem (vt in simplicibus ex Galeno abunde docuimus) nunc is est humor, qui virentibus herbis aut fructib⁹ humidis, aut seminibus oleaginis tritis exprimitur, & viscago ceu mucago quædam ex glutinosis seminibus, radicibus, gummis, partium neruofarû rametis, humore aliquo calfacto maceratis extracta. De his oîsbus hoc loco agam.

Succus ex omnibus folijs virentibus per se tritis exprimi potest, præterquam quodd quædam ob siccitatem vix succum aliquem reddunt si per se terantur, vt folia lauri, saluix, thymi, rorismarini, sabinæ, & quæ plantarum sunt syluestrium, & ex locis editioribus ac siccioribus, & æstate calida sicca, atque adeo post meridiem succum parcio rem reddunt: alij ob lentorem, vt buglossum vtrunque, coryledon, & aliq quædâ post dicendæ: sed vtrunque genus misto eget humore liquido, ad succi expressionem.

Ad varios vero aurium & partium aliarum affectus adhibet Gal. in simplicibus, & lib. c. ph. p. succos recentes hippuris, cucurbitæ, cannabis viridis, hedere, polygoni maris, prasi, stœbes, absinthij, feniculi, dracontij, lactucæ agrestis, fumarix, centaurij parui, chelidonij, libanotidum, anagallidum, anemorarum, peucedani, Betæ, Brassicæ, calamintus, foliorum ficus, cynoglossi. Floribus populi albæ, floribus spodylij: floribus rosarum, violarum: radicibus capæ, allij, porri, cyclamini, scillæ.

Ex fructibus etiam vt pomis cydoniis, granatis, vuis, & alijs permultis: de quibus abunde nobis dictum ex Galeno in Mesue est, sectione prima & secunda.

Quo autem modo aloe, scammonium, glaucium, hypocisthis, acacia & externi alij plantarum succi extrahantur, cum plantas ipsas non habeamus, didicisse parui est momenti. cum præsertim ex Dioscoride repetere possis: quanquam aloe nobis iam frequens satis est, sed pensilis fere ad pompam, altius nulla, præterea non quæuis aloe succum laudabilem reddit, vt Diosc. & Gale. edocuerunt.

Acacia vero nostras sic fit prunis agrestibus aqua maceratis, igni lento coctis ad dissolutionem: colatur ex his siccatur igni vel sole, complanatur: in tessellas secatur, rubentes & asstringentes magis: si immatura erant, nigras & dulces magis: si matura.

Lycium nostras sic fit in libello cui titulus est de dynamibus, id est facultatibus, & Gale no tribuitur. *Periclymeni* (quod caprifolium vocant) baccas mense septembris terere, torquendo exprime, in solari sicca reponere, Alterum autem verum hodie desideratur.

Radices glycyrrhizæ recentes præhumide iulio mense tritæ, ex aqua coctæ, ad crassitatem colantur & exprimuntur expressum igni vel sole siccatur.

Oleum omphacinû ex oliuis immaturis, dulce: ex maturis exprimere in Gallia Narbonen. si vulgate est.

Sic omphacium, ex vuis immaturis & natura acerbis: vinum, ex maturis & dulcioribus exprimere cuius notum est. Pomorum agrestium tritorum succo expresso parum falso vtruntur septentrionales omphacij vice.

Ex siccioribus vero folijs seu natura seu celi & soli ratione, vt succum aliquem extrahas, vinum aqua vel humor alius proposito idoneus (vt dixi) miscetur inter tundendû: qui prope totus cum succi portione aliqua exprimendo reddetur.

Eodem modo ex portulaca, coryledone, semperuiuo, buglossio vtroque, & similiter glutinosum succum sortis, Galenus docet succum illum affuso humore idoneo extrahendum. Ex his tamen sine externo humore succum extrahis, si parû calefactis, ipsæ, mortarium, pistillum, saccus, prælum, vel si tusa citra calorem calatho saligno impositæ, loco frigido, vt in cella vinaria repositæ sint. Nam in catinum subiectû humor satis multus paulatim defluet. Portulaca tamen erratica & quæ vitibus est familiaris quam hortensis, & buglossum tenerum quam verustate iam pinguius, & folia boraginis quam caulis succû facilius remittunt.

Cucurbitam maza pinsita inuolutam clibano coquit Mesues, deinde succum exprimit in syrupum cucurbitæ.

Gale. lib. in syrupum cucurbitæ. pro puero epileptico in fine. Ex scilla succus extrahitur optime diebus canicularibus. 40. quibus ea particulatim digestis discerpta vasi mellario imponitur, opercularo, & pelle circumdato, deinde loco meridiæ spectante contra boream lecto in solari sæpe vertendo, vt vndique solem sentiat: post hos

scillæ elixæ similis succum in fundo deponit melle condiendum. Alij scillam inter multas hic succ^o collectam cultello ligneo corticibus externis purgatam, maza inuolutam, clibano medio- diachyl- criter calido coctam, exemptâ, vt calet tufam in mortario lapideo calido, pistillo ferreo ca- lo magno lido, panno lineo tenui calido inuolutâ, valenter exprimût. Sic autê affat Dioscorides vsq; muscet^{ur}. crusti frumentacei vel lutei coctionem, tamen succi eius non meminit. Alij sine affatione foris & intus purgatam calidum calido, ligneo aut lapideo mortario & pistillo tufam mox calido linteo, torculari calido exprimunt, & succum multum facile reddit & purum atque clarum. Quod si frigida scilla mortario & pistillo trita, sit in sartagine terrea parum frigatur elicoque exprimatur inter asseres calidos vel torculari calido ac aere calido. Quæ omnia Galenus innuit, cum succum hunc diebus canicularibus nempe omnium calidissimis, si suam seruant naturam, optime extrahit. Quædam minutim concisam exprimunt, quod tufâ pinguescat, succumque ægre remittat, nisi vt dixi calefiat: alij tufum calatho sparteo imponunt aut saligno, in cellaque vinaria aut similiter frigido loco collocant, destillatque in vas subditum. Liquores & gummi & resine castrata, terebrata, secta, scarificata, plantæ radice, erunco, ramis, calice destillantibus, raro à nobis colliguntur sed fere ab externis mittuntur, à quibus qua ratione eliciantur, docet in horum singulis Dioscorides, succum tamen ex incisa falice dum floret destillatam colligere possumus ad vsus à Galeno scriptos, & opium ex capitibus papaueris nigri mense lunio aut iulio & ex alijs nostratibus plantis. Elaterium autem ex fructu cucumeris agrestis quomodo extrahendum, lege Dioscor. & in his vide ne succum pro liquore supponas, cum sit multo ignauius scammonium succus quam liquor, & in alijs ad portionem, vt Dioscor. & Gale. abunde docent. Sic ex mandragore radice incisa, forrata, cauata liquor emanat valentior succo, & iisdem radicibus tritis expresso, & ex ficu, lathyride, chelydonio foliis aut sureulis auulsis lac emanat ex illis & tithymalis albû, ex hoc luteum.

DE secundo succi genere qui ex oleaginis seminibus tritis exprimitur, vt amygdalis ambabus, auellanis, iuglandibus, pistacijs, strobilis, balano myrepfica, nuce myristica, semine, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, cânabis, napi, sinapi, ricini, cocci gnidij, lini papaueris, hyoscyami, pomorum, pyrorum & id genus alijs abunde cum Mesuæ diximus sectione nona de oleis, quod hunc succum etiam Dioscorides & Galenus oleum sæpe vocant, potestque hic ex omnibus seminibus medullatis extrahi, vt etiam ex vuarum seminibus tritis exprimitur igni in lucernis duratissimum.

Mel quoque ab anacardis extrahes, si eos ablato pediculo coquas ex aqua: tunc enim quod supernabit melleum cochleari colligendum est, & aliter.

SVCCO I genus tertium ex glutinosis seminibus & radicibus & alijs in humorem calfactum aliquandiu infusus extrahitur. Semina fere sunt cydoniorum, marrubij, vrticæ, lini, fœ nigraei, psyllij, maluæ, althææ, citri.

Radices sunt maluæ, althææ, symphyti, periclymeni, scillæ, gummi arabicum, ragacantha minutim incisum: sic ichthiocolla, taurocolla, ficus, vuæ. horum vncias tres aquæ calidæ libra vna macerabis nocte vna, postridie recalsactum sacculo aut mantili ex tela noua forti impone, intorquendo exprime, virga lignea aut ferrea gracili percutere: succum eadem de radice: id fac donec succus effluere desinat, & semen exuccum & sicum euaserit, vel radix. Alij aquæ libras tres, vni seminum aut radicum libræ imponunt, alij libram vnam aquæ communis vel humoris alterius si requiratur, dant, vncijs quatuor seminum vel aliorum. Si autem succum vis liquidiorum, aquam auge vel semen minue: si crassiorum, contra.

Interdum etiam triduo macerantur, vt in diachylo communi quod à *χυλός* hoc est succus seu muccago, est appellatû, vt in sectione. 12. Mesuæ diximus, & lib. 3. meth. medicamenta componendi.

Quoniam vero Arabibus psyllij interior medulla calet, cortex friget: vbi refrigerandi consilium est, per succum psyllij, neque diu, nec multo calore macerant, neque valenter exprimunt: ne substantiam calidam foras extrahant, quam nonnulli in vlcere, admodum psyllij succo, cum aqua dulci extracto manifeste affirmant se deprehendisse, & morsum in vlcere caloremque excitatum quem succo alio ex psyllio clementissime expresso, postea compescuerunt, sed sola refrigeratrix facultas toti semini à Græcis tribuitur. Sic semen psyllij cum aqua fontis frigida tribulatur Mesues, & educum succum dat potui ad alium soluendam. Decocto semen psyllij macerat horis viginti quatuor in singulas rudicula agitando, deinde totum succum exprimit in oleo de psyllio, vbi non videtur timere venenosam virtutem occultam in parte feminis huius interna & calida quarto ordine: forte ob id quod

In simpl.

ipso decocto obtunditur & emendatur.

Ex taurocolla, & ichthiocolle, & coriorum ramentis, & partibus omnibus nervosum par-
ticulatum scilicet mucago quoque extrahitur, sed in usu medicis frequentiore est, quæ ex
ichthiocolle, id est pisicium, præsertim quos moruas vocamus fit. Satius autem est hæc ra-
sa aut limata ex aqua lento igni coquere, donec tabescant. Qui autem valido igni primo co-
quere aggrediuntur, vrunt, & incoctilem reddunt.

Solvitur quoque ichthiocolle hæc lotio, aqua salsa, aqua extinctionis calcis, aceto.
In emplastro diachylo magno, ichthiocolle aqua communi igni lento, aut super cineres ca-
lidos diu macerata & paulatim cocta, tota abit in cremorem.

Pellis arietina ad dissolutionem dum coquitur in emplastrum, contra rupturam, mucca-
go quoque ex ea extrahitur.

Ex gummis quoque mucago frequenter extrahitur potissimum arabico & tragaca-
tha, ut horum drachmis duabus in aquæ rosatæ vncijs. 5. 6. 7. solutis, ut in eclegmate sano, ut
sit albus & leniens magis. Muccagine ex gummi tragacanthi drachmis duabus aquæ rosarum
vncijs. 7. vel 8. solutis liquantur sacchari libræ quatuor ad hypoglottidum (quas pilulas al-
bas sub lingua vocant) compositionem.

Ex drachma autem una tragacanthi potes vncias tres quatuor plures mucaginis extra-
here: si multum & diu baculo aut cochleari percutias.

Ad mucaginem hanc reducenda est congelatio lentorum iusculorum à frigore facta.
Pedes enim vitulorum, colla veruecum, capi, perdicæ, & carnes aliæ præsertim nervosam
multam substantiam sortite coquuntur ex aqua igni primum lento deinde medioeri usque
ad carniū dissolutionem, seu donec iusculi portio exigua cochleari exempta & refrigera-
ta inter manus confricata, ipsas suo lentore velut ferruminet. Tunc omnia in mantile mun-
dum mediocriter rarum coniiciuntur, catino lato supposito, in quem humor defluat. ossa
cochleari, vncio, furcella eximuntur, reliquum mantili mediocriter intorto exprimitur.
Nam valens expressio turbidam faceret gelatinam, ut pedes veruecini nigram nisi exactissi-
me lauentur & purgentur. Mox adeps fiat deturbatur, & cochleari deraditur, iniectis post-
ea albuminibus clarificatur. Additur sacchari libra una cinamomi boni crassius triti vncia
una in cremoris libras quinque aut sex, & crocus si flauum vis aut linteolum succo florum
cichorii aut alio quouis imbutum, vnde opinor id linteolum tornesol vocant, uti & flo-
rem cichorii solequium, & gyra solis & sponsa solis vulgo dicitur, quia cum sole ut alij
flores multi circumagitur. Mox calidum adhuc per manicam ut vocant, hippocratis co-
lant prope ignem, ne ante tempus, frigore concreseat: neque per colum transluat. Vbi spon-
te sua fluxit, quantum erat fluxile ac liquidum, in patinas distribuitur: loco frigido, ut con-
creseat, reponitur.

Sunt qui ichthiocolle portionem cum prædictis incoquunt, ut citius lentescat, & magis
glutinosus cremor euadat.

DE DESTILLATIONE.

DESTILLATIO humoris è succo tenuioris extractio vi caloris, ad hunc lo-
cum omnino pertinet. Quæ vero ad eius rationem, vires, instrumenta, ignem
pertinent, fusissime lib. 3. methodi componendorum medicamentorum do-
cuimus. Hoc autem loco lectiorem tantum exercere statui in quibusdam destil-
latis paulo difficillioribus.

D

Per ascen-
sum.

Eodem loco & sectione nona Mesuæ, de oleorum genere quarto egimus, etiam de destil-
latione per ascensum, sic dicta, quod vapores sursum elati, ibi concreti, in aquam destillant:
cuius nunc usus est longe frequentissimus. Segmentis pini latifoliæ vas impletum aqua ro-
sarum affusa, si vase duplici destillas, succus emanans oleosus est odoratissimus, qui caphure
aqua vulgo dicitur.

Sirofæ quas incarnatas vocamus siccatæ, vapore aquæ calentis humiditate destillantur, a-
quam rosarum bonam reddent.

Destillata vapore aquæ calentis vires & qualitates plantarum integrius retinent, sed
quia excrementosa sunt parum diu seruari possunt. Diutius quæ cinerum aut arenæ aut scor-
riæ pulueratæ calore destillantur in vasis lapideis aut vitreis, quantumlibet multis super lon-
gam aut rotundam fornacem tegulis intactam, quæ sustineat arenas altas plumbo alto circum-
datas: sed vase hæc paulatim calfacienda & refrigeranda sunt priusquam aeri frigido ape-

riantur: alioqui mox rumpuntur. quæ autem plumbo destillantur, omnino improbanda cenſeo, propter ceruſam & qualitates alias plûbi maleficas, cum & aquam per tubos plumbeos deductam damnarit Galenus, quod dysenteriam excitat.

Destillatio per descensum nobis dicta in tertio genere oleorum Mesuæ, & quæ per hanc destillantur. Scillæ etiam recentes incisæ vasi inferne foraminulento sursumque lutato impositi, si flamma circumdatur, aqua in ollam aliam subiectam, simul cum huius fundo lutatâ defluet, quæ cum farina vel pane mista, gustata mures cito necare quibusdam creditur, citius si litargyri paucum misueris.

Rosæ recentes linteolo super peluim tenso impostæ, si vas carbonibus ignitis plenum acceperint, destillant aqua multa & odora in eam peluim. Eodem modo flores reliqui.

Quæ etiam per descensum est destillatio.

Si duæ matulæ sibi applicentur, & superior rosis impleatur & insoleatur, destillat aqua odoratissima in subiectam.

DE COCTIONE.

CVM IN omni destillatione coctio quædam fiat, per quam etiam aqua destillata succo est tenuior, & in omni coctione fieri destillatio possit, ut ollæ operculum aqua excoquensidorum vapore plenum indicat. Cum præterea ambo calore fiant ordine optimo, nunc dicendum nobis de coctione est, cuius partem maximam lib. 3. de ratione componendi medicamenta scripsimus ac indidem tibi repetendum est, ne bis de re eadem frustra sit agendum.

Coctio medicamentorum fere fit elixando in humore calido, rarius assando in calore secco. Coquuntur autem simul aut per se simplicia frequentissime, interdum & composita quædam.

Humor cui incoquantur magna ex parte aqua est, ac ea vel simplex, vel medicamentosa. Simplex item vel pluuiæ vel fontana, vel destillata: medicamentosa vero est salia, marina, aluminosa, sulfurosa, bituminosa, chalcantihodes, carbonosa.

Ad aquam compositam reducuntur, lixiuium, lotium, vinum, acetum, omphacium, ceruicia, hydromeli, cenomeli, opomeli, oxomeli, oxycraton, lac, serum, succi plantarum liquidi, oleum, resine recentes, adipēs, butyrum, mel, saccharum humore pauco solutum, & variæ in vnoquoque horum generum species, pro varijs medicorum scopis ut etiam interdum humores duos plures miscere sit opus. Secundum ciceri decoctum, lac vaccinum vel ouinum ad coquendas radices eryngi fatiui, raphani, dracontij, in Mesuæ. Quantitas vero huius humoris varia est, pro scopis varijs, ut in diaphyrio lac vaccinum vel ouinum sit quæcum duobus digitis supernatet, quod si coquendis radicibus id non sufficit, nouum affundendum sed calidum, ut in his coquendis omnibus sæpe admonet Galenus in alimentis, quod & coqui obseruant. In syrups, & alijs coctionem requirentibus. Quantum humor requiratur, lib. tertio audies.

Calor autem coctionis author esse potest quibus rebus coquendis moderatus (nam à solo calore mediocri sit coctio) non ignis solius, sed solis, animalis: calcis vero & fumi & putredinis fimi, aut corticum calor ad mouendis vsui esse potest, ut pſorico Galeni: fumendis vero lib. 4. simnoxius fuerit, ut ex carbonibus non ignitis nec semiustis, ex lignis putribus. Calor enim huiusmodi uti & fumosus qualitatem alienam cum empyreumate rebus coctis imprimit.

Electarium rosatum flamma lenta coquit Mesuæ, & syr. omnes igni lento.

Sint igitur ignis alimenta sicca & odora, ut sarmentum vitis, quo theriacem coquit Galenus: vel carbones semiusti, & qui tetram qualitatem iam exhalauerunt. sit autem primum blandus, & paulatim si res postulat, intendatur. coctioni enim vehemens & repetitus nocet, quod vrat, facultatem dissipet, empyreuma multum in re vsta non cocta relinquit.

Nec solum ignis calore, ut dixi, sit coctio medicamentorum, sed solis, ut scillæ, & ex ea acetum scillites dies. 40. Mesuæ insolantur, sæpe mouendo & hydromeli & syrupus alter calaminthes totidem dies, vel etiam duos tres plures menses flores populi & abietis semen oleo macerat Galenus, coquit, quodammodo multo magis si soli exponantur: quanquam lib. 4. scilicet quouis anni tempore faciat, ut pſoricum ex chalciti dupla & litargyro olla noua inclusum fimo, æstate media diebus canicularibus quadraginta sepelit, sic dum theriaca & similes a nridoti opiatæ menses vel etiam annos aliquot seruantur ad sui coctionem, quam fermentationem vocant.

Gal. i the
riaca & an
tidotis.

Coquimus medicamēta vel vt eorū vires imbecillas augeam⁹, incoctis simul his quę sunt valentiora vel validiores minuamus, vel alienas in totum abigamus, vel vt ex omnibus facultate diuersis & sæpe contrarijs simul coquendis facultas vna concreſcat & coaleſcat. Adhęc ob deſtinatam medicamenti formam, ob ſumentis palatum, ob ſimplicium naturam, ob cuſtodię diuturnitatem etiam quędam coctione longa ſiccamus: vti ob aeris humidioris conditionem.

Præterea vt purgentur multa coquimus. Ignis enim vt calida cætera homogenea cogit, & heterogenea ſeparat, vt ſimplicium vires in humorem cui incoquantur tranſeant, quoſi- ne ſiunt ſyrupi, apozemata, oleorum quartum genus.

Horum exempla aliquot fuerint hæc.

lib. 2. al.

Brasſicam lentam, oſtrea bis coquimus aqua ſcilicet priore abiecta, & noua calente affuſa cum alui per hęc ſiſtere volumus, ſemel vero cū mouere. Sic alliū, cepa, porri, ampelopræſum, & quicquid à veteri natura ad cōtrariam traducitur bis coquendum: ſic tamen, vt nec aerem nec aquam frigidam attingat. Nam plane tabeſcere & percoqui amplius non poterit etiam ſi diutiſſime coxeris. Quod præceptum etiam medicamenti commune eſt quibus li- quor nouus conſumpto priore eſt affundendus. Althęa adipibus incocta ſubigitur ad abſceſſus, coctū difficileſ, aqua mulſa viribus varia Galeno & Meſue pro coctionis quantitate.

lib. 6. ſim.

Oxymeli quoque valde coctū ſtatuſ diſſipat.

Ex Gale.

Ramenta loti atboris in aqua aut vino coquuntur ad capillorū deſluuium, Galeno in ſim- plicibus.

ſimpl. lib.

6. ph. p.

Melli alumen idem incoquit, radicem tithymali vel phlomi vino vel aceto ad dentium dolorem.

Omphacium, ſuccum mororum vel batinorum vel granatorum vel rhu, vel cydoniorum vel pyrorum agreſtium, nucum viridiū, cum melle coquit in ſtomatica remedia, radicem & ſemen arctij ex vino.

Dracontij radicem bis ter ex aqua coquit, vt acrimoniā deponat, & ſit apta eclegmatibus. Aſphodeli radicem, vt amaritudinem perdat, quam ſcilla diſſicillime amittit.

Bulbi radix cruda vel ſemel elixa bona eclegmatibus, bis elixa amaritudinem totam depo- nit, & ſit eclegmati inepta, cepa, allium, porrum, ampelopræſum, cocta bis aut ter acrimoniā deponunt, adhuc tamen thoracica ſunt.

Ari radix in aqua aut ſub cineribus cocta miteſcit lib. 2. alimentorum.

Bugloſſum in melierato coctum arteriacum eſt.

Brasſicę ſuccus cum melle coctus eclegma eſt.

Dactyli etiam in mulſo aut paſſo cocti.

Seroſa & eadem acris ſubſtātia lactis coctione vel immiſſis lapidibus aut circulis ferreis ignitis conſumitur ad dyſenteriam.

Hippuris ad eandem coquitur in aqua, ſi febris adeſt: in vino aſtero, ſi abeſt.

Faba oxycrato incoquitur.

Inſtrumenta coctionis ſunt vaſa omnis generis, aurea, argentea, ærea, ſtannea, ſtannata, ferrea, terrea: ſed hæc bene cocta ne qualitatem malam medicamento largiantur: & ea vel ſi- licea vt vocamus, ſeu cum Meſue lapidea, vel plumbata, præſtanſiſſima ſunt vitrea.

Sunt ea autē vel ſimplicia vel compoſita & duplicia (balneū marię vulgo dicta) qualia ad olea etiam calida & alia permulta Galenus commendat. Quę tamen hodie ob auariciam, negligentiam, malignitatem non vſurpantur. Fiant igitur vaſa ſibi incumbētia, ſed inter- uallo vbique digiti vnus diſſita, quod aquam contineat ſæpe ſufficiendā, niſi maior vas minus quod medicamentū coquendū continet, in maior aqua feruenti plenum, & igni con- tiguū immittere, Galeni more. In vaſe lapideo, id eſt ſiliceo, vt vocamus, coquitur miua ſimplex, & citra condita Meſue. Eidem vaſe duplici coquuntur oleū roſatum, violatū, nym- phæatum, melinum, papaueris, myrteum, ex pomis mandragorę, & anethinum, chamæ- melinum, ſicyonium, irinum, rutaceum, nardinum, maſtichinum. Sicque reliqua coquenda putem, quod oleum ſimplici vaſe coctum aſſequitur odorem terum & ingratiū, vt interim vires frigidas frangi, calidas intendi taceam, diacodium in duplici vaſe coquit Heras igni ſumi experti.

Crustum ex maza vel luto circumdatum ſcilicet vel ſcammonio & alijs eius generis vaſis lo- cum obtinet, vt i crustum idem & malum acerbum aliquod vel cydonium ipſi ſcammonio eſt tanquam vaſ duplex.

Finis coctionis eſt cum ſcopū nobis propoſitum attingimus, vel ſimplicem, vel etiam

multiplicem, vt si medicamentum coquimus ad vires eius augēdas, vel minūendas, vel abigēdas, dum quantum satis est auximus, minūimus, abegimus, satis coximus, eodē modo in scopis alijs. Sic quādam coquemus ad dimidias, tertias, quartas, librarum, duarum, trium consumptionem, dum omnia sunt probe vnta ad iustam crassitudinem, aut mellis sordium, cerati liquidī, emplastri consistentiā. Sapas coquendo siccamus, donec crassam asscutē consistentiam, vt seruari possint: sic & syrupos, eiegmata, electaria, vnguēta, cerata, emplastra. De quibus singulis accuratius in modo singula hæc genera componendi lib. 3. dicitur.

Diamorum cum melle coquimus donec gratum erit, & absumpta humiditate excrementosa feruoris & putredinis effectrice seruari annū vnū possit: id quod mel citra idoneam coctionem succo mororū prestare non potest, licet fructus integros cum pediculis certis interuallis ne se tangant, in se mersos loco frigido integros in annum seruet.

Testiculi ad Elec. diaphatyrion.

Capita papaueris ad diacoditū, capita ranarum ad oleum ranarum, vulpes ad vulpinū Gal. viperę ad passillos theriacos, & oleum viperinū coquuntur, donec ipsa coquendo in aqua intabuerint: stomatica & stomachica coques ad mellis, aut sordium crassitudinem. Mesf.

Electaria mollia ad simile consistentiam, solida verò coctū magis saccharū requirūt. Libaf. 6.

Syrupos cum saccharo aut melle, aut vtroq; coquimus, donec lentore tenaci & crassit. tuēdeq; fo inter extremos digitos explorato humorem excrementosum prope consumptum coniectabis.

Cocti sint syrupi quando incipiūt filum facere, siue cochleari, effundantur paulatim, siue inter digitos eius portio tractetur. Vel quando marmori, aut vngui imposita eorum gutta non diffunditur, nec aqua modo diluit: sed concreta manet.

Nicolaus
in syr. ro-
fato.

Quæ plena, sunt meliora: coctione deteriora euadunt: vt casia nigra, tamar Inditamar mannam, tamar Indos, medullam cassię in succis quibusdam depuratis, dissolutam coquit cum alijs semicoctis ad mellis spissitudinem in diamannæ, & in tryphera Persica, & in compositione alkecangi. In cofectione hæc eadem tria in infusione colata dissoluit, fricat manibus, colat, cum saccharo coquit ad mellis spissitudinem. In cofectione mannæ Galeno tributa, mannam succo rosarum sufficienti coquit igni blando ad sufficientem coctionem teromatim in aqua rosarū, & compositione sequēti, coquit eandem cum saccharo ad mellis consistentiam.

Emplastra coquimus dum manus attactu non inquinant adhæsit tenaci.

Coctū mel cum aqua, vino, alijs in antidotos & alia composita, tunc est quando marmori propemodum nihil adhæret.

Coctionis & trituræ ratio prope est eadem in medicamentis, vt scilicet quantam hæc trituram viribus integris ferunt, tantam quoque & coctionem. Quæ enim magna, crassa, lenta, siccā, dura, densā, nervosa, membranosa, virtutem firmam, & valenter ac penitus mistam sortita longiorē sustinent coctionem ob id prima vasi coquenda immittuntur: qualia sunt metallica, terrea, styptica, quatenus styptica sunt (rosę enim, absinthiū, rha barbarū, aloë, myrobalani, agaricus, amaram quoq; qualitatem in superficie habēt, & eam purgatoriam, ac faciliē resolubilem, ob id minus coquēda quàm styptica substantia postulat) radices ob id prope omnes, quia terræ magis, incise aut confractę, vt aristolochia, cucumer agrestis, hermodactylus, polypodium, & c. etiam post coctionem terendę, vt promptius cribrentur in diaphatyrion, Mesf.

Sic rha barbarum quando astringere consilium est, ac myrobalanos omnes diu coqui oportet: si verò purgare, tergere, aperire, parum coquenda, aut potius infundenda.

Mesf.

Glycyrrhiza tamen parum diu coquenda, opinor ne cum admodum sit dulcis, coctione longa dulcium cæterorum modo, amara euadat: præsertim cum iam vetustate amaricat, cum verò recens est humiditatem excrementosam nata cum alijs radicibus initio coquitur, vt in syr. hyssopi, ziziphorū, glycyrrhizæ, & thoracis alijs.

Actia quoque diu coqui possunt si eorum acrimoniam obtundi volumus, nisi virtutem imbecillam, & facile resolubilem sint sortita.

Colocynthis centaurium paruum cum floribus, & semine plenam coctionē tolerāt.

Quæ contra sunt minuta, tenuia, fluxilia & friabilia, humida, mollia, rara, virtutē imbecillam, superficariam, male permistam sortita parum diu coquēda sunt, ob id postrema sunt percoctis prope alijs iniicienda, qualia sunt rosę & violæ recētes. Siccę enim & harum succus magis coqui possunt. Gingidium elixationē diuturnam nō sustinet Gal.

Mesf.

lib. 2. alimentorum.

Bulbi exigua admodum elixatione sunt cōtenti; Daucus autem ad esum diutius elixandus quān pastinaca.

Paulus li. 7. cap. 20 Nullus florum coctionem recipit, ob id olea cum floribus facienda insolantur. Si autem flores valida sint odoris gratia, ut rosa, chamæmelum, quæ pluribus diebus cōstet, insolatu tenuius, & vtilius oleū euadit. Qui verò flores sunt inualidiore, & facilius diffilantur, minus diu insolantur quia eorum virtus prompte vanescit, ut lilium, violæ.

Mesues. Parum diu integris viribus coqui possunt epithymū, flores stœchados arabicę, diutius folia.

Quæ verò has qualitates adhuc insigniores habent, coctionem nullam sustinent: sed sublati ab igni alijs miscentur, vel adhuc calentibus quando firmiora sunt: vel iam refrigeratis plurimum quando ne vis eius tenuis & lubrica calore solata in aere m exaleat metuitur.

Quæ purgant lubricando coctione non admodū iuuantur, Mesuę: tamē casia, manna, Tamar Indi interdū ab eo coquūtur, sed parū, nec adeo ut vis eorū lubrica perdatur.

Mef. Quæ in horū sunt medio coctionē tolerant mediocrem, ut absinthium, asarum, agaricus, coccum gnidium, fumaria, fenna, squilla, iris, hyssopus, thymus, turbit, semina omnia præterquam cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli.

Mef. Rha barbarum exquisitum multam satis coctionem & trituram sustinet, raro autem & laxo etiā mediocri coctio est vehemens, & eius virtutem resoluit.

Ibidem. Tamar Indi coctionem ferunt mediocrem, multa enim vires eis omnes admittit. Ob id ipsi & casia liquore idonco soluta, colata melli aut saccharo ad humoris cōsumptionem cocto adduntur, & ad iustam consistentiam percoquuntur, igni ablatis & parū refrigeratis pulueres miscentur.

Coquendæ igitur in plantis radices primæ, ut dixi, concisæ vel confractæ, quibus coqui cœptis semina sunt iniicienda, exceptis feminibus cucumeris, cucurbitæ, melonum, citreoli, substantiam tenuiorem vreticam sortitis. Tunc etiā cortices & ligna modice confracta. Post hæc herbæ siccæ parum concisæ, aut si crassiores sunt confractæ, deinde virentes, incisæ minutim, aut manibus torquendo confractæ, excepto omni adianto, & lactuca agrestis, quam endiuuiam vocant.

Deinde fructus exossati, & semine purgati, excorticati & (si magni sint) incisi, ut pruna, ficus, myxa, zizypha, vux passæ.

Postrenii flores, epithymum, stœchas: sed chamæmelum licet tenuis sit essentia, quia tamē fortiter mistam habet facultatem, longule coqui potest, ut schœnuanthos si haberi potest heliocyrysum, stœchas, citrea vulgo dictum.

Succi quoque siccati, liquores, gūmi, resina, manna, casia, liquore aliquo soluta, sub finem iniiciuntur. Liquores enim vino vel aceto soluti, colati, cocti, ad humoris additi cōsumptionem alijs extra ignem miscentur rudicula semper moti.

Moschus, ambra, caphura, lapides pretiosi, pulueres aromatici, & cordiales ab igne depositis, alijs & iam tepentibus iniiciuntur.

Rosæ autem, rha barbarum, aloë, agaricus, myrobalani, si purgatorium vis medicamentum parum diu, ut dixi coquenda. Nam vim eorum purgatricē superficiariam, parum firmiter mistam ab his corporibus raris coctio multa facillè dissipat. Si verò astringentium vis medicamentum, diu coquenda, ut dissipata vi purgatrice, terrea & astringens tandem foras eliciatur.

Mesues. Violæ etiā parum coquendæ, quando purgare lubricando consilium est: si attrahendo multū, ut facultas ea in ipsarū ceu centro posita foras trahatur, coctionis vehemētia.

Scammonium si in pomo est præcoctum, absoluta coctione iniicitur: si crudum est, crassius tritum misceatur in media coctione: non autem tenuius, ne etiā vis eius purgatrix exhalet. id quod & accidit coctione vel vnica, sed longa, vel duplici, vel si medicamentum diu ante vsum seruandum est, vel si accuratius ante coctionem teratur.

Scammonium autem si calorem sentit, in grumos coagulatur: qua re fit ut interdum in vna dosi alicuius medicamenti, plurimum sit scammonium, in alia minimum: sicque inæquale est medicamentum, ob id ad finem iniicitur.

Quod autem tritura similem esse viribus coctionem dixi, recte accipiendum. Calor enim ab igne vehemētiore, & tenuior quān ex attritu pistilli, mortarij, durorum terendorum: ob id etiā medicamentorum vires citius dissipat coctio quān tritura. Quapropter aromata teruntur quidem, quanquam minus quān alia: sed tamē quantum teri

est necesse, non coquantur autem, sed reliquis iam percoctis, & ab igni depositis, vt dixi miscentur antidotis, vel mollibus, quales veteribus in vsu fuerunt, vel siccis & solidis nobis vsu frequentissimis, vt cinamomum, agalochum. Sic aurum & argentum bonum & foliatum, quamquam diu coqui sustinet, vires tamē nullas coctū tradit maiores quā crudum, sic margaritæ, cyanus præparatus, ambra, moschus non coquenda.

Coctio facta ad dimidias, tertias, quartas, vel aliam cōsumptionem, postea residendo, & albuminibus sæpe purgatur & colatur, deinde percoquitur, quod in syrups frequenter obseruablis. Multis etiam coctio duplex debetur, vt vtrique antidoto, Alcanzi, catholico, diafatyrrio vtrique.

Ad coctionem multis sæpe alijs medicamenta paramus. Quædam ante intus & foris purgamus, terimus, lauamus, affamus, vrimus, infundimus.

Quædam alijs iuncta illorum coctionem accelerant: sic vrticæ, radices carnibus incoctæ eas coqui celerius iuuant: vt contra nymphææ radix incocta pisfis, ea ad vñum olla velut ciaculatur.

Ichthiocola cū calce viuā cito cocta mox dissoluitur, sed vide an affectus calcis viuæ vires requirat.

DE DESPUMATIONE.

DESPUMATIO est spumæ detractio, cuius materia hoc loco est non solum succus quidam lentus *includēs flatum*, vt Galeno in Aphorismis docetur, sed fordes omnis leuior à calore ignis exputata, vel etiam grauior albuminibus coacta & colligata. Despumamus autem nūc simplicia, vt succos, saccharum, mel: nunc composita, vt apozemata, syrupsos.

Mel cum aqua, aut vino, aut aceto, aut humore alio pro viarum medicis scopis despumatur. Nam per se coctum mox immodice effervesceat, & derepente exundat & flammis conceptis incendij periculum affert. Adhæc cum sit dulcissimum, euaderet amarū si per se coqueretur donec despumatum esset.

Mel humore æquali hodie quibusdam despumatur, alijs duplo. Spuma autē interea Mel aqua dum igni lento coquitur, cochleari pertuso deraditur. Adhæc cum ad dimidias est co-
ctum, & multum feruet, ad duntur albumina singulis libris singula. Deinde calidum co-
spumatur, post percoquitur per se, aut cum condiendis & incoquendis medicamētis, spuma
si alius hu-
quoque tunc si qua æmicat curiosè detracta, si per se seruandum est. Vel in rem præsen-
tem paratur ad pulueres cōprehendendos, qualia sunt antidota omnia melle excepta o-
piata & sine opio. Si purius est mel, sufficit aqua æqualis, nec tantum albuminis requiri-
tur: quod si purissimum est, nec despumandum, nec clarificandum.

Sed huius regionis mel cum sit crudum & impurum, multam reddit spumā, ita vt des-
pumando & colando ad dimidias minuatur. Quapropter pōdus duplum ei quod cō-
positio exigit initio tibi immittendū, si cū alijs despumandū incoquis: sin minus despu-
mato vtendum. Finis despumationis quibusdam est tēpus horarum circiter duarū cum
igni lento. Alijs rectius cum spumare desinit, alijs donec aqua erit consumpta (quæ res
bullis cognoscitur) & mel idoncum lentorem acquisuerit.

Non autem probo cum Seruitore mellis libram vnam coqui in aquæ libris decem, continenter despumando, & aqua hac prope cōsumpta libras alias quinque addi, & his prope consumptis alias quinque. Hoc enim modo mel aut vri, aut totum vanescere est necesse etiam si aqua addit largior.

Sæpe autem mel per se despumatur & purgatur, cum tam lōgam nō sustinet coctio-
nem aliorum natura, cum quibus mel coquendo despumaretur. Interdum cum his de-
spumatur cum scilicet multam coctionem viribus integris sustinere possunt, vt in dia-
cydonio mel coquitur cum succo cydoniorum, & coquendo frequenter despumatur, &
alijs passim. Frequentius tamen per se (vt dixi) despumatum miscetur cōditis, syrupsis,
antidotis: rarius crudum, præsertim nostras. Quod autem albū Gallia Narbonēsis thy-
mo passim luxuriāns mittit, est præstātissimum: nec Attico aut Hyblæo inferius, cum
regionis temperatura & thymi larga luxuries vtrōque consentiant.

De saccharo idem quod de melle dicendum, cum sit ipsum mellis species etiā Dio-
scoridi & Galeno.

Impurum enim & nigrum, aut nigricans in triplo humore despumatur, cum ad di-
midias est coctum, & valde feruet, adduntur albumina singulis libris singula, colatur ca-

lidum post percoquitur studiose: interim etiam despumando, si spuma aliqua appareat. Si autē purius est satis est dupla aut equalis (vt ferè fit) aqua, & pauciora albumina si purissimum, nec despumandum, nec clarificandum.

Succi fluxiles recipiendi in sytupos, apozemata, electaria, quædã igni despumantur, residendo clarescunt, & in colo lanceo terreum excrementum relinquunt, interim verò etiam additis albuminibus, & melle aut saccharo purgatur, quoties in syrupos, vel apozemata coquuntur, vt in syr. bizantino, & alijs, & in elec. psyllij. Qui verò succi in emplastra recipiuntur, vel sole vel igni post mitionem siccantur, non despumantur.

Liquores verò solum colo purgatur post dissolutionem, non etiã despumantur, tantum abest vt clarificentur. Idem de metallicis & animalium partibus constitue.

Quod si simplicia omnia sunt pura aut purgata, satis est horũ decocta per colum sa-
neum aut telalaneum: sed modice densum semel aut bis trãsmittere sine vlla expressio-
ne, colo, si opus est, mutato: deinde ipsum immitte in saccharum, si impurum erat clarifi-
catum. Si autem purũ est, clarificatione non egetur, & percoque donec humoris: seu
decoctum est, seu succus, seu aliud vñ cia tantum circiter duæ: aut si succi sunt glutino-
si, etiam trës & quatuor in sacchari libra super sint. Si succi acidi, percocto iam saccha-
ro prope toti inuoluuntur, vt dicemus initio syruporum.

DE CLARIFICATIONE.

CLARIFICATIONIS obiter in despumatione memini. De ipsa autē nũc

C

pauca mihi sunt dicenda quod hæc rerũ liquidarum decoctis debeat expurgadis, vt i despumatio & colatio, vt forde crassiori purgata, sint gratiora palato, & in corpus facilius distribuuntur & salubrius. Clarificatur autem quædam per se, dum quod fœculentum est subidet: vt succus rosarum, limonum, cydoniorum, citrorũ, ribes, oxyacanthæ, granatorum, siue mox reponantur loco frigido, siue in officina aliquandiu feruentur. Quædam interueniente coctione à sole, vel igni, vt succus pomorũ dulcium & acidorum ad dimidias coctus dies duos quiescere permittitur, donec clarescat: vt syrupus de pomis Mesue fiat. sic succus acidus citri ad partis tertie cõsumptionem coctus, biddũ quiescere sinatur, vsque dum clarescat in syrupo ex succis fructuum acidorũ. Tamẽ acidi succi hodie in syrupos aliter, vt dixi, & in syrups dicturus sum, recipiuntur. In his autem coctio ratione optima adhibetur, vt calor homogenea in vnum cogat, & separat heterogenea: quomodo vrine in nobis cœptę coqui turbide si red datur, postea tenuatur, & clarescunt, subsidente crasso.

Cum verò calor ignis sordes in succis exquisitæ separare non possit, vt noster calor natiuus aliena coctione perfecta segregat, cùmque metumimus ne coctione tam longa succorum facultates corrumpantur. Satiùs putauerunt medici cœptam ab igni sordium secretionem arte alia iuuare, & ea multiplici, nũc quiete succi post coctionem, vt nuper dixi, nunc aceto simul incocto: nunc agitatis diu albuminibus, vt interim despumationem omittam & colationem à nobis adhiberi solitas ad perfectiorem succorum, vel decoctorum purgationem.

De ea autem clarificatione quę fit per se & post coctionem residente, satis est dictũ, de ea quę fit per acetum & albumina iam nobis dicendum est.

Decocta & syrups si acetum recipiant per se, vi aceti non nihil purgantur: melius autem si etiam albumina accedant, etiam si post colaturam acetum recipiãt, quando nihilominus continẽter est despumandum, quod acetum etiam ex purgato iam decocto spumas & spurcitiam quandam iaculetur.

Nicolaus
in syr. ro-
fato.

Oui albumen ex aqua frigida scopulis agita, donec in spumam abeat, quàm particulatim syrupo, vel alteri decocto feruenti inspergas: & vbi nigrerit, cochleari foraminulento deradas, nouam inspergas: id fac donec erit syrupus clarior. Alij vbi ex bullis clarius decoctum vi ignis factum animaduertunt in id tepidum (nam calidius albumen coqueret in frigidiore minus prompte & parior spuma elicitur) albumina singulis libris singula, sed etiam pluribus pauciora iniiciunt, scopulis agitat, vt spumescat, saccharum in particulas contractum cõijciunt, recoquant: vbi spuma subedit, igni auferetur, calidum, si crassum est & vix colabile, colatur. si facile colatur, sed turbidum, tepidum vel frigidum colatur, per manicam Hippocratis, melius autem per pannum clauis

quatuor, angulis quatuor firmatum. Colatur autem ter quater si non satis claruerit: si ne sic quidem albumē separatim in aqua agitatum, scopulis inspergitur decocto igni red-dito, spuma illa vsta, alia inijcitur, idque toties donec bullę clarum satis producat. Tunc colatur quoties est necesse.

Cribrationi colatio, vt ante dixi est persimilis: sed illa fere siccorum est, hæc humi-dorum. Illa corpora grandiora foraminibus cribrorū non transmittit, hæc sordem hu-more crassiores transiit prohibet.

Eius differentiæ ex eo sumuntur, quod quædam calidissima colantur, quædam fri-gida, quædam tepida. Item quod quædam vno, alia duobus, alia tribus colis egēt. Item quædam colis lineis, alia cannabinis, alia laneis, alia telalaneis, alia setaceis & stami-neis, vt vocant, alia nouis, alia detritis, alia raris, alia densis, alia bis ter colanda donec nobis propositam perspicuitatem sint assequuta, vt in syrupis, ex succis fructuum & her-barum, & ex decoctis leges.

Quæ crassa sunt aut lenta calidissima sunt colanda, & humore ampliore vel tum di-luenda sunt, vel initio coquēda, vt facilius transineant. Colo eadem raro & detrito prō-ptius colantur, non tamen purius, sed frequens colatio coli densitatem supplet, ac rari-tatis incommodum redimit.

Oenomeli colatur panno raro.

Tenuia vt succus linionum, citri, semifrigida, colo denso, & nouo colari possunt. aut si tribus colis ea vis purgare, summum sit stamineū, medium pāneum: sed vetus, infimum panneum & nouum, vel aliter densum.

Sacchari libra si aquæ tantum vncijs octo sit soluta, cocta, clarificata, panno rariore colanda est.

Colis tribus vsi sunt maiores nostri, summo, minimo, & rarissimo, infimo, maximo & densissimo, tertio horum medio magnitudine, raritate, situ, vt tamē ab vtroque digito-rum 4. intervallo distaret.

Magnitudinis autem & texturæ horum ratio erat, vt primum sordes tantum crassas transitu prohiberet, secundum etiam mediocres, tertium etiam tenuissimas, vt scilicet quod ab hoc transmittebatur esset illime, & sordis omnis expert. Si verò solo raro vsi fuissent, colata fuissent impura & nō colatis similia. vt si per linteū colas aliquod deco-ctū, si solo denso id a crasis sordibus statim obstructū alijs viā negasset, ob id vel mutā-dum, vel sæpe ablucendum fuisset. Quod si vnicō voluissent vti medio, rationabilis & felicius vsi fuissent. Minimū verò primū, quia in eo humor incipit latius spargi versus panni ambitum, vt vides non in laneis tantum, sed etiam lineis. Gutta enim medio in-fusa se in vicina spargit. Ex omnibus autē partibus quas imbuit, defluit, ita vt in secun-dum insuat latius, quā in primo humor contentus cernitur. Secundum item latius im-buitur quā quibus partibus humorē à primo excipit, & pluribus partibus stillat in in-fimum quā sit contactū à defluente ex primo humore. Male igitur primū statuas ma-ximum, quāquam ex hoc nullum sequetur incommodum aliud, quā quod ociosa est hæc capacitas: Satis enim est si capiēdo humori sit satis: quantū intelligi volo dum minimū requiro. Non enim minimum absolute volo, sed alijs duobus angustius: si verò infimum sit minimū, multus humor ab hoc non colatus prope ipsius oras in vas subiectū defluet.

Nūc vnicō vitmur colo magnitudine & textura mediocri, sed eius actionē ante iua-mus clarificatione per albumina omne spurcitie cogēte, adiutiū id frigido. Quæ enim clariora volumus, frigida colamus: aut si talia non permeant, tepida. quæ si semel colata non sunt pura satis, iterū & tertio colamus, & rectis colum aut lauamus aut mutamus. Id quod etiam facimus dum tardius humor permeat: si autem tardius transfluat ob de-cocti crassitiē aut lentorē, vel calidius colamus, vel per colum rarius, vel si cōpositi na-tura patitur, liquidius aliquid & tenuius miscemus, vt dum cremori hordei colādo, aut pisorum, aut fabarum, aut similium decoctum ipsum affundimus. In tarda autem hac colatura, caue, rudicula vel digitis fundum coli scalpas, vt colationē celeres. Sic enim turbidum erit colati: sed vt dixi muta colum aut laua, aut humorē redde liquidiores, vel igni, vel misto humore aliquo.

Colamus quoque etiam citra coctionem quædam, vt lac recens multū, ter pilos & sordes alias foris illasas separemus, quem vsum rusticis, & pastoribus præstat interdum aparine. Sic hodie vinū cū saccharo & cinamomo per cola lanea oblonga pyramidis fi-gura (quæ caligas & manicas Hippocratis appellant) colamus ter, quater, donec omni-nō clarum erit, idque hippocraticum quoque vocamus, tanquam inuentore Hippocra-te dignum.

Mesues

DE MEDICAM. SIMPL.

Aliter etiā cum melle, & ceteris colamus ad claritatem, & cœnomeli id, ac melites vocamus claretum.

Modo persimili gelatinam quam vocant colamus, vt ante à nobis est scriptum.

Quædam his citius clarificandis miscentur, vt si vni quartæ vini albi duos laetis digitos misceas ante colaturam, ipsum mox clarissimum reddunt.

Aliter quoque res turbide colantur aut miste: sic in Aegypto aquâ Nili turbidâ vasis figulinis crudis colari docet Galenus, vt tantum quod clarissimum est per vasis poros, aut etiam teneram & mollem substantiam perfluat. Parrhisij autem Sequanæ aquam, & Romæ Tyberinam, vasis figulinis coctis probe & filiceis præferunt, aliquandiu in cella vinaria deponunt, vt refrigeretur, & simul residendo formem terreâ in fundum deponat.

Aquam quoq; turbidam colabis per arenas puras vasi immixtas inferne pertuso, foraminibus exiguis aquæ peruijs inuijs arenas.

Vinum quoque aqua mistum per cissimbium, id est, vas hederaceum tenue, citò perfluat: aqua autem in eo retinetur, vt sæpe sumus experti, ex Catonis doctrina.

DE AROMATIZATIONE.

AROMATIZATIO nobis vocatur cõditura quædam, compositis ferè ad odoris spiritum animale simul & vitalem & cor ipsum recreâti gratiam, adhibita mistis rebus aromaticis.

A

Simplicibus, vt moscho, ambra, caphura.

Zingibere, cinamomo, macis, croco, calamo aromatico, spica, pipere albo, longo, nigro, caryophyllis, mastiche, xilaloe, cortice citri, santalis, vel cõpositis, vt Gallia aromatica, Gallia sebellina.

Mesues aromatizat moscho diasatyrum, aqua rosarum soluto, & alijs misto electarium, sarbotens, diasatyrion, secundum aromaticum, rosatum stomachicum.

Syrupum ex corticibus citri, cydonia condita. Citra autem condita, moscho & ambra aromatizat.

Caphura autè syrupum acidum de pomis, Trochisco Galliæ Sebellinæ, moscho, ambra, caphura.

Hydromeli quidam aromatizat speciebus, vt zingibere, croco, cinamomo, macis, & similibus.

Nodulus ex pannò lino raro, continens croci, cinamomi, calami aromatici, spicæ, zingiberis, piperis nigri, & logi ana drachmâ vnâ & dimidiâ syrupo stœchados immititur, & suspensus manet ad condiendum, seu aromatizandum, sic miua aromatica nodulo aromatatum pleno in ipsa suspensio & sæpe cõfricato, vt ante in cõfricatione diximus.

Syrupus de mentha aromatizatur gallia aromatica.

Conditum citri gallia, moscho, croco, mastiche.

Conditum buglossi, moscho & gallia.

Syrupus ex omphacio, caryophyllis.

Syrupus intybi cõpositus santalis, cinamomo, xylaloe, cortice citri.

Sic alia multa præter consistentiæ & saporis gratiâ, odoris quoque iucunditatē, sed etiā coloris, de quo mox, requirit. De quibus abundè à nobis scriptum est in methodo medicamēta cõponendi, dum hæc rationem in cõpositis habere docebamus, interdum sine qua medicamenti actio non fiebat, & per quam melius fiebat. Iulepos ex syrupis & aquis destillatis hodie miseri solitos, apozemata, cinamomo, & santalis aromatizamus, immixtis colo horū drachmis circiter duabus in humoris libras singulas, aut pluribus, aut paucioribus pro vario medici scopo. Et vinū aromatites, & quod hipparaticū vocant, & alia multa aromatibus condimus.

DE COLORATIONE.

OLORATIO quoque multis medicamentis acquiritur ad gratiam magis & iucunditatem, & terrorem auferendum, & causas alias, quod etiam libro 2. methodi medicamēta cõponēdi docuimus. Sinopidē aliqui, alij ochram cerato Galeni dia euphorbiū miscuerunt, vt hoc colore fucatum, ceratum, vnde cõponitur, lateret. Miseri potest floris salis aliquid, aut simile quod colorem eius mutet, neque vim eius minuat. Quæ Galeni verba diligenter sunt obser-

C

Gal. li. 6.
methodi.

Idē ibidē

uāda, ne scilicet coloris mutādi ratio vires nouas medicamēto acquirat, aut priores au-
geat, vel diminiuat, siue colorē mutare libet noua re mista, vt in oxycrocco, siue vno ali-
quo simplici aliter atque aliter preparato, vt ceratum Galeni ex ærugine cruda viride
est ac terrens ægros ex eadem vīta est melinum, vt Galenus docet lib. i. c. ph. g.

Sic ex cerula cruda emplastrū est albū, ex ochra pallidū, ex ipsdem probe vītis rubrū.
Sofus quoque motus colorem quāsitum sæpe medicamento acquirit, vt ex liehargy-
ro nutritū longo pistilli attritu fit albius.

Penidia quo diutius rudicula, & manibus tractantur eo albiora euadit, etiā si ex vi-
li & impuro saccharo fiant: sic pilulæ albæ, diatris simplex, diatragacanthum frigidum,
sic saccharum rosatum, & saccharata reliqua.

Mel crudum & coctum in antidotis diu cōmiscendo albius euadit, & cætera mellita.
Iulep coctum ad succorum in syrupis comprehensionē, baculo diu versandum, vt al-
befcat, & alia multa simili agitata albefcunt, forte quod aer multus in commiscendo re-
ceptus albarem conciliat.

Sic album rasis vinegētum & citrinū, & emplastra diachylon, & ceratum Galeni re-
frigerans albū, de cerula, grātia dei multū diuque subigēdo, trahēdo albefcunt, & ox-
yrocceum pallefcit.

Oesypus quauis niger est, multa agitatione albū facit emplastrum, vt glutinosa alia.

DE EXCEPTIONE.

Excipiuntur & comprehenduntur colliganturque, seu vt vulgo loquuntur in corpo-
rantur medicamenta humore aliquo ad saporis gratiam, diuturnitatem, virium conser-
uationem, fermentationem, medicamenti constituendi formam, vsum dexteriores.

Eclegma ad asthma melle excipitur, vt sit suauius & vsui aptius.

Eclegma amygdalatum excipitur melle, & succo fœniculi.

Electaria prope omnia, præsertim mollia melle excipiuntur ob dictas causas, sicca sac-
charo humore aliquo soluto pulueres succo cucumeris agrestis cōprehenduntur, in hic-
ra Hermetis.

Pilularum materia excipitur vino, succo absinthij, solani, foliorū citri, brasseæ, apij,
intybi, pilulæ aureæ mucagine tragacanthi, coctæ rasis, & Mesue succo absinthij.

Pilularum hermetis species ladano excipiuntur cum pistillo calido.

Trochisci galliæ moschata comprehenduntur mucagine, tragacanthi in aqua rosa-
rum soluti, vel ambra oleo balanino soluta.

Mel quo solutua excipiuntur vino quā aqua potius coquēdum & despumandum,
nisi aliquid prohibeat.

Exempla alia ipsius, vt sic dicam, incorporationis in electarijs Mesue antidotisq; a-
lijs & ceratis, & emplastris tam sunt multa, vt nemo desiderare possit: nec plura descri-
bere libuit, ne oratione proluxa displicerem.

DE FORMATIONE.

RDINE rerum gerendarum succedit medicamentorū cōprehensionī ipsa
eorum formatio cuique composito sua cum scilicet vnumquodq; formam
habet idoneā, quæ in quibusdam a consistentia differre non videtur, vt in
conditis, sapis, syrupis, eclegmatis, apozematīs, antidotis mellitis, pilulis,
trochiscis, vnguetis, ceratis, emplastris. Forma ipsius cōpositi est consisten-

tia liquidior, crassior, mediocris. Sed in multis præsertim siccis, præter hanc consisten-
tiæ formā alia quædam nostris manibus, aut alia re apprinnut, vt saccharū in vasa dum
recens coctum est coniectum, illorum formam pyramidis, scilicet ac metē cuiusdā re-
tinet, & quæ ex saccharo imagines formantur, aut cera, aut alio dum calet liquido, ob id
terminum alienum faciliē induente dum refrigeratū coitit duro, ob id formam tunc as-
sumptā pertinacius retinente: sic electaria solida in tessellas, nūc rhomboides, nūc qua-
dratas, nūc triangulares: sed altera parte longiores, quales manus Christi vulgō dicun-
tur, nūc triangulas: sic pilulas fingimus orobæas, id est, magnitudine & figura orobi, vel
ciceris, scilicet orobei, non arietini qđ inæquale cū sit & acuminatū, figurā habet pilulis Lib. 7
inceptā, sic & uduua, i. granula, seu pilulas paruas (vnde vt dicemus lib. 3. pilulæ coclea ra-
si, & vulgo dictæ videntur) granorū. i. paruorum magnitudine & forma fingit Paulus. Nicolaus

Trochisci quoq; cōplanantur, & in medio cauātur, & fere postea sigillo aliquo pressi: Alexātri-
notātur. Quæ de re mox quoq; dicturi sumus, vnde & a formā hac, vt pilulæ a paruq; pil-
lus in gal effigie nomē sibi adoptauerūt, & pter id alia quoq;, nā cyclisci. i. parui circuli, & artisci lia mo-
i. pastilli, seu parui panes etiā Græcis appellantur. Sūt enim velut circuli, hoc est, super-
schata.

ficies planæ vna circumferentia à centro æqui distante conclusæ, nō autem spherica sunt corpora, vt pilulæ.

Cerata & emplastra formamus in offas, quæ apud Galenum *μαρμαίλα* vocantur (vnde vulgo corruptum puto vocabulum magdaleones) hoc est, cylindraceæ quædā figure.

Quædam trahendo manibus ex vnco ferreo producuntur, intorquentur, & in quamlibet figuram mutantur, vt penidia, & quæ alpheni vocant.

Qualiter quibusdam quoque trahuntur emplastra, diachylon, gratia dei, sed post in magdalias componuntur.

DE SIGILLATIONE.

SIGILLATIO quoque (vt vocant) seu sigilli alicuius impressio, inter præparationis differentias numeranda est. Quæ quanuis haud ita magnarum virium esse videatur, vt cum ex pilulari forma per sigillum ligneum fingis trochiscos, tamen & per se veteribus magni momenti fuit, & per accidens sigillatio. Per se quidem, cum terram Lemniam, sigillo Dianæ imaginem habenti notabant, à qua facultatem aliquam his trochiscis imprimi putabāt, vt & Nichepsos rex anulis insertum iaspidem viridem draconis radios habentis imagine scalpi volebat, quod tamē ceu vanum reiiciendum censet Galenus. Quamquā & illa Dianæ imago in sphragide lemnia, hoc est in sigillo, seu sigillata terra Lemni insule, etiā per accidens proderat, quod pastilli hac notati plane veri significabantur, non quo hodie modo omnes adulterinæ nostrates terræ sigillatæ. Eisdem ad me Constantinopoli sunt delati, characteribus varijs à Turca obfignati.

In pastillis quoque Theriacis, & medicamentis omnibus, quæ ab exteris corrogamus, vtinam vel characteres aliqui, sed certifide, vel publica, vel principum apprimerentur, quod pannis laneis, & sericis gentes multæ etiam hodie faciūt. Non enim toties grādī pecunia adulterata, & spuria pro veris reciperemus, aut saltem qui vendunt primis institutoribus, & hi deinde alijs, chirographo, aut sacramēto aliquo cuiusque verendo vera se vendere affirmarēt. sed nostra opinor locordia illos efficit audēter furaces. Cum enim vera ignoremus, neque illa nouisse multum haudenus sit à nostris pharmacopolis laboratum facili illis imponitur. Incumbite igitur, incumbite modis omnibus, vt vera deinceps habeantur. Homini elephantico dedi, non multis ante mensibus trochiscorum theriacorum libras prope duas, quibus nō est mutatus magis quam si terram sigillatam nostratē deuorasset. tamen qui vendidit affirmabat è mōte Pessulano allatos & veros. Quod tamen falsum illi ex Galeno probaui, tamen quia egebatur, & veros affirmabat, grandi pecunia emimus, nullo tamen vt dixi successu. Quæ fraus in cæteris quoque medicamentis nisi diligenter cauetur late patet, magna animaduersione coerenda.

DE REPOSITIONE.

REPOSITIO medicamentorum tam simplicium quam compositorū in locum aliquem, tum communem, tum propriū ad conseruationem (de qua mox dicā) magni est momenti, & item quod quædam per se reponuntur, alia cum alijs ipsorum virtutem conseruantibus, vel etiā augmentibus, aut saltem quam minimum fieri potest minui permittentibus. De hac generatim quædam diximus libro tertio methodi medicamenta componendi, sed hic paulo fufius dicendum.

Reponimus quæ seruari volumus, conseruationem verò nihil tam vitiat quam putrefactio. Quam ambiens calor aut frigus, aut aer corruptior, aut excrementosa rei seruandæ humiditas, & calor imbecillus accerfere solet, ob id quæ integra diu seruari volumus omnino ficcamus, tum absumpta ipsorum superflua humiditate, tum mistis siccantibus: sæpe etiam astringētibus. sic condita, sapis, syrupos, antidora ex humidis præsertim temperata, pilulas, trochiscos, & vnguenta quædā & cerata & emplastra igni, vel sole ficcamus, misto his quæ sumuntur etiam melle, aut saccharo, aut vtroque remedio siccante: aliquibus & acetum & sal profunt, alijs metallica, & terrea ob siccitatem putredini diu resistentia.

Ergo quæ reponenda sunt simplicia, & composita omnino quātum opus est sint sicca: sic & vinum seruendo in lacu, aut dolio humiditatē corruptionis sui, & feruoris au-

thorem si validum est, nec ea tam multa consumit. calorem externum vitamus fuga solis, & res ipsas in loca minus calida, aut etiam frigida seponendo. Frigus immodicum & gelu ab his tantum prohibemus, quæ humida cogi possunt, vt aquis destillatis.

Calorem internum imbecillum fouemus, prohibita eius exhalatione, ob id quæ seruamus omnia oculis clausis, & vasis obturatis reponimus, nisi valentissima sint, theriacæ enim vas sæpe detegi vult Galenus, vt expiret. Ad hæc rha barbari, vt viribus integris diutius seruetur, vel cera sola, vel cera cum terebinthina, aut melle albo circumlinunt Mesues, vel psyllio, aut milio mergit. Agaricum idem cum zingibere, dauco, ligustico, polypodio quærno seruat, vt eius actio vegetior reddatur.

Aloe seruatur cum aromatibus aut bdellio, & alia similiter in Mesue simplicibus.

Cassia verò in fistula sua feliciter seruatur, nec purganda ante vtendi tempus. Fistula autem in fabulo cellis vinarijs infossa, siccari præpropere prohibetur.

Colocynthis integra diutius seruatur quam emedullata, & melior ac salubrior euadit cum mastiche, galanga, & alijs stomachicis, hepaticis, cardiacis.

Phiale succo rosarum, granatorum, limonum, cydoniorum, & similibus seruando destinare habeant in fundo emissarium, ne inuertendo fuga olei superfusi succus turbetur, & fex cum tenui misceatur, & sic turbidum pro puro succum vsurpet.

Crusta quæ melli & medicamentis quibusdam tempore accrescit, integra & immota seruanda est, si vis pharmacum diu manere integrum & immutatum. Gal. lib. 2. alimentorum. Quæ providentia succis prædictis, vino quoque & cæteris est communis. Diabasa stanneo vase reponi vult Heras lib. 8. c. ph. p. Galeni.

Medicamentum stomachicum vase corneo reponitur, eodem libro.

Terebinthina vase ex ferro albo aut vitreo, aut siliceo seruatur melius quam ligneo, aut terreo, nisi sit vitratum.

Vase vitreo vel plumbeo hieram reponit Paulus.

Theriacen vase non ligneo, vt hodie fit, sed pretioso reponit Galenus.

Oleum vase siliceo, lapideo, plumbeo in cella vinaria probe diu seruatur.

Pulueres cardiaci vase vitreo stricti oris, operculato reponuntur.

Flores & omnia iucundum odorem reddentia arculis tihaccis.

Semina etiam chartarum inuolucris, & suis folliculis vtilius & innocentius interdum seruantur.

Liquida medicamenta seruentur densiore materia, vt argentea, vitrea, cornea. Fictili etiam modo non rara, interdum & lignea, præsertim buxea.

Ocularia medicamenta & alia quæ acetum, picem liquidam, cedriam recipiunt, æneo vase seruanda.

Adipem & medullas vasis stanneis, seu ex plumbo albo reconde, hæc Dios.

Herbæ igitur siccantur & fasciculis aut manipulis colligate.

Quæ componendo cocta, aut aliter calfacta sunt, non nisi refrigerata sunt reponenda.

Diacodium refrigeratum reponit Damocrates, apud Gal. lib. 7. c. ph. p. & similiter composita prope omnia Mesues.

Loco non vliginoso & madente reponantur medicamenta exceptis paucis, sed edium parte sicciore.

Quæ reponuntur si præterea serueri debent, vas non repleant, vt sit locus & spatium quo perspirent: sic vina dolijs non plenis reponuntur primo, sic cõseruæ in solatu coquendæ, vasis non plenis coquantur. sic theriacen vasis non plenis reponit Galenus, quo tempore adhuc à suo calore coquetur & seruet.

DE CONSERVATIONE.

NEC DE repositione sufficiant, in quibus tamen ob rei affinitatem cõseruationis quoque obiter coacti meminimus, sub qua & medicamentorum simplicium & compositorum durationis tempus cõprehendimus. Vt enim non minor est virtus quam quærere, parta tueri. Sic non satis est medicamenta probe delecta esse, sed ad cõseruationem commodè reposita esse, & quadiu integra cõseruari possunt, sciendum est. Nam si mors etiam saxi, numinibusque venit, omnia tam simplicia quæ composita aliquando corrumpuntur. hæc citius, illa tardius: idque vel ob peculiarem cuiusque naturam, vel aeris constitutionem, vel repositionis differentiam.

DE MEDICAM. SIMPL.

Herbæ quotannis sunt mutandæ, & flores, & quæ ex his destillantur aquæ, præsertim quæ vase duplici, aut vapore aquæ feruentis destillantur. Humidiores enim sunt quam quæ ignis flama, & carbone etiâ per cinerē, scorie ferri puluerem, sabulum destillantur.

Aqua tamen vini quæ frequēti destillatione est purgata, diutius seruatur vase vitreo cera obturato. Seruantur autem herbæ siccatę sacculis cânabinis rarē textis ne putreāt, neve puluerulentæ euadant.

Radices multę diutius seruari possunt, vt in delectu diximus lib. i. vbi & de reliquorum quoque duratione quantum sufficit scripsimus. seruatur siccatę per se aut cōditura ex saccharo, aut melle per se suspensę in aere libero si magnæ sint, in sacculis cannabinis si parę. fructus in melle conditi sic, vt se non tãgant, & loco frigido repositi annum seruantur recentibus simillimi.

Idem & flores vasi inclusi aqua fluente testi annum seruantur. Vinum musteum doli picato impositum, & eodem bene operculato sepultum dies 40. aqua fluente, vel aliter pura, annum totum dulce permanet Catoni. Idem cera inuoluti, farragini impositi, aut fursuri, diu seruantur recentibus similes.

Herbarum quoque folia citra siccationē sibi simillima diu seruantur inter papyri folia: sic tamen vt non premantur, præsertim quæ succulenta sunt. Nam hæc mox mucida & putria euadunt si præmantur.

Aloe etiam solario appensa tres quatuor annos viua, & germinās seruatur, & aizoon, & telephium ob succi crassę copiam.

Quin & cæpe, allij, scillæ, ari, dracontij, cotyledonis, satyrij, & aliorum quorundam radix bulbosa, succo crasso lento plena diu seruatur citra vlsā à nobis, aut alium de siccationem manifestam.

Metallica & lapides vbi libet probe seruantur, si sordes & puluerem vitabis.

Composita autem medicamenta nobis hodie varie seruantur, nam condita humida, eclegmata, syrupi electaria mollia vase vitreo, vel siliceo, vel terra densiore potius quam stanneo plumbi vitium retinente seruanda. Electaria autem sicca arculis faginīs, aut pyxidibus vitreis, vt pulueres & trochisci. Catapotia autē ferē aluta inuoluta, pyxide stannea includuntur. Olea, vnguenta, cerata liquida vitreis, lapideis, stanneis, emplastra verò in magdalias formata papyro vndique præterquam extremi medio integuntur.

DE CONDITURA.

DE CONDITURA nunc dicendum quodd ea sæpe cōditio quædam est (de qua & preparationibus alijs ipsam cōditionem sequētibz abundē diximus) & conditura conseruationi non parum confert. Conditura ferē est radicū, herbarū, cauliculorū, aut germinū, florū, fructuum, seminum, interdum & corticum. Fit item ferē saccharo, vel melle, vel vtroque, interdum syrupis, iulepis, sale, aqua salsa, aceto, & alijs quæ siccando, & humiditatem superfluum absumendo, astringendoque à putredine res vindicant. Condiuntur enim prædicta ferē ad conseruationem tutiorem, sæpe tantum ad saporis gratiam, sæpe ad vtrumque, vt succus mororum in diamoro melle conditur. Possisq; conditura generatim dicta etiam syrupos, & antidota plurima, & pilulas & trochiscos comprehendere, quod hæc humore aliquo iucundo comprehenduntur, vt sint iucundiora, & facilius sumi possint: sic rosæ violæ & flores alij melle, aut saccharo condiuntur, & fit mel rosatum, violatum, vt in cōditis Mesue diximus & lib. 3. dicemus.

Conditura fit humore hoc iucundo per totum corpus condiendum inperfo, vt dum flores & fructus condimus, & corticem citri, & cucurbitæ, lactucæ, caules, & alia plurima: sic Myrobalani recentes condiuntur, aut humectatæ prius si erant sicciiores, vt docuit in simplicibus & conditis Mesues, interdum tãquam crusta quadam saccharo integimus magis ad saporis gratiam quàm ad vires, vel augendas, vel conseruandas, vel minuendas: sic semen coriandri, papaueris albi, absinthij, marni, anisi, foeniculi, apij, & nucleos persicorum, strobilorum, pistaciorū, amygdalarum dulcium, & si libet amararum saccharo integimus, & cortices aranciorum, cinamomi.

Interdum condimus additis quibusdam medicamentis aromaticis, vt emblicas myrobalanos aromatibus condit Mesues scribit, & alia etiam composita: sed conditūc aromatizari potius significat, quàm ad saporis gratiam, id etiam fiat, vt in factura mox dicam.

Condienda sic magna sunt, ferè in particulas secantur, vt condituram promptius vbi-que sentiant. sic cydonia, sic Persica, & radices magnæ sectæ condiantur.

Tamē fistula cassiæ tenera cōditur integra, & nux moschata cum cortice viridi, qualis nostrarum nucum integra conditur, & parua citrea, arātia, melones parui adhuc teneri.

Quanto autē melle, saccharo, vel alia condiente materia sit opus, & quis modus cōdiendi, hoc est incrustādi, p̄sertim semina, & nucleos, leges libro tertio sectione prima.

Flores capparis nondum apertos interperso sale condimus. nam si soli reponantur. Lib. 2. putrescunt. Eodemmodo & in eisdem vsus flores genistæ, & his odoratiores sparti flo- alim. res, quibus tamen post acetum affundimus quantum omnia tegere possit.

DE FARTURA.

FARTURA condituræ quædā differentia est: fit autē ferè dum cauitas quædam manifesta odoramentis, vel alijs scopo proposito idoneis impletur, quomodo & coqui pullos, anseres, porcellos, & alia quædam herbis nostratibus aromaticis, & floribus, & lactuca, & appetitis alijs, interdum additis etiam aromaticis farciunt ventrem totum inferiorem, & sæpè etiam spatia inania inter carnem & cutem vi diducta.

Sic eligantur radices eryngij & sectæ loco matricis (cor vocant) caryophyllo, & cinamomo humectatis farciuntur à Mesue.

Anserem exenteratū carnibus felis annosi, & herbis nervosis farcimus, vt inde eliquatus adeps sit medicamentosior.

Fartitur pilcolus ex bombace, aut aliud epithema cephalicum, vel stomachicum aromaticis, & alijs cephalicis, stomachicisque.

Præterea vt coqui carnes auum torrendas, caryophyllis, & frustulis cinamomi configūt ad odoris & saporis gratiam: sic nuces virides maceratas, & coquēdo teneras redditas, & radices satyrj, ex secundo cicerum decocto ad iustam teneritudinē coctas caryophyllis, & cinamomi frustillis cōfigimus, & cydonia in particulas condienda. Quæ res ad farturam, vel vna cum fartura ad aromatizationem reduci potest.

DE PUTREFACTIONE.

PUTREFACTIO coctioni simillima est, præsertim de qua nunc agimus, nō enim de absoluta putrefactione, sed mutatione aliqua à calore externo, etiam rerum putrescentium, vt fimi corticū facta, vt oleum in folliculis vلمي inuentum, phalæ forti impositum cum folliculis si operculetur, & dies quindecim fimo equino multum ob putredinem vigentem calenti, obruat. Deinde insoletur, & quod eius clarum supernabit trāsualetur, omnium vlcerum remedium est præstantissimum.

Sic ex vino facimus acetum tenuius, & acre magis ac mordax. Facimus autē vel insolatu, vel immisso aceto valētissimo in vinū, vel folijs, surculis & ramētis sorbi, vel parte acida citri immissa. Galenus lib. 2. alimēt. Sunt qui linguas lampetræ nostratis ea cau fa immittunt.

Ex maza item fermentum, & ex lacte in primo animalium lacte nutritorum ventriculo corrupto fit coagulum, omnia ob putredinem acria, & caliditatem nouam adepta, amissa autem naturali.

Sic chalciteos partes duas lithargyri, vel cum Dioscoride cadmiæ partē vnam accerto acerrimo soluit Galenus, ac æstate media, seu diebus calidissimis quadraginta in olla nouā fimo obruit, vt fiat p̄loricum. Talis putrefactio in vsu est maximo chymistis.

Sic adeps vetustate putris Galeno expetitur ad emplastrum dia chalciteos, & oleum vetus ac ita semiputres, vnde & graucolentiam acquirit: sic vetustate putrefactū calcem decocto pernæ falsæ, coquit Galenus ad tophos.

Quid quod vinum & succi reliqui dum ab humiditate excrementosa feruent, quodammodo putrent, & flores saccharati, aut melliti dum insolantur, & antidota melle addito dum feruent?

Acopa item ex semine abietis, & floribus populi dum menses plures macerado per- Lib. 4. fa. ficit. Gal. etiam putrefacere videtur. tuendæ.

CTIONI non modo affines sunt frixio & assatio, sed frequenter etiam vt in alimentis coctionis differentiæ, tamen quæ medicamentis adhibetur coquere raro videntur humiditatem crudam, aut excrementosam: sed magis absumere.

C Frixio autē fere in sartagine fieri intelligitur, quæ à frigendo etiam frixorium dicitur. Hæc autem in sartagine parata suæ qualitatis vehementiā deponunt. Gal. libr. 2. alim. in dracontio, assatio autem seu torrefactio super tegulam ignitam fit: vel in clibano, vel in carbonibus ignitis, hæc quoniam tenui discrimine distat, & ambo à calore fiunt, simul tractanda duximus.

Semen melanthij frigitur Galeno contra catarrhos. semen agni frixum minus tētat caput eidem lib. 2. alimento.

Mef.

Ibidem.

Semen lini & nasturtij torrefiunt in eclegmate Phthysicorum, Mefuē.

Semen porri & nasturtij in e. nostro.

Cuminum pridie aceto maceratum siccatur, & frigitur in vase fictili bene cocto. Gal. in diospolitico lib. 4. san. tuendæ.

Coriandrum aceto infusum assatur passim, sic enim calorem eius in superficie vehementem extingui volunt, vt tātum refrigeret. Granatorij acini assantur in e. altero Mefuē, & semina vuæ, portulacæ, psyllij, plantaginis, althææ, anisi, marrubij, ad fluorem alui assantur. Gal.

Baccæ myrti, gallæ, in quinque aut sex partes contrahæ, oleo hora vna infuse assantur ad capillum fluentem sistendum. Sit autem oleum astringens aut succus alius, si magis astringendum.

Myrobalani omnes succis astringentibus varijs maceratæ, linteo siccate assantur, sed antequam nigrescant, & vrantur eximendæ, ne vires amittant. Si insigniter scilicet vrantur, vt cineriant. Nam hæ & rha barbarum, assa coctis, vsta assis magis astringit Mefuē.

Mef.

Balanus myrepfica assando deponit partem humiditatis excrementosæ, & partē coquit, ob id assata delectoria tantum est, non amplius vomitoria.

Auellanæ assantur in eclegmate pineo.

Gummi Arabicum, tragacantha, succinū, & gummi alia ad magnitudinē orobi contrahæ, cum opus est assantur donec albescant.

Amylum assatur in trochiscis terræ, sigillatæ, & trochiscis spodiatis secūdis, Mefuē.

Modus autem frigendi & assandi prædicta est huiusmodi. Sartaginem, vel aliud vas ferreum vbi admodū calet, ac si opus est cādet ab igni tollitur. In hanc semina, fructus, radices & alia immittuntur, continenter rudicula ferrea versantur, ne vrantur. Sartago si opus est his exemptis recalefit, & quantum opus est assantur.

Quæ autem sunt magna, crassa, humida, glutinosa, diutius assanda, contraria minus, vt semen anisi, cymini, nasturtij. Semen verò lini & psyllij, quia humiditatem lentam satis multam sortitum est, paulo diutius assari sustinet.

Possunt quædam etiam in clibano aut super eius testudinem, aut sub cineribus assari & ea vel nuda, vel olla noua conclusa, & si mediocria sunt integra: si magna, cōfracta, quædam etiam maza intacta clibano assantur.

Scilla per assationem multi fit vsus Dioscoridī, quia per eam vel elixationē eius vehementia obtrunditur Galeno. Quæ enim non assata sumitur, interaneis maxime noxia est Mefuē. Illa autem delecta, purgata farina, pinfita, aut (id sordidum videtur Galeno in Theriace) luto, & argilla circūdatur in digiti crassitiē, sub cinere calido, vel carbonibus, vel clibano assatur. Sunt qui in olla operculata in furnum demissa assant: sic enim celerius & clemētius purgat. Sic elleborus albus, & scammonium in maza pista, vel cydonio preparatur Diosc. & Galeno, vt ipsa & panis, & cydoniū moderatius purgent. In vas calefactum quoq; & ab igni depositum opium mox immittit, vbi est liquatum, eximunt priusquam siccetur, & friabile fiat.

Acaciam nostratē facitiā super prunas ignitas assat Bulcasis in seruitore. Est quādo vt alimenta sic medicamenta ex humore friguntur: nam castanæ sine humore, fabæ, pisa, carnes, fungi, cū humore, vt oleo, butyro. Sic myrobalani, flauæ, cepulæ nigre friguntur & fricantur in oleo violato, aut amygdalarū dulciū in tryphera Persica & in simplicibus. Omnia probe trita friguntur in omphacio, vel succo myrti, & aceto, & siccantur in stomachico electario quodam Mefuē. Omnia in vino odoro frignantur, deinde in suc-

co cydoniorum in E. nostro Mes. Addit in sequenti, & feruefiant, vt intelligere possis, hæc frīgenda super ignem semper mouendo, & confricando: non solum fricanda, cum his humoribus, vt diximus prius in confricatione.

DE VSTIONE.

V

STIO assationi finitima, vt ratione maioris, & minoris tantum differant, assata enim largius vruntur, & infra modum vsta, tantum assantur. Vruntur planarum partes ac animalium, & animalia tota, metallica item & terrea. Horum autem medicamentorum vrēdorum scopi medicis sunt varij. Quædam enim vruntur vt puluerari facilius possint, vt pili, lana succida, sericum, testē ostreorum, buccinorum, purpurarum, vngues asini, cornua caprarum & ceruorum, ossa, coria, & alia quæ ob terrosam & duram & crassam corporis consistētiam & concretionem densatam vel ob lentorem immodicum vel humiditatem aliquam puluerari nequeunt.

Alia vt essentiaē crassitiem deponant & tenuitatem, aliasque facultates igneum calorem sequentes induant. Id quod quauis omnibus vstis accidat, non ob id tamen omnia vruntur. Sic metallica omnia & terrea vrendo tenuiora euadunt, & quæ acria erant, mitiora fiūt, quæ non acria erant, acrimoniam vrendo assument. Gal. lib. 4. & 9. simpl. in chalciti.

Ex quo patet vstione etiā facultates quasdam mitescere, vt ærugo, chalcitis, msi, fori, chalcantum, melantheria fiunt moderatiora: quasdam acquiri, vt vim tenuandi & ea efficiendi, quæ saporem acrem sequuntur.

Alia vruntur, vt vis quædam nostro proposito aliena, ex profundo in superficiem trahatur, postea lotione separaretur: sic lapidem phrygium vstum lauat Galenus, & lapidem hæmatitem ad oculorum affectus.

Alia vruntur vt colorem nouum acquirant ægro gratiorem, vel ad dissimulanda simplicia, quibus constat medicamentum, sic ærugo vsta modice quidem: rufa facit emplastra immodice vero, nigra.

Cerusa trita, rudicula ferrea mota vrendo fit rubra, vt ochra, & auripigmentum. Ossa & testē vrendo primum nigricant, deinde albiſſima euadunt.

Quædam vruntur vt in aliam tranſeant speciem, vt vipera vsta tranſit in salem theriacum, cerusa vsta vt rubeat in sandyca, thus in fuliginē, sulfur in oleum, cadmia lapis in cadmiā fornacariā, & pompholygem & spodium.

Vrendi modus non est omnibus vnus. Quædam enim humore pingui prædita per se vruntur, vt pili, lana succida, sericum, cornua, vngues, coria, irūdines, motacilla, galerita, & aliæ quædam auiculæ, cicadæ, scorpiones, vipere, lepores, & alia quædam pedestria. Hæc vero in olla noua operculo foraminulento testā sunt vrenda carbonibus vel clibano, præsertim quæ prope cinefacta disperire possunt. Quæ vero post vstionem integra manent, vt ossa, vngues, cornua, testē ostreorum, lapides ad gypsum vel calcem coquendam & similia: hæc etiam viuīs carbonibus obruta vel superposita, aut etiā flammæ luculentæ immissa, vri possunt: nisi quædam sint addēda, quæ vim eorum mutēt. Tunc enim etiam in olla noua vruntur. Sic viperas cum substratis quibusdam medicamētis Galenus vreat ad salem theriacū: sic fistili nouo inclusa vel patellæ ferreæ, aut sartagini imposita vruntur, cerusa, chalcitis, msi, fori, chalcantum, auripigmentum, sandaracha, plumbum.

Alia fistili crudo vruntur, donec id pereoctum sit, vt cadmia, æs.

Alia etiam olla ænea aut ferrea, vt plumbum.

Alia in patina vruntur, vt ærugo, chryſocollo, lithargyros.

Alia in olla ex cineribus ossium (crucibulum vocant) in fornace ausifabrōrum, alia in foco, alia in clibano panis, alia in furno figulorum, alia in fornace chymistarum.

Quædam (vt dixi) tam carbonibus obruta quàm olla vel noua vel cruda, vel patina excepta per se vruntur nulla addita inflammabili, aut vires mutante materia, vt ossa, cornua, testē ostreorum.

Alia materiam requirunt inflammabilem, vt sulfur, alumen aliquod, salem, hordeum, vt in plumbo vsto & alijs docuit Diosc. Vas item quo excepta vruntur si fragile est, vt vitreū, ex terra bellouaca & alia lapidea & silicea luto chymistarum prius totum paulatim oblinimus, & paulatim siccamus, quàm igni cōmittamus. Eodem luto vasi operculum sæpe agglutinamus, ne inter ipsā hiatus viam faciat carbonibus, aut cineribus illapsuris, aut effluxuræ materiæ.

Lutum autem id fit ex terra figulina aqua macerata cum stercore equino, & si vis pilis

animalium multum diuque subacta, quod & lutum sapientiæ vocant chymistæ. Eius loco interdum est terra figulina sola, vel gypsum aqua solutum, vel farina albuminibus subacta.

Vas quoque chymistæ operculant labris ipsius colli per fusionem coalescentibus, ad materiam sunt preciosa, & quas exhalare nolunt. Id autem in matulis tantum vitreis longo collo efficiunt, sigillumque hermetis vocant.

In alijs fictile apertum esse nihil nocet, si clibano vrenda sunt: si verò cineribus aut carbonibus obruenda, operculum vas, ne aliena materia quod vrendum est, ut dixi, cōspurcetur, vel ne materia ipsa exiliat, & quas exhalare nolunt. Id autem in matulis tantum vitreis longo collo efficiunt, sigillumque hermetis vocant.

Operculum autem nunc solidum est, & integrum, nunc multis locis foratum, ut fuliginosi effluxus exhalat liberius, à quibus est cauendum, præsertim si à vipera, scorpionibus, aut similiter venenosis attolluntur, item si à metallicis.

Vrantur materiæ carbonibus perustis, præsertim preciosæ, & quæ oculis sunt adhibendæ, ut nihil fumidum habeant, ut Galenus vrebat lapidem phrygium.

Carbones quoque foliibus vel stibellis excitari interdum oportet, ut citius vstio absolueretur, ut Galenus in vstione lapidis phrygii iubet, lib. 4. c. ph. p.

Quædam ad idoneam magis vstionem puluerantur, alia franguntur tantum in frustula magnitudinis nucis iuglandis, ut lithargyros, vel nucis auellane, ut lateres in oleo philosophorum, & lapis phrygius, à Galeno in suo remedio oculari.

Alia etiam in sole æstiuo ex vino vel aceto pluribus diebus teruntur, priusquam vrantur, in c. ph. g.

Plantarū
partes.

Quæ omnia his exemplis ex Dioscoride, Galeno, Mesue, & alijs sient notiora, folia oliuæ syluestris in olla fictili cruda, lutata furno figulino, per coctionem vasis vsta, lota, ex aqua in sole siccata, albuginem oculi & panos potentius omni pompholyge delent Albucafi.

Sarmenta ligna, cortices & partes alię plantarum vrantur relicto tamen foramine in operculo, ut fumus exhalat.

Abrotani, asphodeli, ari, arisari, dracontij vsti, cinis Galeno passim vsurpatur.

Brassica non transplantata, à terra expurgata, minutim concisa, in ollam coniecta, foraminulento operculo testæ clibano vritur in carbones, qui triti ollæ alteri impositi, operculati, vrantur donec in album cinerem abeant.

Myrobalani & rhabarbarum vsta valentius astringunt quàm assata Mesue.

Aloe quibusdam in olla noua super prunas vritur in diamoscho amaro, ut assumpta glutinosa substantia aluum ducere desinat, & magis roboret, ob quam causam etiam abluitur.

Fex vini siccata vritur igni, donec albescat, & linguam multum mordeat & vrat.

Succinum fictili olla clausum, operculatum nocte igni vritur Bulcafi.

Thus vstum scribitur in Hsede cephalica, lib. 4. c. ph. g.

Visto thure fuligo qua ratione colligenda docet Diosc.

Aialia &
iporum
partes.

Lepus viuus iugulatus cum sanguine & pelle vasi fictili nouo traditur, operculatur, in clibano vritur donec puluerari possit ad calculum frangendum.

Sic hirundines, ranæ, cicadæ, erinaceus, vrantur Gal. lib. 11. simpl.

Aesculion caneros viuos in patella æris rubri vsit donec in puluerem mollissimū redigi possent contra rabiem.

Gal. lib.
11. simpl.

Teste ostreorum, limacum, ouorum exclusis pullis, sericum, ossa, cornua, ungulæ, vel prunis ipsis vel regulæ aut ollæ imposita in clibano vel foco vrantur, donec albescant, & puluerabilia sint. Hæc tamen non vrenda, nisi medicus iusserit, quia vires vstione mutant. Possunt enim tenuissime limari, aut radi, ut cornu rhinocerotis, pudendum tauri, cerui, & puluerari, vel probe linata propinari, sericū similiter cardiacis miscendum sit crudum, minutim concisum, cum alijs pulueratum, vstum autem medicamentis materias consumpturis miscetur, ut diasenne Nicolai. Spongia bitumine vel eius penuria pice illita vritur lib. 11. simpl.

Gal. lib. 6
c. ph. p.

Lana succida largo vasi figulino lati oris imponitur, operculatur. gypso, vel glutina, vel terra figulari subacta cum aqua illinitur, vritur fornace, vel camino.

Scorpiones viuus olla noua inclusi, & operculati maza vel luto circūlita vrantur igni ex sarmentis virum in clibano, ut eius pulueris grana sex cum syrupo radicū quinque potum calculum frangant.

Sic vrantur vipera & colubri, amborumque cinis ex oleo illitus serofulas liquefacit.

Metallica
& terrea.

Lithargyros chrystitis, grauis, pura à plumbo, & omni aliena materia in parriculas magnitudinis iuglandis confracta, prunæ superponitur, & ita foliis accenditur, ut conflagret, ubi refrigit, abstergitur insidens spurcicia, & reconditur. Alij ter aceto aut vino restinguentes rursus vrant, & reponunt.

Cadmia vritur carbonibus obruta, donec translucida spectetur, & ferrea scoria modo Diof. bullet, mox vino extinguatur aminæo, si ad emplastra paratur: aceto autem, si ad pſoricum medicamentum. Sunt qui sic vſtum ex vinoque tritum, iterum crudo ſicili torrent, donec pumicoſa videatur: iterumque ex vino tritam vrit tertio, donec prorſus in cinerem redigatur, nihil ſcabritici retinens.

Plumbi lamina quàm tenuiſſime, aut plumbi limatura & ſulſur alternis vaſi imponitur, Ibidem. donec plenum ſit, operculatur, ſed relicto exili ſpiraculo ſuccenditur, dum plumbum ardet rude ferrea verſabis donec totum perfecte in pulverem redigatur. dū eximes, obſtrue nares quoddam halitus ſit noxiuſ.

Subium pinſita farina circumlitum, & carbonibus obrutum torretur, donec ipſa cruſta Ibidem. carbunculetur, exemptumque extinguitur lacte mulieris, quæ marem peperit, aut veteri vino, vel vritur carbonibus ſuccēſis, effilatum quoad ardeat. Si enim paulo magis cremetur, ſit plumbum.

Ceruſa trita in ſicili nouo, ſagratibus carbonibus, aſſidue verſando vritur, donec cinereum colorem traxerit, vel patinis nouis ſuper prunas trita vritur, & ferulacea rude mouetur, donec coloris ſit ſandarachæ: ſandyxque tunc appellatur, refrigerata reponitur. ſic trita chryſocolla vritur. Sunt qui vrendo acetum aſſundunt, vt rubeat: ſi ſlaua eſt, macicot vulgo dicitur.

Aes ſit vſtum ex clauis æreis ſolutarum nauium ſicili crudo compoſitis ſuperſparſo ſulſure cum ſale pari. Quibus viciſſim inſperſis ſicile ſemiplenum operculatur, & ſigulari creta circumlinitur, fornaci inditur donec ſicile percoquatur. Modos vrēdi alios docet Diof. Ibidem.

Aerugo fracta miniuſſime in ſicili parina ſagratibus prunis ſuperpoſita verſatur, donec mutata colorem cinereum concipiat, refrigerata reponitur. Si cruda olla vratur, eundem prorſus colorem non reddit.

Chalcitis ſicili nouo viuus carbonibus ſuperpoſito vritur, donec bullas excitare deſierit, & perfecte inaruerit, ſi humidior eſt: ſin alia eſt, dum mutata in floridum colorem ſanguineum aut miniatum contrahit. Eximendo inſidens ſpurcicia tergeatur. Vel vritur perſlatis carbonibus, donec luteo colore paleſcat. Sic miſi, ſori, chalcantum vruntur. chalcantum autem vrendo ſuapte natura colorem rubeſcentem ſortitur Diof. in æruginē.

Auripigmentū vritur teſta noua viuus carbonibus ſubiectis aſſidue verſando, donec igni ſagret, & mutet colorem. ſit enim ſoris argenteum, intus rubrum: refrigeratum & tritum reconditur. Sic vritur ſandaraca, alumen.

Lapidem phrygium in particulas magnitudinis ouellanae fractum vres in olla recenti luto circūlita, teſta operculo perforato vel in ſolo vertice, vel (quod melius eſt) in plurib⁹ par- Gal. lib. 4
c. ph. p.
tibus, vt fuliginofi fumoſique eorum quæ vruntur effluſus facile per ea efferantur, deinde peruſtis carbonibus perſlatis vre, donec ignitus ſit, cætera ex Galeno repetē. Sic cyanus lapis vritur, & alij.

Sal vritur ſicili, diligenter opertus ne exiliat, condituſque prunis, donec efferueſcat vritur. Sic nitrum & ſpuma niri, ſi inueniuntur vrēda ſunt. Vitrum tritū interſtrata piece vritur, & aqua frigidiſſima extinguitur, Auenſoal tamen friabile non ſit. Alia plura ex Dioſcoride, & alijs huc tranſcribi potuiſſent, niſi hæc etiā multa huic ætati omnia hæc negligenter exiſtimaviſſem.

Vſtione terminus in quibuſdam eſt, dum ignitum id abunde fuerit, vt in vſtione triplici lapidis phrygij: in quibuſdam dum nihil fumidum ampli⁹ expirat, nullaque fuligo præterea emergit.

In alijs dum bullas edere deſinet. In hijs quæ ſicili crudo vruntur, ſicilis illius percoctio.

In hijs quæ farina pinſita circumlinuntur aut luto, cruſtæ vſtjo.

DE EXTINCTIONE.

EXTINGVNTVR vel vſta vel ſolum ignita quædam non modo, vt empyreu-
ma ipſum diſſipetur, ſed etiā, vt in corpus vſtione rarefactum vis quædam
humoris aut frigoris penetret, vt ferrum candens aqua pilofellæ, vel alia aſtrin-
genti extinctum euadit ſolidiſſimum.

Extinctio ſit interdum ad purgationem, vt plumbum liquatum ſucco mercurialis calido: ſæpe extinctum, & tribulatum ſtanni puritatem, & ſoliditatem aſſequitur.

Fit item extinctio, vt vires humoris quo extinguitur in ſe trahat. ſic cadmiam vino ami-

DE MISTA MEDICAM. SIMPL.

næo ad emplastra aceto ad remedia pſorica extinguit Dioſc. ſic Galenus lapidem phrygiũ extinguit primum butyro recenti, ſecundo vino ſalerno, vel alio ſuluo, odoro, tertio melle Attico, ne medicamẽtum ſit aridum, ſed viſcoſi cuiuſdã particeps. Gallæ ad ſanguinis ſup-
lib. 7. ſim. preſionem carbonibus impoſite, donec vndique candeat aceto: aut vino aſtiero extinguen-
de ſunt.

Stibium lacte mulieris marem enixæ extinguitur.

Limatura chalybis ſæpe ignita aceto extinguitur, & pulueratur.

His exemplis medicamenta humore extincta ab illo aliquid virium in ſe trahunt. Inter-
dum autem ignita humore extinguiſimus, vt humoris naturã mutemus, vt dũ lapides vel cir-
culi ferrei igniti lacte aliquoties extinguntur, vt ſeroſam & mordacem eius ſubſtantiam
abſumant, ſitque tunc lac dyſenterij ſalubre.

Aqua chalybem vel aurũ ignitum ſæpe extinguiſimus, vt ipſa minus humectet, ſed ſit ter-
rea magis ablumpta tenuiori ſubſtantia.

Argentum viuum etiam ſi non ſit ignitũ, tamen & ſaluã hominis ieiuni, & ſucco ſaluig
aut limonum extingui dicitur, quod vis eius malefica, & omnia exedens, vt à Plinio recte di-
citur, cum his agitando miſceſcit.

DE SYFFIT V.

SYFFITVS ſeu euaporatio vi caloris exſicata ſæpe medicamẽtis adhibetur præ-
parandis & vtendis. Suffitus aromatum muliebrã ducit, & vterum infernẽ re-
trahit ſi infernẽ adhibetur, vel ſuſum ſi narib⁹, ſuffitus plumarum perdicis, co-
rij veteris, vel aliorum tetro odore præditorum, naribus exceptus vterum ſu-
ſum ruentem deturbat. Suffitus radicis & ſeminis pœonie, melanthij, ſtyracis,
maſtiche, roſarum, ad capitis affectus pituitoſos. liſdem vel alijs ſtuppe ſuffitæ capiti circũ-
ponuntur.

Frontalia ex roſis, violis, flore nymphææ ſeminæ lactuce portulacæ, & ſimilibus, vapore
aquæ roſarum verbenæ, bethonicæ, & ſimilium ſuffiuntur ad varios capitis affectus.

Et epithemata ventriculi ex bombace aromatibus ſarto, vapore ſtomachico præterea ſuf-
fiuntur.

Suffitus per infundibulum ex radice, aut folijs bechij ſuper tegulam ignitam impoſitis, ad
tuſim adhibetur.

Suffitus ex ſulfure purgato & auri pigmento viſto & loto, probe à præticis quibuſdam
aſthmaticis adhibetur.

Suffitu & vapore aceti acerrimi necantur cantharides Dioſc.

DE PURGATIONE.

VSTIONI ordine optimo ſuccedit lauatio, quæ empyreuma, & acrimoniã
vſtione acquiſitã, vt & natuã tollat & vſta expurget, ſed cũ illa ſit purgationis
ſpecies, ſatius mihi viſum eſt de purgatione prius agere, quod eius cognitio lu-
cem magnam ſi alſatura lotioni. Purgatio medicamentorum hic accipiendã
paſſiue, non actiue ſeu quatenus purgantur non quatenus humores ſibi fami-
liares ex corpore noſtro trahunt.

Purgantur enim medicamenta ſordibus, & aliena quauis materia per deſpumationem, cla-
rificationem, colationem, reſidentiam, coctionem, lauationem, exciſionem, depellationẽ, &
modos alios poſt ſcribendos.

Radices erutæ radiculis circũciſis, aliquoties abluntur potius quàm abraduntur, dein-
de ſi magnæ ſint & matrice intus lignoſa, parum conſractis lignum id eximes, deinde ſicca-
bis, & repones, ſic radice cichorij, apij, petroſelini, fœniculi purgamus, & eryngij, ſefari, ca-
ri, danci, paſtinacæ.

Eſt quando putre etiam aliquid excidendum eſt à radice iridis, enulæ, bryoniæ, ſigilli bea-
tæ mariæ, rha barbari.

Radicem ari, dracuntij, aſphodeli, ſatis eſt exciſis radiculis lauaffe, cum cortice conſtente
tenuiſſimo, vt & radix chelidonij parui, cotyledonis, ſatyrij.

Scylla cultello ex cypreſſo quibuſdam deſquamatur, in qua mirum eſt ferrum vitari, cum
piſtillo ferreo teratur ad ſuccum extrahendum.

Herbæ raro purgandæ nisi aridis folijs, aut stipite lignoso, quanquam & ablui debeant, si terreno aut luto sordidæ sint, vt iussit Dioscorides.

Seminibus sæpe duplex, interdum triplex debetur purgatio. Vt legumina siliquis, cerealia glumis, bacce halicacaborum veficis, semina fructuum carne, semen ricini, vrticæ maris, castanea echino, semen papaueris hyoscyami, lathyridis, paliuri calice, & alia ad portionem. Quæ omnia iterum cortice tenui & interiore sæpè purgantur, vt post audies. Nux iuglans, & auellana & amygdala carne viridi, deinde cortice duro, postremo pellicula & alia plurima similiter. Hic autem de tertia purgatione agendum, quod aliæ à vulgo fiant, & purgata hæc vendere consueverint, & zeam, oryzam per moletrinas gluma purgant, & vendunt.

Cortice ergo seu pelle purgantur semina cnici, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citruli, citri, vt sole super sint medullæ, idque multis modis. Quidam enim hæc insolant deinde cortices in mortario leuiter frangunt, manibus fricant, donec à medulla cortex separetur. Cribro tunc idoneo medullas transmittente, & cortices retinente cernunt. Alij etiã solis loco, igni leuiter frigunt, sed medullæ sic extractæ graueolent, & sunt ingræ sumentis, vt calfactu oleum. Forficulis alij singula semina purgant quod operosum est, vt vnguibus & dentibus quod impurius est, qui modus hodie est cõsuetior. Sũt qui hæc sole siccata in magna quantitate friant pistillo ligneo, cribro raro cernunt, iterum terunt & cernunt: si corticum particule simul transeunt, vñ eo euolant. Semen sesami puru aqua modice falsa irrigatur, manibus cõfricatur, iteru irrigatur, donec madefiat: extensum linteolo siccat, modice assatur, sacco aspero immittitur, fricatur multum donec depelletur. cortices vto aut halitu expurgantur, vel in aquam frigidã iniectis cortices supernatantes deraduntur. Sic semina cucumeris, cucurbitæ, melonis, citreoli, ad olea ex his faciẽda excoctantur. Mesue nō autẽ ad vsus alios.

Amygdalæ, pistacia, strobili, nuces & similia aqua frigida per noctem, vel tepida parum diu macerata corticem mox remittunt. Item si in sartagine assentur igni, donec depellantur, sed hoc modo male olent, & oleagina magis euadunt. Sũt qui recẽtes hos nucleos palea frumẽti obruunt, sicque cadit cortex. alij cultello malunt depellare, præsertim cum oleu amygdalinum recens exprimendum est in potum colicorum, aut nephriticorum. Alij etiam non de pellatas terunt & exprimunt oleum purum & iucundum.

Hordeum, triticum & cerealia alia, & legumina depellari possunt, affusa identidem aqua calida, pistillo ligneo baruntur, siccantur, parum nisi æstas est ventilantur, persicantur, reponuntur.

Est tamen quando corticis vsus est maior, vt in pisib. & fabis, & alijs. Est quando solus expetitur, vt in rhœ, radice apij, sceniculi, ellebori, turbith, cinamomi & alijs corticib. dictis lib. 1. methodi medicamẽta componẽdi. Ricini semen echino insolato vel frixo per se aut Mesues. cõfricatu facile exilit, depellatur autẽ quomodo dictum est terendo, sed mitius ne ob multã humiditatẽ cohæreant. sic bacce lauri. Vel ex non excoctis, sed pertritiss oleu extrahatur.

Colocyntidis cortice & semine purgatur, solaque pulpa in vsu est medicorum.

Cydonia & fructus alij condiendi intus & foris purgantur.

Cassia corticibus & membranis ligneis exempta seminibus purgatur per cribrum setaceum rudicula vel cochleari, vel manu: sunt qui id efficiunt felicius cum vapore ex decocto aliquo medicato subeunte, interdum humore aliquo soluitur, vt in diamãna Mesue. Sic tamar indos purgamus sed hi fere humorem postulant, vt per cribrum transmitti possint, vt mãna humore calente soluta in cribro folia ilicis cui felicius infidet, & sordes alias dimittit.

Dactyli cultello intus & foris purgantur, vt abunde diximus lib. 3. methodi medicamẽta componẽdi.

Succi purgantur feruore, residendo, clarificando, colado, vt in syrups dicemus, & in clarificatione & colatione diximus.

Gummi Arabicum, tragacanthum & similia trita negligẽter si sunt siccæ, in vase vitro aqua pura vel rosata mergẽ nocte vna, misce manu posttridie donec liquefcat, cribro puro cola, etiam manibus deducendo: vt re, vel siccatum reponẽ.

Galbanum etiam laudatissimum retinet aliquid adiecti seminis, & ferulæ id ante vsu sic purgabis: In aquam feruentem demitte: cum liquatum fuerit, linteo puro, raro cola, aut sordes supernatantes concha detrahe.

Sic liquores alij humore idoneo soluti colando purgantur à seminibus stipitu fragmen-
tis & cæteris excrementis, quæ per negligentiam aut institutorum malitiam ipsis accreuerunt.

Adipes, cerebella, sanguis & aliæ animaliu partes medicamentose, qua ratione purgandæ sint, paulo post audies inter ea quæ pluribus preparationu differentijs simul à nobis parantur.

LAVATIO purgationis, vt dixi, species fere fit ad sordium aliquarum separatō-
nē, abufue tamen etiam imbuere medicato humore medicamenta aliqua lauare
Mefue, & alij vocāt. Lotionis vires ex Mefue repetere. Lauantur aqua foris radices,
herbē, fructus, femina, fi luto, puluere, vel re alia sunt contaminata, aqua ea toties mutata do-
nec pura maneat, & sordes omnis ab his deterfa erit etiam fi sunt roſe, viole, intyba & aliud
cichorii genus, & adianta, poſtea autem ſiccantur pannis, vento, ſole, igni, ſed miſiſſimone
medicamenti vim diſſipet. Hęc autem lotionis differentia omnibus conſuetiſſima, quia par-
uarum eſt virium ſi alteri mox dicendę conſeras, pluribus ob id declaranda non eſt. Loto a-
lia intus, & ſimul foris fit ſeu per totam rei lauandę ſubſtantiam.

Lauantur tota ſeu intus & foris plurima propter cauſas quatuor à Mefue lib. 1. ſcriptas,
& alias quaſdā hic ſcribendas, & paucis perſtriſtas lib. 3. methodi medicamenta cōponendī .

Vt autem humor omnem lauandi corporis partem quantumuis exigua attingat, & la-
uet ac purget aliqua ſubſtantia noſtro propoſito aliena, ſi id eſt durum aut lapidolum, ante
lotionem eſt tenuiſſime puluerandum: ſi eſt cito liquabile, calfaciendum: ſi per ſe eſt liqui-
dum, quale eſt lauabiturę etiam ſi per ſe in aqua, aut humore alio prompte diſſiliat ac diſ-
ſoluatur, vt bolus armenia, calx.

Quę igitur prompte liquantur, vt oleum, cera, pix, reſina, modice caleſcant, & mox in-
fundantur in vas magnum, oris lati, ſemplenum aqua puriſſima, experte omnis odoris, co-
loris, ſaporis, quē ſenſus percipere poſſit, quę ex ſole vel igne tepeat. Tunc manibus multū
diuque agitentur, ab agitando deinde quieſcant, donec id pingue totū quod lauas ſuperna-
tet. Id quod talibus promptum eſt ob innatam leuitatem, præterquam oleo nimium multa
agitacione valentius coſtū cum aqua, vt mox dicam. Tandem aqua illa abiecta, ſimilis af-
fundatur idque tertio & quarto, ac toties repetatur donec medicamentum in aqua illa depo-
ſuerit omnem illam vel ſubſtantiā, vel qualitatem noſtro propoſito alienam, ſeu quoad aqua
nullam ex loto medicamento talem ſubſtantiam, vel qualitatem, vt colorem, odorem, ſapo-
rem, amplius recipiat, quā viſu, olfactu, guſtatu deprehendas.

Effunditur autem aqua per foramen aliquod ſubiectū, quod interim dū lauas luto obtu-
raueris, aut vaſe inclinato pingue in vas aliud effunditur, & aqua abiicitur. Alij aquā pingui
miſcent in vaſe vtinque habēte foramen anguſtū, operculandum digitis inter agitandū, dū
vero per hōram reſederit, aqua effunditur, noua infunditur, idque fit toties donec acri, & ſa-
ua olei humidate deterfa, oleum dulcius, & album euadat.

Oleum ramen lauando minus eſt verberandum, ne adeo aquę miſceatur, vt poſt ægre
poſſit ſeparari: ſed ita verbera, vt dum quieſcere pauliſper permiferis, ipſum totum innatās
detrahere poſſis. Lotum id oleum componendis oleis, & medicamentis alijs albis, aut frigi-
dis eſt optimū & vſurpandum.

Dura autem & lapidoſa, vt metallica, lapides, oſſa, teſtæ, ſucci ſiccati, lachrymę ſiccataę,
antē læuiſſime ſunt terenda, deinde aqua pura ſubinde mutanda, manibus vel rudicula a-
gitentur, quoad nihil ſordium medicamenti aquę innatet, maneatque aqua medicamenti
qualitatum, vt coloris, odoris, ſaporis omnino expers. Non ante vero aqua eſt effundenda,
quam lauandum corpus quieſcendo in fundum vaſis ſubſederit, quod metallicis, & terreis
corporibus ob inſitam grauitatem facile accidit, vt prædictis innatare, ob naturalem ipſorū
leuitatem. Effunditur autem aqua per os vaſis paulatim inclinati, ne motus vehemens cor-
pus lotum aquę iterum commiſceat, & cum ea effundatur, ſatius enim eſt aquę prioris ali-
quid remanere quam lauandum corpus effundi. In his autem vas in fundo pertuſum in li-
quabilibus prædictis vtile, dānatur quod ad id grauia hęc repant. quę ſi per foramen id va-
cuare tentes, aut ipſum obſtruent, aut aqua penetrare habilior cum ipſis vacuabitur. Poſſis
& per licia, pannea, philtra vocant, deſtillando aquam paulatim vacuare, præſertim dū cor-
pus lauandum eſt precioſius. Nam ſic nihil, aut minimū eius, cum aqua vacuatur, ſed illa va-
cuatur purior, & corporis lauandi ſubſtantię expers magis.

Sic lauantur plumbum, ceruſa, lichargyros, ſcoria plūbi, æs, ærugo, chalcitis, & congene-
ria, cadmia, ſpodium, pompholyx, ſtibium, cyanus, calx, & metallica cætera, ac lapidoſa, oſſa,
os ſepæ, cornu cerui, caprę, vngula caprę, teſtæ oſtrea, & ſimilia.

Cum vero dura illa teri antē molliſſime debeant, quā lauauerit, teri autem non poſſint
citra vſionem ante, vt prius eſt dictum, ſunt vrenda, quanquam horum multa citra vſionē
teri poſſunt, vt cadmia præſertim lapidoſa, chalcis, chalcantum, ceruſa, pompholyx.

Addē quòd liquabilia promptē, & dura, & horum mediā, si humore medicamentofo lauantur, etiā per noctē, in illo refideant, vt plus virium eius in se trahant. Interdiu etiā lauanda sunt ac potissimum in sole feruidissimo: præsertim si quæ sicciora, tenuiora, albiore volumus. Lauantur enim non aqua fontana, & pura solum, sed marina, sulfurosa, bituminosa, vino, aceto, lacte, mucagine, succis plantarum, decoctis aromatum, vel aliorum medicamentorum etiā purgantium: vt ex Mesue simplicibus patet: omni denique humore, sed quē doctior medicus iusserit, ne sibi hanc deligendi humoris potestatem pharmacopœus arroget. Est enim quando calida humore aliquo calidiore vult intendere, vel remittere frigidiore: est quando vires alias mutare instituit.

Quæ verò est in colore solo medicamēti mutatio, esse possit in pharmacopœi arbitrio, modò vires nihil mutet. Vt si medicus imperauit, hoc vino aliquo austero abluendum, pharmacopœus autē velit albius, & elegātius reddere medicamentū, lauare id potest vino aliquo albissimo, modò id sit, vt iubet medicus, austerrum. Odorem similiter deligere illi nō permitto, quòd ea cui odor ineffectus substantia, maiorum est virium: ad hęc quòd odor additus vel huic hominum proprietati, vel cerebri, cordis, vteri affectibus curandis non conuenit. Multo minus saporem medicamento hunc vel illum, vel qualitates alias insignes per humorem à se delectum ad lauandum, dederit pharmacopœus.

Metallica itaque curiosè læuigata, lauantur ex aceto, vel marina, si vlcera sunt tumida, cū Gal. in fin. oris crassis & callosis attenuationem multam requirentibus: aqua autem, si humores in vlne lib. p. c. cus affluentes sint acres & mordaces: vino, si humor vlceri largior affluit. Ex his humoribus ph. g. per plures dies tribulentur metallica, donec erunt pura, candida, perspicua.

Quæ ex metallis ad punctos, neruos, aut aliter vulneratos, partibus neruosis adhibentur, omnia esse elota oportet, si modo citra morsum sint siccatura. Cera quoc, & terebinthina, si his medicamentis miscenda est, sit elota, & multo magis reliquæ resinæ, si immittendæ sunt. Nam medicamentis omnibus quæ laueris, acris & mordens sanies eluitur & abstergitur.

Hæc in vniuersum de durorum, & mollium, & mediorum lotionē sufficiant: nunc particulatim de quibusdam agendum, primum plantarum partibus reliquis, deinde metallicis.

Aloe optima, trita, creta, ex aqua fontana purissima dupla aut circiter, agitur aliquādiu rudicula ferrea aut lignea in vase lato stanno, vel terreo, vel alio, testa sinatur horæ quarta parte, aut paulo diutius sublidet: tunc quod clarius inclinatio, in claud vase in aliud simile, sed minus per colum setaceum transfusetur: aut si puriorem, sed parciorē vis aloen lotam, licio aut filtro excoletur, aut diutius residere permittatur in vase præsertim vitreo, interuallis paruis foramina habente, spina, aut cera obturata, per quæ quantum videris clarum sine effluat, ne scilicet inclinatio vase turbari queat: aquam nouam affunde, subige, sine, elutria: id fac quater, quinquies, donec arenosa, & terrea tantum saxe superfit. Primam omnium præstantissimam per se in solatu sicca, alias omnes simul. Si autem hyems est, aut lota aloē in rem præsentem egetur, igni lento siccari potest.

Dum autem siccata iam aloē est ex vase ipso eximenda, calefiat vas parum, vt promptius ab eo aloē separetur, & imam eius partem, in quam quod crassius est subsedit, cultello derade, vt in panibus cereis fieri solet.

Quod si nondum pura & perlucens satis appareat, iterum teratur & lauetur, vt prius, idque si libet, tertio, quarto, fieri potest, si medicus iusserit. Nam toties lota aloē acrimonia & vim purgatricem prope totam amittit & caloricam, licet in ea portio aloē tenuior continetur, quæ his qualitatibus exuta roborat magis, soluit minus. Hæc eius lotio magni aestimanda est, qualis dum faciem vini vltam, & calcem viuam lauas, dum subsedit, aqua hæc effusa siccatur in cauterium omnium præstantissimum.

Quæ lauandi ratio plane est ab alijs diuersa, in quibus aqua ipsa abijcitur: in hac lotionē sola seruatur.

Aloē vero si laues, ter, quater, & dum resederit aquā abieceris, quod relinquetur amaritudinem quidem exerit post aliquot lotiones, sed impura & sterculenta tantum aloes pars fuerit.

Si autem aloē læuissime pulueratam, & cretam aqua pluuiā, tanquam magis aloē permeante ob tenuitatem, vel intybi, vel rosarum, vel alia simplici, aut composita imbuas, deinde in solatu aut igni siccis: idem secundo, tertio repetas, lotio non est nisi abusus loquentibus, sed verius, vt sic dicam, imbutio. In quo genere præparationis est, quæ à Mesue in simplicibus scribitur aloes macerato ex decocto aromatum, vel specierum hierę pierę Galeni lotio enim non est, vt nec quæ Albucafi in Seruitore multiplex describitur, quia nullam ipsi

aloe aufert aut substantiam, aut qualitatem, sed suas illi facultates impertit. Fuerit igitur verius infusio maceratio & (vt sic dicam) imbutio. Quæ quibus & quâdo faciendæ sit, medici solius est instituire. Ob id hoc loco de his agendum fusiùs non putauit.

Nec sarcocollæ, aut cancamini est lotio, dum ea trita lacte asinæ, vel capræ, vel potius mulieris recentissimo humectatur, non autem mergitur, ne lac ante acefcat quàm siccetur, dein de insolatu mox siccatur: idè opus quinquies repetitur: sed infusio, aut nutritio magis fuerit.

Nec cardamomi, aut cumini in aceto maceratio recte cum Bulcasi, & alijs lotio vocetur, nisi vt dixi abusus loqui se faretur. Sed hæc de nominibus non de re disceptatio finienda est, ad remque propositam nobis redeundum. Cancamum tritum aqua fontis, cui aristologia, & schœnanthū ana incocta fuerint, lauat pistillo semper agitando Pandectarius, quoad aqua clarescat, quod resedit coletur, & siccetur. Tenuius sic euadit, & magis aperit.

Acacia vera Galeno lauatur ad tollendam ipsius acrimoniam: nobis prætereunda, quia desideratur, & eius loco fuscus prunorum agrestis, acrimonizæ experti substituitur, qui lauatur tamen aliorum succorum modo, ex aqua dulci, aut lacte, vt sit anodyna magis. Nam valenter astringentia exasperant non leniūt, vt in remedijs ophthalmizæ docet Gal. lib. c. ph. p.

Tragacathum tritum aqua pura aut rosata macerāt nocte vna, post ridie mucaginem colant, & nisi mox vtenda sit, siccant ac reponunt pro lota quæ vsurpant practici quidam.

Lichargyros, chrysis, aut eius desiderio argyritis, aut alia, modis multis abluendo albatur Dioscoridi lib. 5. Potest autè lauari, vt metallica cætera trita creta, ex aqua pura aliquoties mutata, tribulatur, residet, aqua panlatim effusa noua indatur, vt ante dixi.

Cadmia lapidosa, vt siccet magis Galeno lauatur per æstatem in sole pluribus diebus terendo in aceto acri, aut vino plane fuluo, & substantia perlucido quale in Gallia, Aurelianense & Belnensi, quod multo maxime siccare natum est: deinde siccatur & reponitur, ac vlceribus malignis inspergitur. Cadmia autem Dioscoridi in mortario trita lauatur, effusa subinde aqua dum sordes nulla emergat: deinde coacta in pastillos reponitur. Sūt qui lauat, vt pompholygem. Scoria ferri trita diebus octo maceratur aceto, quotidie mutâdo, die nono imponitur laminæ ignitzæ, vt torrefiat. Sic præparata valet compositioni Rasis ad omnem sanguinis fluorem immodicum.

Plumbum post vstionem lauatur modo omnibus duris communi, vel etiam hoc modo. Aquam paucam in mortario plumbeo agita pistillo plumbeo, donec nigrescat & crassescat, tunc per linum aquam cola ter quater, sine subsidere: laua subsidentiam aqua pura, donec ea amplius non nigretur.

Vel plumbi limaturam cum aqua crebra tere in mortario, donec aqua sæpe mutata nigriari desinat.

Pompholyx linteolo modice raro ligata in vase aqua pluuiæ, vel fontana pleno huc illuc ducitur & tribulatur, vt pars eius utilis & tenuior in aquam effluat, & omne excrementum in linteolo remaneat: residere sinas, & effundas, noua deinde aqua affusa idem opus repete, idque donec in linteolo nihil vtile maneat. Modos eius abluendæ alios lege in Dioscoride.

Sic spodium lauatur, excrementosum tamen magis est. Sic interdum & cadmia lapidosa. Nam fornacaria (quæ vulgo tuthia & male pompholyx dicitur) modo aliorum metallicorum lauanda est, & scoria plumbi in mortario lauatur aqua pura toties mutata, dum à scoria luteo colore amplius nõ inficitur: digeritur in pastillos Dioscor. Stibium, cerusa, æs vstū eidem lauantur, vt cadmia vel plumbi scoria.

Abluitur lapis cyanus, vt Armenius Alexandro Tralliano, in aqua communi tricies, vel quadragies mutata: deinde aqua buglosi, vel rosarū decies lauatur, vt in antidoto cocci baphicæ, & in catapotijs ex his lapidibus.

Calx aqua marina bis tere lota per æstatem sub æstu caniculæ puncto neruo medicamentum est vtile, cum oleo.

Chryfocollam tusam infusa aqua mortario, expansa manu eidem vehementer affrica, & vbi confederit cola, altera quoque affusa aqua rursus tere. Hæc vicissim prosequere, donec pura sinceræque spectetur, deinde siccata in sole, ad vsus reconde.

Terram Lemniam sic lauant Dianæ sacerdos in Ephestiade Lemni vrbe. Hanc aqua macerabat, & in lutum redactam valenter conturbabat, deinde paulum quiescere sinebat, tunc aquam supernatantem auferebat, & mox quod sub ea erat lutum tollebat relinquens tanquam inutile lapidosum & arenosum illud, quod in imum subsederat, lutum illud pingue siccabat, dum mollis ceræ consistentiam acquirebat: tunc in paruas huius portiones sacræ Dianæ sigillum imprimebat. Gal. lib. 9. simpl. & paulo post. Terra autè omnis

Gal. sitio
lib. 4. c.
ph. g.

lib. 9. ad
Almanfo
rem.
Diosc.

Gal. lib. 6
method.
Diosc.

lauatur eodem modo. Primum enim maceratur aqua nullam qualitatem medicamentosam habente. Vbi lutum confedit, effunditur quæ innata aqua, quod lutosum est separatur à lapidis & arenosis, quæ ad imum refederunt. Gustatus autem ubi index est accuratus, quam oporteat terram lauare, & quam non.

Quædam enim non solum terræ, sed alia quoque corpora lauari non postulant: quædam semel, vt terra Lemnia, quædam bis, vt quædam terræ Eretriensis.

Bolum Armeniam similiter lauibis. Sunt tamen qui aqua rosarum ter lauant, totiesque siccant. Potest sine lotionem usurpari cum nullam qualitatem manifestam præ se ferat, sed facultate occulta valeat: & vi siccatrice.

DE PLVRIBVS SIMVL PRAEPARATIONVM DIFFERENTIIS.

QUANTVM in prædictorum plurima multæ simul præparationum differentiæ cadunt, tamen visum est seorsum de his quæ multis præparationum modis egent. Lapis, quo vitra dicta lapidea sunt, cõcretus ex cineribus herbæ (quam vulgus sodam vocat) in fossa terrea vstæ, tritus, cribratus, aqua tanta mergatur, vt digitis duobus aut tribus superet, misce, permute faeces residere, claram partem per filtrum, vel licium destilla: quod clarum est clibano, vel igni sicca. Salem coagulum, alrabi Arabibus dictum, albisimum, inuenies multis medicamentis vtilem.

Eryngium intus & foris purgatur, in frusta secatur, caryophyllis, & cynamomo farcitur, percoquitur. Sic etiam satyrii radix quibusdam.

Amylum ex tritico delecto, crassius contracto, nocte vna macerato aqua pura, quod possit frigidè exprimes, cumque amyllum subsederit, inclinato vase aquam elementer effunde, sicca cito, igni, vento, solè, gossapio, præsertim hyeme, ne acefeat: siccatum repone vase mundo operculato. Paulo diuersius hodie fit, sed nulla virium differentia. Ex hordeo, oriza, & alijs similiter fieri potest. Agaricus tritus cum vino cui zinziber infusum sit, in trochiscos fingitur, siccatur, reponitur, vtendi tempore teritur, alijs miscetur. Sic colocynthis, scilla in trochiscos formata mitescunt.

Myrobalani multiplicè habent præparationem Mesue in simplicibus, & in s. alharil liquores, hammoniæ, galbanum, sagapenum, opopanax, & liquores alij ac gummi aceto, vino vel alio humore, quem medicus iusserit nocte vna macerantur, dissoluuntur, cribro setaceo percolantur, vt semina, & ligna, & excrementa eorum alia in colo remaneant, percoquuntur ad humoris illius consumptionem: alijs extra ignem miscetur.

Gossapium, bombacem & cotonè vocant, vino cui incocta sint aromata cephalica, aut stomachica, vel parti alij familiaria per noctem maceratur, siccatur, carpitur, applicatur loco panni quiescenti, vel eius tomenti, quod hæc ad infectionem aliena quædam recipiant.

Sunt qui hæc epithemata similibus quoque medicamentis farta, & vtrique recta dentis intererunt.

Cerebella passerum vere occisorum lauantur, purgantur. Ex his decem cum vitello oui subacta, parum igni fringuntur, deinde sole vel igne siccantur, adiecto si libet pauco melle ad vnerem incitandam parantur, alij vt adipem & medullas parant.

Pulmo vulpis lauatur à sanguine, clibano siccatur, reponitur, teritur, cum alijs miscetur, vtendi tempore.

Tunica interior gallinarum lixiuio calido hora vna maceratur, ter lauatur, deinde vino ter maceratur, & ter lauatur: iterum lixiuio, post vino, & siccatur clibano ex quo panis extractus est. Viribus tamen nullis valet Galeno in simpl. libr. 11.

Hepar lupi ad hepatis affectus quosdam vino albo optimo lauatur, inspergitur puluere tenuissimo, siccatur, absinthio in scutella inuoluitur, octauo quoque die mutatur, absinthium reponitur loco sicco.

Intestinum lupi ad cholicam efficacissimum vino albo optimo lauatur, inflatur, siccatur, extra fumum & puluerem, absinthio inuoluitur.

Oberua hic & mox in coagulo inuolutione, & in Mesue simplicibus & cõpositis sæpe præparationis quandam speciem: quam sciens omitto, quia rarior est alijs.

Cutis pedum & rostrorum bouis & ouis igni lento diu coquitur, donec veluti coagulum remittat. Id exemptum siccaturque in aere perflatili, ad hernias commendatur.

Coagulum ex recens occiso animali tenello, sale inuoluitur, insoletur, seruetur.

Hircus quadrimus, san⁹, bene habit⁹, canicularib⁹ dieb⁹ faxifragia, apio, petroselinio, fœni-
g ij

culo, pulegio, hedera, schcenantho, genista, adiantis, lupulis, & cæteris calculū frangentibus nutritus, vino optimo & tenui potatus, in sole dies 40. versatus, donec vrina nigrescat: tunc decolletur, & sanguis non primus, nec postremus, sed medius excipiatur olla pura, aut patina folijs prædictis instrata: dum concreuerit, incidatur per latum in partes duas. Siccetur sole vel luna tectus reti aut panno raro. vitetur ros & pluuia.

Diof.

Adipes recētes aqua pura aliquoties loti in vase semipieno, liquantur sole vel aqua calida in vase duplici, tepore, aut cinerib⁹: & quod liquidū erit, sensim effundatur in vas aliud. Vel igni liquentur & colo tenuissimo transfusi seruētur. Sic adipēs liquidos colando à membranis & alijs purgat Gal. in emplastro diachalciteos.

Diof.

Cantharides vere forpiculis præhensas, & immixtas phialę oleo obruc, & insola, donec putrescant, vel vre. Vel vase fictili nō picato conde, linteo raro. vasis os subliga, coque deorsum verso excipe halitum aceti quā acerrimi feruentis, donec æstu exanimentur, postea si no transfixę reponuntur.

Transfixio hic & in scilla, in radicibus elignatis seruandis, etiam est præparationis species: sed cuique perspicua, & sæpe ad siccationem & repositionem necessaria.

Carnes ericij leonis & aliorum quorundam animalium seruandę in vsus medicos, ante quater quinquies, semper tamen per horam lauandę vino calido dulci, in furno leuiter siccate seruantur.

Caro cancrorum ad antidota analeptica secreta, ter lixiuio, vel aqua salsa lauatur, donec odor teter abierit ex aqua hordei, aut fero butyri coquantur.

Ceram in aqua liquabis, extrahes autē impositis ipsi phialis vitreis aqua prius tinctis, quibus quantum adhærebit forma scintillę insola Iulio mense, donec albescat. Vel ceram ex aqua dum nigrum mutanda, coque donec sit alba.

Hęc de medicamentorum præparationibus sufficiant.

De modo miscendi ad com- POSITIONEM MEDICAMENTA, LIBER TERTIVS.



VM FINIS omnibus iis quæ ipsum præcedunt, & ipsius gratia fiunt, sit præstantior, hunc librum tertium medicis & pharmacopœis non vtiliorem modo, sed etiam magis quàm prædictos duos necessarium facile iudicaueris. Cum neque medicamenta huic affectui idonea de-legisse magni sit momenti (nisi affectus ipse simplex simplici remedio curabilis est: aut si compositus simplici quidem nobis, sed natura cõ-posito) neque hæc præparasse, nisi cõposito succedat, quam illa duo spectabant, & in quam deligebantur, & præparabantur medicamēta.

De modo igitur seu industria, & arte medicamenta componendi, & miscendi sumus di-cturi: non tamen omnia, sed ea præcipue quæ parrhisij, aut vsu, aut paratu sunt frequentiora. Quæ vero vrbes alię alia in vsu cõposita habent medicamenta, ex horum imitatione paruo negotio substituēt. Porro in his omnib⁹ Mesue ordinē sumus sequuturi, vt scilicet doceam⁹. Primū, quo modo cõdita sint cõponenda, deinde sapæ, iulepi, syrupi: tertio loco eelegmata: quarto decocta, & infusa siqua hodie vsurpātur, quæto antidota, sexto pilulę: septimo trochi sci, octauo pulueres: nono olea: decimo vnguēta, vñ decimo cerata, duodecimo ep̃lastra. His tamē passim, sed locis suis ex Nicolao, & alijs similia, sed vsitatiora nobis adscribemus. Quæ vero vrbes alię vsurpāt, si libet adscribāt, vt Lugdunēses cõseruā menthe, athanasie vulgaris, euphragie, scolopēdrii oxalidis, ireos, stæchados, hyslopi, saluie, saluie vitę myrobalanorū, li monum, primulæ veris, sigilli beatę Marię, summitatū arantij, cucurbitæ, cucurbitā conditā syrupū lupulorū, calaminthes, violatū decoctione cucurbitæ, electariū de bolo contra pestē, E. Indum maius. E. rosatum Mesue loco. E. de succo rofarum. E. lenitiū quoddam. E. de psyl lio. E. lætitie Gal. E. letificans conciliatoris, aurcam alexandrinam, confectiōem anacardi nam, hieram Rufini, Logadij, Hermetis apud Mesuem, Mielctam, requiem magnā Nicolai, rubiam trochiscatam eiusdem, trypheram persicam in febribus continuis vsurpatissimā & farracenicam, philonium persicum, & Romanum, & alia permulta vrbibus alijs consueta adscribant alijs li volent.

DE CONDITIS SECTIO PRIMA.

Ryngii radix condienda sit ampla, alba, tenera, intus li-
E gno & foris cortice purgata, deinde secta in frusta polli-
cem æquantia, intus, vnde lignum expurgasti, farta vno
caryophyllo humectato, & particula zingiberis humectata. Hæc
sic præparata coquitur in saccharo equali & melle duplo, vel mel-
le solo triplo. Coctis additur iustum pondus aromatum.

Quoniam radices hæ quantuvis teneræ etiam subduræ apparent, & coctione in sac-
charo & melle durefcunt, non tenerescunt, satius fuerit purgatas, & sectas, aqua eas regente
super cineres calidos nocte macerare, post die semel seruefacere, & ex aqua illa si pura ap-
paret, sin minus, alia dulci saccharum ad electarij solidi, aut penidiorum consistentiam co-
quere, illi tum radices has sic emollitas parumper incoquere, caryophyllorum vel cinamo-
mi, & zingiberis siccorū mediocriter pulueratorum ana vñc. dimidiam in cõditi libr. duas,
vel miscere vel nodulo suspendere sine alijs aromatibus. Similiter cõdies radices sisari, cari,
dauci, pastinace, apij, raphanti, & similia prius scilicet lotas, & intus ac foris purgatas eli-
gendo, deradendo, decorticando, sectas, fartas, melli, aut saccharo incoctas. Acorus autem
nostras non est condiendus, nisi medicus aliquis doctus iusserit, vt in Mesue docui. Alij be-
ne purgatas radices, in melle despumato, & saccharo clarificato mediocriter coctis, igni len-
to percoquunt, ex aqua tamen non præcoquentes ne aromaticā vim auferant: radicem tamē
helenij præcoque, vt amaritudinem deponat: ari, dracontij allij, cæpę, porri, & similia, vt

Mesues.

Humeſtan-
tur, vt docet
Mesues, in
zingibere
condito, &
myrobal. ce
pulis. Mel
& saccharū
despūmētur
& cū his ra-
dicibus per-
coquātur ci-
namomi &
zinziberis
ana drach.
duæ in lib.
singulas.

acrimoniam deinde vt prædictas cum melle, & saccharo percoque.

Diasatyrium alterum accipit libram vnā radicū eryngij coctarum in aqua cicerum secunda, radicū satyri plenarum & recentium vnc. octo radicū raphani domestici vnc. tres, radicū draconitii vnc. duas, quæ omnes simul trite in lactis vaccini quantitate sufficienti, & butyri vaccini olei sesamini ana. vnc. quatuor, igni lento coquantur ad iustam crassitiem, & tunc adde mellis despumati libras & sex, succi cæpæ recentis librā vnā & dimidiam, vbi omnia erunt perfecte cocta, & ab igni deposita, adde hunc puluerem scinci caudarum & lumborum drachmas octo, seminis eruce, nasturtii, pastinacæ, napi, asparagi fraxini, piperis logi, been vtriusque, zingiberis, cinamomi ana. drach. quatuor prædictis misce. Postremo adde strobilorum depellatorum libram vnā & dimidiam, pistaciorum depellatorum vncias decem, cerebrorum passeris vncias duas, misce omnia probe, aromatiza drach. vna & moschi boni.

* & cernatur.
* tres tantū hodie.
* aquæ rosarum semijuncia soluta & cum alijs mista.

Radices raphani cum etiā duriore sint radicibus eryngij, cum his præcoquendæ videntur. radicis draconitij acrimonia, lacte, butyro, oleo obtunditur. potes coquere ex lacte ouino, muliebri, caprino, & etiā asinino pro variis medici scopis, quibus etiā calidiora interdum auferre cogimur. Pro oleo sesamino iam desito sumitur oleū amygdalarum dulcium: quale postea describam, vt in diasatyrio analeptico. Iusta crassities est cataplasmatidis, opiata, calsiæ purgata, sordium auris, mellis vetusti, aut probe despumati. quod signum quoque est perfectæ coctionis cuius post meminit. Nam mel despumatum, & succus cæpæ prædictam crassitiem eliquabunt, & velut inerudabunt: absumpta deinde per coctionem reliqua mellis humiditate, & ea quæ largior est in succo cæpæ recuperatur prior consistentia, tuncque perfecta est coctio. Cicera eadem ratione infundit vel incoquit lacte, in puluere impingante sectione octaua. Sūt quæ in rem presentem quo voles tempore (nā semper vna radix vegeta est. licet magis & minus) lotam radicem ex secundo cicerum decocto coquant, deinde caryophyllis & cinamomi frustillis confingunt, & cum saccharo clarificato, & colato parū diu percoquant, dentq; dormituris radice vnā, aut duas nec infelicitur.

Aquam cicerum secundā cur capiamus in Mesue dictum. Radices plenas capit ex agro præsertim fabuloso, quia flaccidæ sunt exanimatæ, & vide ne varietas satyriorū tibi imponat, lactis quantitas sufficiens, vt digitis duobus supernatet, quo absumpto, si nondum hæc sunt percoctæ nouum lac, butyrum, oleum affunde. Pro cæpa bulbum ascalonitem nobis dictum, cur ponendum putem in Mesue docui.

Been, zingiber prima terantur semitritis adde semina, deinde cinamomum, postremo scinci fici.

Mesues
Cōserua rosarum.
* Hodie exunguntur nō siccantur.
* Duplum plerique.
* Non pleno, vt sit locus feruori etiā sine insolatu.
Dies triginta quidā insolant, male alij coquant igni.

Strobilos aqua tepida per semihorā prius macerari volunt ad acrimoniam tollendā, quæ cum tam exigua, sit in alijs magna, frustra id causantur. Cerebella passerum preparata, vt lib. secundo docuimus, in plumbis præparationum modis.

Saccharum rosatum sic fit folia rosarum rubrarum nondum omnino apertarum in vmbra & siccantur, donec ipsorum humiditas superflua resoluatur. teruntur tunc in mortario lapideo, additur sacchari albi. triplū & reponuntur & vase vitreo aut vitrato pergamena operculato, mensibus tribus insolantur, in dies sæpe mouentur, soli auferuntur, seruantur.

Sic saccharum, & mel triplum, vt florum, parum siccatorum vncias duabus mellis despumati, aut sacchari puri, puluerati, vnc. sex miscent.

Saccharum autem rosatum aliud hodie nobis appellatur, quod aqua rosarum albarum, aut

succo rubrarum pari solutum ad electarij solidi crassierem coquitur, & pulueratur, vel in marmor butyro superlitum iniicitur, ibique latefcit, dum coaluit in tessellas secatur. Saccharum rosatum tabulatum vulgo dicitur.

Saccharum violatum fit vt rosatum, nisi quod viole paulo diutius, & in vmbra siccade, & cum saccharo insolande, sic fit saccharum *buglossatum & rosmarinatum.

Rosmarinatum male anthosatum vocant, cum anthos florem omnem significet non speciatim florem rosmarini. Sic etiam conferue, vt vocant, fiant ex floribus Persicorij, arantiorum, genistæ, sparti, maluc, althææ, & similia florum.

Sunt tamen qui flores integros, & sacchari puluerem vicissim vasi inspergunt, & insolant, aiuntq; sic suas qualitates prope integras flores seruare. Alij saccharij clarificacum infundunt.

Similiter quoque fiunt herbarum quarundam natura exuccarum cōserue, vt adiantorum omnium, quibus ad analepticum destillatum vtimur, & conserua asplenij, saluie vitæ, phyllitidis, & similia. Herbe enim hæc recentes in mortario lapideo teruntur saccharo duplo miscentur, insolantur.

Mel rosatum sic fit, succi rosarum recetium libra vna cum mellis albisissimi & purissimi, & despumati libris decē coquitur igni in lebetes. Vbi feruere hæc incipiet, adde rosarum viridium forficibus, vel cultello incisarū libras quatuor, coque ad succi cōsumptionem, continenter mouendo in fictile aliquod transuasa, & diu eodem contine, nā tēpore præstātius euadit. Eodē modo fit mel violatū.

Mel cū libris aquæ trib⁹ mediocriter despumetur: vbi deinde feruebit, super ignem aut extra misce rosas & succum, & insola dies 40. aut circiter: coque ad succi consumptionem, cola, percoque in syrupum.

Sunt qui mel clarificat cum mel rosatum ore excipiendum est, illud enim clysteribus magis idoneum est.

Mel myrtinum fit ex succi myrtorū lib. vna, mellis lib. duabus, igne lenio simul percoctis.

Mel vuatum passulatum vulgo, fit ex vuis passis intus purgatis aqua calida, 24. horas maceratis, probe coctis, valēter expressis, expresso tandem ad mellis crassitie percocto.

Mel emblicarum, scilicet myrobalarum est quo ipsæ sunt conditæ & seruatæ.

His mellis differentijs vtimur in alijs compositionibus.

Anacardi triti diebus 7. aceto sufficiens maceratur, octauo coquuntur ad dimidias, colantur lineolo. Succus is cum melle sufficiens coctus ad spissitudinē mel est anacardinū. Fæx vero siccata anacardi sunt præparari. Nicolaus Alexandrinus in Theodoro ex melle anacardino, alij melleum id quod aquæ innatat, cui incoquuntur anacardi.

Fructus aut saccharo, aut melle, aut vtroque condiuntur, interdum integri & cum seminibus, sed ferè imperfecti, interdum seminibus purgati.

Fructus nostrates cōdiuntur poma, pyra moschatella, cydonia, persica præcocia, armeniaca, pruna, præsertim dactylina, nuces virides, cerasa, corna, bacca ribes, & oxyacathæ, omnes integri præterquā magni, vt cydonia, persica, hi enim foris & intus purgati, & in partes 4. secti cōdiuntur: Nuces verò depellatæ diebus nouem aqua pura in dies ter quater mutata macerantur. Postea coquuntur aqua, donec teneferant, siccantur vento aut linteis, caryophyllis & cinamomi portiunculis configuntur. Deinde vt reliqui fructus condiuntur. Alii melius nuces immaturas ter fuso (nam ferramentum acutum nigraverit magis) cōfiguntur, aqua sepe mutata macerantur, coquuntur, vbi tēnere euaserunt, mox in aquā frigidam, puram cōiiciuntur, exempte depellantur, linteosiccantur, caryophyllis, cinamomo cōfiguntur: saccharo clarificato & percocto teguntur, quod secundo aut tertio quoque die, quia recruduit, parum est recoquendum nucibus tamen interea exemptis. Sic enim virides, & puræ magis permanent. Cydonia quoque purgata ex aqua coquuntur, donec teneferant postea cōdiuntur. Modus autē con-

Mesues conferue violariū. *bugloss- si verius- que. i. vulgaris & borraginis.

Nicolaus Alexandrinus.

Matthæus Gradi in cōsilio de lepra.

Dies 4. suffi- ciūt edulca- re nuces si a qua fluitanti multa & se- pe mutata macerent. tot autem die- bus insipide euadunt, & semiputres. Sacchari si purum aqua pauca, vt li- bra vna lib. duas saccha

ri coles si im
purū & pin
gue clarifi-
cetur cū æ-
quali aqua.

diendi omnibus est vnus. saccharo enim ad syrups cōsistentiā cōsto immisi incoquū-
tur, donec syrups consistentiam saccharū recuperarit quam amisit fructuum humore so-
lutum. Quin & præcocia si præterea saccharum recrudant, id exemptis interea præco-
cibus recoquendum, deinde præcocibus reddendum. Si enim cū saccharo recoqueren-
tur durescerent. Alię cydoniorum amborū cōdituræ docētur in Mesuę, sectione prima.

Gelatinam cydoniorum sunt qui ex succo cydoniorum coquunt, alij ex cydoniatī
parte liquidiore, affuso vtrōbiq; paucō succo ribes, aut oxyacanthę, ad ruboris gratiam.

CONDITURA SEMINVM, ET ALIORVM QVORVNDAM.

CORIANDRVM in tabula polita declius, crebro succussu purgatur. Rotū-
dius enim ac integrum delabitur. Quæ verò sunt quaslagrana, & cum his
alienæ quædam materiæ in via fere hærent, vel in ipsis ceu carceribus pigra
cessant. Aceto id mersum horis circiter octo sine igni maceratur, igni tri-
gitur ac siccatur, eius libra vna saccharo sic tegitur ac incrustatur. Aquę in
lebetem stannatum impositæ libris nouem albumina ouorum tria iniectuntur, scopula-
rum agitato multo in spumam tolluntur. mox sacchari, si impurū est, (purū enim par-
cius satis est parcioiemq; aquam requirit) libræ nouem miscentur igni, omnia simul
feruendo parū diu, & rudicula confunduntur, donec spuma nigrescat, quod aquæ sexta
parte consumpta ferē accidit, per pannum laneum colatur. Eius prope dimidium in sy-
rupi fere consistentiam recoquitur. Interea semidolio focum alterum habenti super-
positum in magna pelui ærea coriadrū manibus ad siccandum ducitur. Dum siccum
est sacchari eius vncia circiter vna cochleari affunditur, multū diuque manibus in ea
confricatur. Id velut testorium dum apparet siccatum, iniecto nouo saccharo, iterū vt
prius confricatur, idq; opus repetitur, donec totum illud saccharum induerint grana
coriandri. Tunc reliquum sacchari dimidium in syrups crassitudinem percoctum, simi-
liter affunditur & confricatur.

Perlaturū verò sit (sic enim vocant quando eius corpori saccharum accrescit in for-
mam paruorum vnionum, quos vulgus perlas appellat) si vbi iustā incrustationē, sed læ-
uem & politam est assequutū, è vase sublimi inferno foramine saccharū sic percoctum
paulatim tanquam filo perpetuo in peluim coriandrum sic tectum habentem continen-
ter defluat. Peluim verò continenter in omnē partem dimoueat, vel ansis apprehensam,
& super corpus rotundum lineo circulo interposito facilē mobilem, vel facilius multo
mobilem si ansis funes sic ex solarij tigillo aliquo innexi, vt vterque alternis nūc tolla-
tur, nunc deprimatur. Sic cortex cinamomi, & arāciū cōditur, si negligētia frictio-
nis, aut imperitia saccharum fundo peluis hæserit, semina exime, & vasi aquam infunde,
igni trade, donec saccharum remollescat, & rudicula ferrea deradētī cedat. Vbi tertium
erit fundum vasis, aquam illam saccharatam effunde in vñs aliquos seruiturā. Vas lin-
teo mundo, & igni sicca, semina tunc illi redde, & opus perface.

Quanto autem est semen minutius, tanto ægrius saccharo integitur, & maiore iniu-
ria manuum nullius prope interuentu caldario occurrentiū: sed vbi iam auētus testō-
rijs aliquot est redditum, tum tutius & facilius manibus confricantibus perficitur. Ta-
lia sunt semen anisi, feniculi, apij, cari, seriphij, quod contra vermes vocāt, papaueris al-
bi in cerniculo ranore, aut denfiorē pro seminis quantitate, purgatum accuratius con-
fricādum. Strobili, pistacia, auellane, amygdalæ dulces, & si vis amare, similiter siccata
eodem modo, sed citius incrustantur. Caryophyllorū furculi cinamomū, cortex aran-
cij, limonis, cucurbitæ.

Trigema, moschatum ex puluere ireos saccharo aqua rosarū, & paucō moscho sic fit.
Puluis ireos velut compositi basis, in peluim missa affuso paucō saccharo tribulatur.
vbi in granula minima partim cōcreuit, partim in maiora cribro exiguo cernitur, quod
transit deligitur, iterum si opus est tegitur, donec seminis papaueris (quod etiam non-
nulli loco pulueris ireos supponūt ad operis celeritatem) rotunditatem & magnitudi-
nem sit assequutum. Tunc moschus aqua rosarum pauca, vt drachma vna vncia semisse
solutus, paucō saccharo miscetur, quo postremū fit testorium. sunt qui acervo huius cō-
diturę moschi pyxidem biduo aut triduo tantum obruant, vt moschi odorē trahat, sub-
stantiam non dissipet manifeste.

SECTIO SECUNDA DE SAPI, IVLEPIS ET SYRVPIS.

Apa est succus à nobis tantum purgatus, & crassatus so- Mesues.

S lis aut ignis calore.

Sapa nobis sola paratur ex acinis vuæ albæ maturis, in lebetes sine villo li- quore coctis, per mantile colatis & expressis. Id autem expressum perco- quitur ad mellis consistentiam. Sunt qui vt felicius seruetur, saccharo pari cōdiunt: sunt qui ex vuīs etiam nigris sapatam coquunt.

Iulepus rosatus fit ex aqua rosarum cū pari saccharo cocta propè ad syrapi cōsisten- tiam: aut multo minus si mox vtendus est, nec aer ita calet.

Iulepus violatus fit ex aqua florum, & foliorum violæ nigræ, & pari saccharo simili- ter coctis, supra apozematum consistentiam infra syrapi formā. Quanto enim perse- ctius coquitur, tanto diutius seruetur: sed est ingratus. Paratur in rem præsentē, aut si non licet, eorū loco syrapi vsurpantur. Quia verò violas non destillamus ex siccatū in- fuso coquimus. Alij magma violarum ad syr. violatum ex multis infusionibus facien- dum infusarum parum expressum destillant, hacque aqua inique vtuntur ad iulepi vio- lati compositionem.

Materia syruporum omnis est à plantis, radices apij, petroselinī, fœniculi, asparagi, rusci, cichorij, intybi, ireos, pirethri, spinæ albæ, & Arabicę, glycyrrhiza, polypodium, agaricus, rha barbarum, elleborus niger, asarum, galangā, zingiber.

Herbę, buglossus vtraque, hyssopus, mentha, calaminthe, eupatoriū, absinthium, a- dianthum album, organum, thymū, epithymū, cassutha, oxalis, fumaria, chamædrys, cha- mepitys, folium. Harum item multarū succus, præsertim buglossi, mēthę, eupatori, oxa- lydis, fumarie, intybi, portulacæ.

Fructus poma, pyra, cydonia, cucurbita, granata, citrea, pruna, dactyli, tamar Indi, myrobalani, myxa, zizypha, ficus, vuæ passæ mundatæ, capita papaueris albi, nigri, ru- bri, folliculi fennæ. Horum multorum succus tantum, præsertim pomorum, pyrorum, cydoniorū, cucurbitę granatorū, citreorū, & horum cortex, vuarū acerbarum & matu- rarū, vinū album bonū, antiquū, odorū, acetū, sapa. Ad hæc myrtarum, prunorū, persico- rum, ribes, oxyacanthę, cannarum sacchari, saccharū, penidia: & his affinia, manna, mel crudum, & coquendo despumatum.

Semina, cydoniorum, melonū, papaueris albi, nigri, rubri, lactucę, portulacę, apij, pe- troselinī, intybi, fœniculi, anisi, ligustici, dauci, cari: piper omne, cardamomū, hordeū, malę, lini, fœnigræci.

Flores, crocus, rosa, viola, stœchas, fchœnuanthos, epithymum, cassutha, spica nardi, caryophyllum, gummi Arabici, tragacantha, mastiche, & liquor scammoniū. Et præter hæc aqua fere fontana pura illimis, ac omnis alienæ qualitates experts, interdum pluuiā quę additur, vt in eam vires medicamentorū simplicium macerando, & coquēdo trahan- tur: deinde saccharo tradantur, vt etiam medicamentum diu coqui possit, & qualitates alienas exuat, nouas acquirat: vt etiam promptius syrapi despumentur, clarificētur, eo- lentur, & in corpus distribuuntur: & sint accipienti gratiores. Aquæ vires sæpe succi sustinent, sed hi sunt vt dicam clarificandi.

Succi, herbarum, & fructuum ad syrupos bis coquuntur, primo ad dimidias, vt syr. de pomis, & alij prope reliqui: interdum ad partis tertię cōsumptionem, vt syr. acidus ex succo citri, & alter ex succis fructuū: interdum ad lib. vnus consumptionem semel feruehūt, vt in syr. bizantino: deinde colantur, postea quiescendo residere sinūtur, alij biduo, alij triduo, alij minus aut magis diu, donec scilicet quod in eo crassum & fœcu- lentum est, subsederit, & reliquum tenuetur, clarumque ac purum euadat: id quod pau- latim vase inclinato colatur, iterum & cum saccharo ad syrapi consistentiam coquitur.

Subsidet verò alijs citius, alijs tardius, alijs largius, alijs parcius, vt vinis quæ ex gene- re sunt succorum, & vrinis. Vina enim alba, quia non feruerūt plurimā fœcē reddunt: nigra quia multum feruendo crassum deponunt, minus: in medio sunt media: sic succus pomorū, cydoniorū, limonū, multa parte subsidet: succus granatorū minus, vt illis pars sexta ferē subsideat, his pars octaua, vt ex syr. de succo acido citri apertè deprehendes.

Deinde cum saccharo prope pari percoquūtur in syrupum, vt succi puri lib. 4. 5. sac- chari libras tres 4. recipiant, vt in Syr. succi pomorum, cucurbitę, succi lib. 7. sacch. lib. 5. in syr. ex succo citri lib. 10. humoris, lib. 8. sacchari, in syr. acido ex pomis, interdum

minus sacchari miscet, vt in syr. Saporis succorum librę circiter 6. in lib. tribus sacchari syr. corticum citri librę tres post coctionē relinquitur cum sacchari libra vna coquantur.

Quin syr. acidus ex cydonijs in succi libris vndecim, habet tantum sacchari libras duas. Est quando modus sacchari incertus est, vt in syr. acido ex succis fructuum succi libras tres coquit cum Iulepi lib. duabus, vel pluribus, vel paucioribus. Si māmā paucā acceperit syrupus, nihilo min⁹ sacchari postulat, vt syr. acidus ex māna eius vna tres capit, succorum libras 4. sacch. lib. tres, succus tamen cānarum sacchari, aut penidia ponuntur loco sacchari in syr. de cannis sacchari, nisi pro, aut, &, legas.

Quin & Iulepus clarus & purgatus sacchari vice præstantissimus est in syr. præsertim ex succis frigidis aut aromaticis, vt fit à Mesue in syr. acido ex succis fructuū, & in syr. corticum citri. Saccharū autē optimum ex aqua æquali coquant, albuminibus purgant, colant, recoquūt ad penidiorum, aut sacchari rosati, aut electarij siccī consistentiam, & succos mox vbi extracti sunt, sine vlla coctione, colatione, relinquent colant, per spumam in colo relinquant ex saccharo iam colato purissimique hi transfluunt, & æqua portione baculo multum tribulando electariorū sicciorū ritu paulatim miscetur saccharo sic percocto, quem Iulepum vocat Mesues, quomodo & syr. acetosum simpliciter Mesue, & oxy-saccharum Nicolai, & alios multos syropus ex succis plerique hodie componūt, vt vires eorum sint integriores, nec ita prompte cādescant, quod vitium paucō melle musto quidam effugiunt. Id quod probō maxime, modo non canescant, & situm non ducāt ob succorum cruditatem. Quod vitiiū cauetur in solatu: quę coctio his potior est quā quę ab igne. Hoc autem modo syr. acidus citri, limonum, acetatus simplex albissimus fit, gratorum autē ribes oxyacanthę syr. cum debeat esse ruber, minus diu debet tribulari, ne coloris sui gratiam amittat. Est quando saccharū simul cum penidijs miscetur, vt in syr. papauerū ad catarrhū sacchari & penidiorū ana vncię quatuor in decocti felibra: & in syr. papauerū ad tussim, sacchari & penidiorū ana vnc. 8. in decocti lib. duab⁹, sed in illo saccharū est parcius, vt in syr. adianti. sacchari clarificati, & aquę adianti ana vnc. octo cum lib. duabus decocti.

Coquantur autem in vase terreo plumbato potius quā æreo stannato, igni prunorum lento, aut flāma exigua, sed sine fumo, vt carbonēs ante sint omnino accensi quā vas igni tradatur: qui se coctioni non sufficiant, alij ex foco semiuisti substituātur, vt diximus in methodo medicamenta componendi lib. 3. ne carbonū nouorum teter vapor coquenda vitiet.

Nicolaus Alexandrinus in syr. rosaceo. Coquantur syropi ad iustā crassitiem, seu donec portio eorū refrigerata digitis tractatu hæret, ac fila ducit, & iniecta marmor aut scutellę stat & durefcit non fluitat, seu donec immixti humores seu decocti, seu succi vncię circiter duę in libris singulis sacchari supersint. Id quod deprehēdes bullarum modo & numero: nam quoad succi multum superest in medio bullam excitat vnā, eāque maximā in ambitu paucas & paruas: dum verō in syrapi consistentiam coctum propē est pro bulla illa maxima, plurimę vbiq; medicres tolluntur.

Qui verō syropi decoctio constant, non succis: pro seminum aut radicū libra vna requirūt aquę libras circiter quatuor, pro herbarum manipulis quatuor, siccarū quidem, aquę libras duas: viridiū verō libram vnā: aliorum autem simpliciu, quia pauca sunt parua habetur ratio. Mesues tamen radicū simul & seminum libram vnā coquit in aquę libris decem ad dimidias in syrupo acetato cum radicibus.

Cum item hordeum, vel aliud diu coquendum est, aut per se est macerādum, aut tanto largior aqua est affundenda, quāto coctio longior est futura: sic dum sicca, rara, lenta, & glutinosa coquis, aquam auge, vt in syrupo hysopi, zizyphorum, alioqui colari non poterit, nisi nodulū ex glutinosis eam colato incoquis, aut mucaginē ex his cū portione decocti extractam coctiori iā saccharo mices. Incocta enim hæc glutinosa decoctū incolabile reddunt, quia substantia emplastica viam sibi præcludūt, poris coli obstruētis. Idem vitium est si penidia miscetur ex saccharo pinguiore, impuriore cum amylo multo tractata. Sūt qui librę medicamentorū multam coctionem sustinentiū tribuant aquę libras sex: paucam, selibram, medioerem, tres libras aquę.

Simplicia primum deliguntur, & in scriniola papyracea, vel similia digerātur. Si quis seorsum maceranda sunt, aut simul ante macerentur: coquenda verō in lebetem in quo aqua iam caleat non tamen ferueat, iniiciantur, primum coctū contumacia, seu quę viribus sus adhuc integris longam sustinent coctionem, qualia sere sunt radices, semina, fructus, cortices lignorum: deinde illa quę mediocriter: postremo quę ob essentia te-

nuitatem, aur vitium imbecillitatem, etiā mediocri coctione exanimantur. Id quod odore, sapore, colore natio mox perditō ferē declarant. Quāquam color viridis in adiantis, ruber in zizyphis magis intēditur: quia in his valenter est mustus, & adiātī perpetuō virēt. De quibus omnibus abūde libro præcedēte, de coctionis ratione diximus. hæc dum carbonibus accensis coquuntur quæ spuma supernatur, cochleare foraminulento deraditur, & simplicia, præsertim grauiā, idēdem rudicula tollūtū a fundo, ne vrantur, & leuia merguntur: vt coquantur, & vires suas aquæ tradant. Vbi quantū satis est cocta erunt omnia (quod ferē fit hora vna) & vim suam omnem in aqua iam quātum satis est consumpta deposuerūt (quod in multis simplicibus sapor prope aqueus relicto proprio declarat) igni aufer, & si vis in stāneam peluim, aut stannatā tranluasa: tege disco mundo, horis quinq; sex, noctem, diem, macerari permitte. Post id tempus igni parum diu redde, vt recalescāt tantū: tunc per stamē cola, & exprime. Expressū vel procul ab igni, vel potius igni redditum, ouorum duorum iniectis albuminibus in libras 6. 8. 10. scopulis agita diu, & permisce donec quantum potest spumescat. Mox saccharum in frusta comminutū, immitte, aut penidia, aut mel, & si qua sunt seorsū infulsa, aut soluta, vt tamar Indi, cassia, agaricus. Postea coque, donec seruendo parum absit a supernatando & effluendo, efflataque modice spuma decoctum sub hac clarū appareat. Tūc vt calet panno lanco puro cola, si est glutinosum, & quod primum permearit rursus cola, & si vis totum bis aut ter cola, mutato etiam colo, si propter prioris sordem opus est. Nam quæ ita calida colantur, igni multum tenuata, permeāt impuriōra: si lentore carēt, modicē refrigerata colentur. Pāno etiam *digitis molliter expresso*, nequid vtilis materię in eo, & fecibus maneat, nē tamē ad eō exprimas, vt fordis aliquid simul elicias, tūc enim iterum foret colandum. Vbi colando iam purū erit expressum, purgato interea & siccato lebeti redde, & igni lento percoque ad syrūpī cōsistentiā, seu donec decocti vnciæ duæ, aut tres in libris singulis supersint.

Si autem mucosa quædam sint incoquenda, vt semina maluæ, cydoniorum, lini, fœnigræci, mastiche, tragacantha, gummi Arabicum, nodulo raro ligata filo longo & forti colato iam decocto incoque. Sunt qui tantum ante clarificationem incoquunt, alij ante & post. Postremo cum absoluta est coctio expressum nonnulli abijciunt: alij nulla ratione in decocto retinent, cum vires suas ea iam tradiderint omnes, non etiam aliquas retinent, vt nodulus aromatum, rha barbari, scāmōij, ellebori nigri, & aliorū de quibus libro superiore in expressione.

Si verō ex infusione simplicium post coquenda fiat syrūpus, omnia simul infundantur, deinde coquantur. Sic enim vis eorum humori firmitus, & diutius impressa, coctione iusta dissipari non videtur. Aqua autem infunduntur largiore sicca, rara quā viridia dēsa, vt in syr. stœchados simplicium, verbi gra. parū tritorum lib. vna maceretur horis 24. libris septem aquæ, si aridiora sint libris octo, quarum vnā vel paulo plus ebibent: coquantur deinde igni lento ad partis tertiæ consumptionem, quod etiam citra infusionem coquendo, faciendum est: postea exprime, & reliquum, & lib. quatuor percoque cum mellis despumati, aut sacchari puri libris quinque ad syrūpī consistentiā, & syrūpī habebis libras sex & dimidiā aut si hyems est, ad libras sex: si estas, ad libras quinque & dimidiā. Nam æstate syrūpi magis coquendi quā hyeme ne ferueant humore excrementoso feruoris & putredinis causa relicto accedente externo calore hanc excitante, sacchari aut mellis purgati pondus par succo aut decocto quidam misceri volunt: alij verō etiam paulo plus ob nostrarum plantarum cruditatem, ob quam etiam diutius syrūpi nobis sunt coquendi, vt prope solum sacchari, aut mellis pondus maneat percocto iam syrūpo. Diutius etiam coquendum: si succi, aut decocti plus est quā sacchari, aut mellis. Paulus tamen mellis partem vnā succi, aut aquæ partes tres coquit ad partium duarum cōsumptionem in rhodostacte succi rosarum sextarios duos, mellis sextarium vnum coquit ad quartæ partis consumptionem.

Coquuntur syrūpi in vase quouis, sed qui acerati sunt in vase lapideo vel terreo, sed plumbato, quod etiā Mesues recte monuit in syr. acetato simplici, ne acetum ex ære æruginem eliciat quæ syrūpum vitiet, nisi vas æreum sit stannatum, quale est quo vtuntur ferē in officinis. In quibus coctionis perfectę scopus est syrūpi consistentia: si verō antequam mel recipiant, cocta erant parum, vt ad tertiæ partis consumptionem, post mel acceptum magis sunt coquenda, vt oxymel de radicibus. Minus autem quæ cocta erāt donec tantum pars tertia remaneret, vt in oxymelite de calaminthē mediocriter vbi ad dimidiās erāt cocta, aut mel perfectius coctum illis minus coctum secundis, mediocri-

ter coctum postremis miscendum est.

Si operis specimen edis, aut etiam tecum cōponis, aquę libris quindecim cum Mefue, aut potius viginti, lib. sex rosarum macera horas octo, expressis rosis nouas immitte, idque opus nouies repete: aut si libras aquę tantū quindecim mīscēs, expresse pende, quod si diminutum est, quod deest suffice alio expresse trīum aut 4. infusionum.

Nicolaus

Hic præfertim recens medicocriter purgat magis ex incarnatis, vt in Mefue do cui.

Nicolaus

Syrupus rosatus sic paratur, rosas recentes aqua feruente macera vase operculato, vbi hæc refrixerit expressis rosis & abiectis, iterum feruescat, & eadem rosas recentes alias macera. Id opus toties repete, donec aqua rubeat. Hæc albuminibus purgata cū pari saccharo percoquatur in syrupum.

Parari omnino hic debet, aut iulepus rosatus Mefue in syrupum coquendus, non autem eius loco semper (quod hodie fit) substitui syr. ex rosarum siccarum infuso simplici vel duplici cum pari, aut paulo parciore saccharo cocto & colato, qui syr. rosarū siccarum est. Alius autē ex succo rosarū rubrarū fiat purgato, cum pari saccharo, Tertius ex infusionibus nouem rosarum, præcipuē incarnatarum purgatorius.

Syrupus violatus, & nymphaeæ, & alii ex floribus eodem modo fiunt.

Mefues.

Syrupus ex cydoniis fit ex libris decem succi cydoniorum coctis ad dimidias. Deinde biduo residere permittis donec clarescāt. Tunc colentur, & cum libris tribus sacchari fiat syrupus.

Si saccharum est purum, eius lib. vna aquę vncijs quatuor soluta tribus feruefactionibus in electarium coquitur, tunc succus cydoniorum pistillo valenter cōmiscetur. sunt qui pariter saccharo prope percocto incoquūt: si impurum est saccharum, eius libra in aquæ lib. vna coquitur, clarificatur, colatur, percoquitur in electarium, sit vt prius. Sunt qui succos citra coctionem residendo, & insolando purgant, deinde cum saccharo clarificant, colant, percoquant. Alij aliter, vt ante diximus.

Mefues

Syr. de granatis acidis, syr. de granatis dulcibus, syr. de omphacio, syr. ex succo oxalidis, eodem modo fiunt, & de ribes, & vua oxyacanthæ.

Similiter ex fructuum omīum, & herbarū succo fieri syrupus potest si ad dimidias coquatur, biduo residere permittatur, coletur, cū saccharo prope æquali percoquatur, in syrupi consistentiam.

Alij in his omnibus saccharum aqua pari solutum coctū modice cum albuminibus purgant, colant, percoquant in electarij, aut penidiorum consistentiam. Tunc vbi frigescit, succos ipsos per albumina in colo relicta colatos, & claros paulatim baculo mīscēt. qua componendi ratione succorum vis, præsertim frigida, vel aromatica integrior manet quàm si ipsi coquātur. Alij succos hos residendo, & insolatu purgatos, saccharo, vt dixi, percocto comprehendūt. Quam componendi rationem omnino præfero ei quę succos ad dimidias coquit.

SYRVI COMPOSITI.

Mef.

Syrupus saporis de pomis recipit succi pomorum redolentīū lib. tres, succi buglosi domestici & syluestris ana lib. duas, folliculorum fenne vnc. quatuor, croci drach. duas, sacchari albi lib. tres. Fit autē sic, fenna cōtrita horis 24. succis maceratur, semel aut bis feruescat, coletur: expressum post cū saccharo percoquatur in syrupum: crocus autem panno līneo ligatus inter coquendum infricetur.

Syrupus portulacę accipit feminũ portulacę tritorum lib. vnā, Mef.
 horis 24. macerãdam in succi intybi cocti & purgati lib. ¹/₄ quatuor
 postea igni lento coque ad dimidias, & colatum cum sacchari lib.
 duabus percoque in syrupum.

Syr. adiantinus recipit glycyrrhyzę vnc. duas, adiãti albi vnc.
 quinque, tempera aquę fontis lib. quatuor horis 24. coque ad dimi
 dias, expressum percoque cum sacchari clarificati, aquę adiãti albi
 ana vnc. octo.

Ex adiãti albi lib. vna, & vncijs duabus glycyrrhizę purgatę & tritę, decoctis in a
 quę libris sex ad consumptionem tertię partis cum sacchari libris tribus. Hic perco
 quimus, adianti albi, recentis penuria, alij cum sacch. libra, aut sesquilibra coquunt sine
 aqua adianti. alij adiantum album recens multum sine glycyrrhiza aqua macerant, ex
 primunt, cum saccharo clarificant, percoquunt.

Syr. zizyphorũ fit ex zizyphis sexaginta, violarũ, feminis ma
 luge, ana vnc. quinque, adianti albi, glycyrrhizę, hordei mundati, a
 na vnc. vna, semi. cydoniorum, papaueris, melonis, lactucę, traga
 canthę ana drach. tribus, coctis cum aquę fontanę lib. quatuor, &
 lib. sacchari duabus.

Aqua est parcior quã vt possit colari, ob id vel augenda est, vel semẽ malux & cy
 doniorum, & gũmi, tragacanthę nodulo ligata clarificato syrupo immittãtur, vel dimi
 dium nodulo coctioni ante clarificationem immittatur: reliquum iam clarificato. si au
 tem mucagineni ex his extractam nõ clarificato immiseris egerime ob horum lento
 rem colatur, si colato turbidus & impurus ob id ingratiõ fit syrupus.

Syr. papaueris fit ex capitum papaueris albi & nigri, ana drach. Ibidem.
 sexaginta coctis in lib. quatuor aquę pluuialis ad cõsumptionem
 lib. duarum, & dimidię, tunc percoquantur cũ sacchari albi, & pe
 nidiorum ana vncijs quatuor.

Largiore saccharo si condias, vt lib. vna, aut etiam duabus, gratius erit, & citra mul
 tam coctionem facultati refrigeranti inimicã diutius seruabitur, cum pauco autem sac
 charo puro, si diu non erit seruandum est efficactus. Capita cũ seminibus magnorum
 & paruorũ siccorum & humidorum media macerẽtur 24. horis: & si sint sicciora, plu
 ribus deinde coquãtur, donec tabescant: exprimantur cum saccharo, vel melle pro va
 rijs medicis scopis, percoquantur in syrupum. Vide diacodium in Mef.

Syr. acetatus simplex recipit aquę fontis lib. quatuor cum sac
 chari lib. quinque coquendas in vase lapideo, ad dimidias semper Ibidem.
 despumando, tunc adde aceti albi clari lib. duas.

Sunt qui saccharum aqua solum mediocriter coquunt, albuminibus purgant, co
 lant, percoquunt in electarij cõsistentiam frigescenti, paulatim baculo miscent acetum
 purum, vel per albumina in colo relicta colatum, idque ne cãdescat. Alij Nicolaum se
 quẽtes aceti albi partes duas cum saccharo purissimo coquunt & despumãt, neque ali
 ter clarificant. Hic quanquam minimum, tamen compositus est.

Syr. acetatus cum radicibus recipit radicem apii, foeniculi, inty
 bi, ana vnc. tres, seminum apii, foeniculi, anisi, ana vnc. vnã, sem.
 intybi vnc. dimidiam. Hęc omnia igni lento coquantur ad dimi
 dias in aquę fontanę lib. decem, tũc additis sacchari lib. tribus cla
 rificetur, deinde acetum additur.

Syr. Bizantinus recipit succi intybi, & apii ana lib. duas, succi lu.

Putatur in
uentus, vel

v sumulto ce
lebratus bi-
zatiij, vnde
illi nomen.
alijs à pre-
cio dena-
rij bizatini
qui quibul-
dā hodie e-
tiā bizantius
dicitur, vnde
& syr.
quoci; hunc
denarij vo-
cant.

*Syr. bizā-
tinus absolū-
te sine ace-
to est.

Syr. bizāti-
nus acetat⁹.

Syr. bizāti-
nus cū addi-
tionibus.

*Incertif
authoris.

Mefues

puli, buglosi hortensis, vel sylvestris ana lib. vnā: feruefiant semel & purgentur. Eius succi clarificati libras quatuor igni lento coque in syrupum cū sacchari lib. duabus, & dimidia. interdum additur acetum mēfura succorum purgatorum dimidia: interdum rosarū vnc. duæ, glycyrrhizæ, vnc. dimidia, spicæ nardi drach. duæ sem. anisi, foeniculi, apii, ana drach. tres succis incoquuntur.

*Syr. de quinque radicibus accipit radicū apii, foeniculi, petroselinī, asparagi, rusci, ana vnc. duas coque lib. sex aquæ fontis, ad tertiam partis consumptionem, expressum percoquitur cum sacchari lib. tribus, addendo sub finem aceti vnc. octo.

Oxymeli simplex fit ex aceti parte vna, mellis partibus duabus, aquæ partibus quatuor coctis in syr. consistentiam despumando.

Hodie sic coquunt quod diu seruandū est. Oxymeli autē Galeni ex aceti parte vnā mellis partibus duabus aquæ partibus octo æstare etiam duodecim. Mel cum aqua primū despumatur, vbi spumare desijt, cum aceto iterū despumatur, refrigeratū albuminibus clarificatur, igni redditur parum diu, cum tollitur cinamomum, additur ad drach. vnā in lib. singulas: dū refrigit, per pannū bis ter colatur: addito si vis etiā tū cinamomo iucūdissimū. dies paucos loco frigido seruat ex albo aceto, & melle pulchrius.

Acetum scillinum sic fit, scillæ laminas inter corticem & cor medias acu linea filo confutas tanto interuallo ne se cōtingant siccas in vmbra dies quadraginta, postea cōcisam cultello ligneo lib. vnā dies alios 40. insolabis, in aceti boni lib. octo, in vase vitrato, stricti orificiū bene obstructi, postea colabis, & seruabis.

Sunt qui inter scillæ laminas ne se tangant, & ad odoris gratiam intersuunt foeniculi viridis, aut sicci stipites.

Ibidem.

Oxymeli scillinum fit ex aceti scillini lib. duabus, mellis despumati, lib. tribus coctis despumando.

Ante mel sit despumatum, vt in melle rosato, sed quam spumā vī aceti scillini expuit, eam derade.

Nicolaus
saler. al-
ter fer Ni-
cophar.

Oxyfaccharum fit ex aceti vnc. quatuor, sacchari lib. vna, succi granatorum acidorum maturorum lib. dimidia.

Saccharum si purum est aceto solutū, duabus aut tribus seruēfactionibus coquitur in cleſtarium, postea cum parū refrigit, pistillo miscetur succus granatorum. Si autem saccharum est impurū, ex aqua coquitur & clarificatur, deinde aceto & succo percoquitur.

Syr. absinthii recipit absinthii Romani lib. dimidiam, rosarum rubrarum vnc. duas, spicæ nardi drach. tres, vini antiqui boni & odori, succi cydoniorū ana. libr. * vnā & dimidiā. In his macera horis 24. prædicta, coque igni lēto ad dimidias cū mellis lib. duabus. fiat syrupus.

*alij. lib.
duas & di-
midia, vt
facilius
coletur &
valentius
astringat.

Absinthium, rose, spica minutim concisa vino & succo macerantur, coquuntur, exprimentur, expressum cum saccharo clarificatum percoquitur in syrupum. Satius fuerit absinthium per se infundere, & rosas, & spicā simul, deinde infuso absinthij parum cocto addere alterum, & parum simul coquere, exprimere. In expresso lib. sacchari dissoluti albuminibus clarifica, cola, tunc adde lib. reliquam sacchari, sed purissimi, vel per se clarificati. Si enim decoctū id cum duabus simul libris sacchari clarificas ob succi paucitatem non percolabitur nisi succum, vt dixi auxeris ad lib. duas & dimidiam.

Sunt qui po-
morti acido
dulcium, vt

Syr. menthæ recipit succi cydoniorum acidodulciū, & dulcium, succi granatorum acidorum, dulcium, acidodulcium, ana lib. vnā,

& dimidiam *foliorum rosarum vnc. duas, coque igni lento ad dimidias, *cum mellis vel sacchari lib. duabus fiat syrupus, aromatizetur cum gallia.

Succos potes sole, igni, quiete purgare, & his reliqua macerare, vel citra purgationē. His cetera macerabis horis 24. igni lento coque, exprime, recoque, clarifica cū saccharo, vel saccharum clarificatum misce, *cola, exprime cum saccharo, expressum clarifica, colatur pannō egre & lente, sed tandem aut pannū muta, aut saccharū, vt prius partire.

Loco syruporū fumarie maioris & minoris hodie coquimus syr. ex succo solius fumarie cocto residendo, purgato, percocto in syrupum cum saccharo æquali.

Syr. epithymi recipit epithymi boni hortēsis drach. viginti, myrobalanorum Indaruna, citrearū ana drach. quindecim, cassuthæ, fumarie ana drach. decem, thymi, calaminthes, buglossi, stœchados, glycyrrhizæ, polypodii, agarici, myrobal. emblicarum, & belleric. ana drach. sex, rosarum, semi. fœniculi, anisi ana drach. duas & dimidiam, pruna viginti, uarū passarum purgatarū vnc. quatuor. Tamar Indorum vnc. duas & dimidiā, sacchari lib. quatuor, sapæ lib. duas, fiat syrupus.

Pruna, vuz, semina, polypodium in aquæ libris octo coquantur, postea glycyrrhiza, buglossus, fumarie: post myrobalani, calaminthæ, thymus: deinde prope coctis epithymus, cassutha, stœchas, rosæ, agaricus addatur, vbi aquæ dimidium erit consumptū, aufer igni, macerari noctem vnam sine, recalsctum exprime, expressum clarifica cum saccharo, & cola. Thamar Indi cum decocti vncijs duabus creti & pensi, vt purgati pondus iustum expleat, syrupo addantur, minimum coquatur ad decocti scilicet consumptionem, & sapā syrupo soluta misceatur: recoqui enim non debet. Sine his duobus sapore iucundo præditis cōsistentia fuerit liquidior, clarior & gravior, & efficax syrupus ad ea quæ promittit. Sunt qui rectius agaricum, & myrobalanos seorsum infusos expriment, & alijs miscent, paulō ante colationem.

Syr. stœchados recipit florum stœchados drach. triginta, thymi, calaminthes, origani ana drach. decem, anisi, pyrethri, ana drach. septem, piperis longi drach. tres, zingiberis drach. duas, uarū passarum purgatarum vnc. quatuor mellis lib. quinque condiatur cinamomi, calami aromatici, spicē nardi, croci, zingiberis, piperis nigri & longi ana drach. vna & dimidia, ligata in panno raro & apensa in syrupum.

Coquitur in aquæ lib. 7. vel octo ad lib. circiter duarū cōsumptionem, colatum cum sacchari lib. quinque clarificatur, colatur, prope percocto immergitur sæpe nodulus, & rudicula comprimitur: postremo in percocto appenditur, Vuz, origanum, calaminthæ, pyrethrum, zingiber, piper, thymus, stœchas hoc ordine coquantur.

Syr. glycyrrhizæ recipit glycyrrhizæ vnc. duas, adianti albi vnc. vnā, hyssopi sicci vnc. dimidiā, horis 24. macera, aquæ lib. quatuor coque ad dimidas, expressum percoque cum *mellis, sacchari, penidiorum ana vnc. octo, aquæ rosarum vnc. sex.

Hodie coquunt plerique sine maceratione, quodd ex his facultas in aquam coquendo promptè trahi possit. Hæc rosarum aqua percocto iam syrupo addenda, sed coquendo consumenda, nisi cum quibusdam drach. tantum sex misceas, tunc enim recoqui non oportet, quia aqua tam pauca saccharum nō recrudat. Sunt qui mane macerant, post meridiem coquunt. penidia hæc fiant ex saccharo purissimo (nam impurum ægre colatur) hoc est, saccharum ad consistentiam penidiis debitam coctum, & pertritum pistillo lz

ramburorū,
& granato-
rū acido dul-
ciū, tū ana
lib. duas &
dimidiā mis-
cent.

* minutim
concisa.
* quæ suc-
cos macerā-
do opotos
coquendo
reddit.

Mesf.

Mesfues:

* despu-
mati.

gneo in vase non autē manibus oleo, inunctis etiam cū amylo, tractum in penidia nempe illo saccharo impuriore.

Mef.

Syr. hyssopi, recipit hyssopi mediocriter sicci, radicū apii, fœniculi, glycyrrhizę, ana drach. decem hordei mundi vnc. dimidiam, semi. malug. & cydoniorum, tragacanthę ana drach. tres, adianti albi drach. sex, zizypha, myxa ana triginta, vuarum passarū purgatarū drach. duodecim: ficus siccas, dactylos pingues ana decem, penidiorum alborum lib. duas: fiat syrupus.

In lib. aquę sex calidas inijce hordeū hora post dimidia radices si dātur recētes, eligatas tamen & concisas, horę quarta parte post, fructus omnes: mox semina, & tragacantham linteo raro ligata, filo longo, postremo adiantum, penidia, vt prius.

Ibidem.

Syr. prasii recipit prasii vnc. duas hyssopi, adiati albi ana drach. sex, glycyrrhizę vnc. vnam, calaminthes, anisi, radicū apii, fœniculi ana drach. quinque, ireos, semi. malug. & fœnigreci ana drach. tres, semi. lini & cydoniorum ana drach. duas, vuarum passarum purgatarum vnc. quinque, ficus passas pingues quindecim, penidiorum mellis boni despumati ana lib. duas.

In aquę libris octo radices primum, deinde anisum vna, ficus, post prasii, hyssopū, calaminthe, postremo adiantum coquātur, ad dimidias horis sex macerentur, recalsiāt, exprimātur, cum penidijs & saccharo clarificētur, colentur, percoquātur in syr. interea identidem in id colatum, & si vis expressum immerso & confricato nodulo semina malug., lini, fœnigreci, cydoniorum continente.

Ibidem.

Syrupus intybi recipit succi intybi vna seruesactione, deinde residētia purgati lib. octo affūde paulatim saccharo, si impurū est clarificato. Si verò minus est purū succo dissolutū coquatur, cū albuminibus purgetur, coletur, percoquatur in syrupū, nam hic succus prōpte corrūpitur, cū succus limonū, granatorū, cydoniorū etiam per se seruari possint, & multo magis parum, cocti cum saccharo.

Intybum accipe cichoriū sylvestre non lactucā sylvestrē vulgi endiuia seu sthybum. Ne sit opus pręterea syr. duobus de cichorio simplici, & de endiuia simplici. Quod si in aliquibus scripturis intybus & cichorium requirantur, vel ipsum auge, vel satiuū & erraticum, angustifolium, aut latifolium, vel alias cichorij species misce.

Syr. arthemisię Matthæi Gradi in cap. de mēsisbus ciendis lib. 9. ad Almanforem, recipit arthemisię manipulos duos, pulegii, calaminthes, origani, melissophylli, persicarię, sabinę, sampsuchi, chamędryos, hyperici, chamępythios, matricarię cum flore, centaurii parui, rutę, bethonice, buglosi.

Radicū fœniculi, apii, petroselini, asparagi, rusci, saxifragię, enulę, dictamni, cyperi, rubię, iridis, pæonię ana manipulum vnum.

Seminis iuniperi, libystici, petroselini, apii, anisi, melanthii, carpopalsami, costi, asari, pyrethri, calsię lignę, cardamomi, calami aromatici, phu, ana vnc. semissam. Quassata infundātur aquę fluuiali sufficienti horas 24. post coque ad aquę dimidię cōsumptionem. Tunc aufer igni, dum aqua tepuerit, frica manibus omnia & cola, expressum percoque in syrupum cū mellis & sacchari quan-

titate sufficienti. Additur interdum acet uacerrimū, vel scillites largius, parcius pro scopis variis, aromatizatur cinamomo & spica.

In aqua lib. octo coque primū radices nostrates, deinde semina, post herbas, postremo pyrethrum, & aromata. Costū, asarū, casia, cardamomum, calamū aromaticum, m. ph. ubi librę quatuor supererūt, fiat ut in ceteris, & cū sacchari & mellis ana lib. v. a, & dimidia percoquatur. ut sit efficacius, quāvis plurima multum amara recipiat, pauco melle & saccharo dulcoratur, persicariam astringentem & frigidam quę maculato est folio nonnulli miscent: ego autem acrem & non maculatam vsurpandam censeo, ut acris & menses mouentia sint omnia nulla temperantia.

Syr. cichorii ex Gulielmo Placentino, recipit cichorii manipulos duos.

Foliorū buglosi vtri usq; lactuca, cichorii hortēsis, oxalydis, violę nigre, sereneos tricatirę ana manipulū vnū, rhabbari drach. duas.

Herbę, trita coquatur in lib. duabus aquę ad partis tertię consumptionem, colētur. Adde expresso sacchari lib. duas, clarificetur, & iterū coletur, reddatur igni, adde rha barbarū pulueratū panno lineo ligatum, & sæpe confrica, donec syrupus erit percoctus.

Syr. cichorii alter ex Nicolao Florētino, recipit intybi satiuī & erratici ana manipulos duos cucurbitę, lichenis, lactucę syluestris, & satiuę, fumaricę, lupulorum, ana manipulum vnū, hordei integri, halicacabi ana vnc. quatuor, glycyrrhizę, adianti albi & nigri, & vulgaris, asplenii cassuthę, ana drach. sex, radicū feniculi, apii, asparagi, ana. vnc. duas, coque in aqua sufficienti, cola, cū saccharo clarificatum & rursus colatum percoque in syrupum confricādo in eius libris singulis rha barbari, drach. quatuor, panno raro ligatas cū spice nardi scriptulis quatuor. Dantur vncię tres cum emulsione seminum quatuor frigidorum maiorum.

Hi duo syrupi hepatis obstructionibus, & intemperaturę calidę destinati, quia nominibus barbaris & nemini intellectis constant, pelagus opinionum pepererunt. Nam endiuia syluestris & domestica, taraxacon, batissolere, scariola, cichoriū, quid apud hos sit barbaros nunquam possis ex ipsorum scriptis didicisse tam sunt ea plena, crassa ignorantia. Propterea mihi videtur satius cum cichorij seu seridis genus omne eadem sit facultate, cichorium autem quod sylvestre est stomacho vtilius & efficacius sit, ut syrupus hic ex solo fiat cichorio, aut cichorij succo, sed largiore, ut sit simplicissimus, cui si ad pompam voles alias seridis species miscere, & lactucam satiuam & agrestē & fohelum vtrunque, & hieracium vtrūque, & chondrillam luteā ac ceruleam, & si quid aliud tam satiuū quā agreste lacteū est, ac cichorij generis, nihil repugno, modo tam non sis anxius in harum vocum barbaris cum te corruptarum inquisitione. Affluere igitur vocibus Dioscoridis, nec te afflicta desiderio barbararum vocū, quę quid significēt ne ipsi quidem qui hos syropos scripserunt, nec ipsorum alius quisquā vnquam pernouit, aut certo definiuit.

Endiuia (quod nomē ex intybo corruerūt) barbaris est quę lactuca sylvestris Dioscoridis videtur. Thuscis autē vulgo endiuia est intybus, seu seris, lato folio: scariola vero ex seride etiam deprauatum est, intybus est satius angustifolius.

Taraxacon seu altaracon, etiam Gatinarie aut cichorium est, aut dens leonis seu cichoriū erraticū, latifolium Plinio dictum. Batissoleris hermolao corruptum videtur ex baptisecula quę illi cyanus est, ruribus sic dicta quod seculā, id est, falcē messoriā remouetur. alij malunt batissolerem esse serim, i. cichorium quoddam erraticum, in tritico frequens flore cyanum referente, quibus magis accedo.

Alius simplicior istos est in usu.

Idem plarisque fit simplex ablato rhabbaro.

Lohot.

E CLEGMATVM seu lin&uū materiæ fere sunt Mesuę partes plantarū. Radices, vt glycyrrhizæ, scillæ, iridis, bryoniæ, allij, ari, dracōtij, canaæ vñt, quod spodium Arabibus dicitur.

Herbæ, hyssopus, prasium, adiantū albū, calamynthæ, brassica. Flos croci. Fructus, vuę passę, ficus passę, dactyli, myxa, zizypha, capita papaueris albi. Succi radicum, glycyrrizæ, scillæ. Succi herbarū, brassicę, prasij, fœniculi, cannarum sacchari. i. saccharū, & ex hoc penidia, mel.

Succi fructuum, mororum, batinorū, nucum, myrtarum, pulpa cassiæ, sapa.

Gummi, tragacanthi, arabicum, myrrha.

Semina, papaueris albi, & inde syrū, psyllij, cydoniorū, malucę, melonū, cucumeris, citreoli, amygdalę dulces, amarę, strobili, auellanae, lactucę, portulacę, lini, fœnigreci, fœniculi, anili, nasturtij, amylum, farina fabarum.

Cortices cinamomū, & alijs cortices, radices capparis, tamaricis, ellebori, petroselinij, &c. Præter hæc aqua cui multa horū infunduntur, incoquantur, & ex animalibus pulmo vulpis, butyrum.

Ex his radices & herbæ teruntur si sunt siccæ, vel aqua incoctæ & tritæ, & cretę alijs miscentur, spodium ducendo friatur.

Fructus purgati teruntur, cernuntur: sed dactyli intus & foris purgati ante decocto thoracico aliquo macerantur: capita papaueris albi macerantur, coquantur, exprimuntur, abijciuntur.

Succi omnes ferè hoc loco liquidi sunt, & ob id pròptè miscentur: glycyrrhizæ autem succus, vel dissoluitur, vel in taleolas scđus, inter papyros siccatas, aut aliter calcas, scilicet aliquoties pistillo & mortario teritur.

Gummi teruntur calfactis pistillo & mortario si est siccatione opus, vel in muccaginem soluantur.

Semina si maiora sint, depellata cultello inciduntur, vt amygdalę, strobili, pistacia, auellanae, fabæ, melonum, cucumeris, citreoli, si parua puluerantur, & si vis horum quędā vt papaueris post inciduntur, ex alijs etiā muccago extrahi, & reliquis misceri potest, vt ex semine lini, fœnigreci, cydoniorum, psyllij.

Huius verò tempestas eclegmatū materiæ magis sunt penidia, pilulę albę, bechicę, electarium, vel pulueris & diatragacanthi fri. diairis simplicis, & Salomonis diacalaminthes, diahyslopi, diaprasij, saccharum candefactum, succus glycyrrhizæ, cassia cum syr. adianti, glycyrrhizæ, zizyphorum, vel alio thoracico magis & minus calido, tergēte incidente, pro medici indicationibus. Quibus misceri possunt etiā alia simplicia prius dicta dulcia, amara, acria.

Tamen ex veterum eclegmatīs hodie quidam retinent eclegma sanum, ex pulmone vulpis, diacodion, diamoron, diacarion. De quibus quia est abunde nobis dictū sectione tertia Mesuę, frustra hic repetenda non fuerunt.

Sunt etiam qui compositum hoc medicamentū eclegma cassiæ pro enematibus vocant, & sic parant. In libavna decocti violarum, malucę mercurialis, betæ, parietarię, absynthij coquant mellis lib. dimidiā, & sub finem iniiciunt pulpæ cassiæ fistulę purgatę libram vnam.

SECTIO QUARTA.

S ECTIO quarta de apozematibus, & infusis est: quia tamen horum nullum hodie in vsu est, satius fuerit si quem vtendi cupiditas cœperit, Mesuę consilire. Quæ autem infusa & apozemata in rem præsentem hodie facimus, longe sunt ab illis diuersa, & tam paratu facilia, vt vel puero perspicua sint. Quapropter de his superfedere malui quàm parum necessaria, etiam intelligentibus inculcare, præsertim cum statuerimus aliquādo dare typographis commentarium quendam nostrum de remedijs medicis omnibus sumendis, & adiuuendis: inter quę multa congerimus exempla apozematum, & infusorum hæc ætate consuetorum, quæ ad medicum magis quàm ad pharmacopœum pertinent.

ECTIO quinta de antidotis seu electarijs quorum materię ex omni medicamentorum simplicium genere petuntur. Hęc formis quatuor pręcipue parantur, sicca seu puluere, melle excepta, vel saccharo, vel alio humore.

Quoniam verò pulvis horum est materia reliquarum trium formarū de puluere prius mihi fusius dicendū, quoniā hic vario fit modo, vt mox audies.

Vt autem planius intelligas, pauca quędam capita ex tritura ratione mihi sunt leuiter perstringenda, ne in compositionibus singulis hęc sint inculcanda.

Teruntur primum radices acori, cyperi, costi, phu, gętiane, glycyrrhizę, mei, zingiberis, & similia, & interdum coquantur, si electarium pręsertim molle est futurum, sed ante leuiter fractę.

His mediocriter tritis semina fęniculi, apij, petroselinj, anisi, dauci, ameos, seseleos, amomi, cardamomi, & similia adduntur.

Semina autę cucumeris, cucurbitę, melonis, citreoli, cnici, vt nuclei pinci, amygdalę inciduntur cultello per se, aut etiā saccharo pauco, ne pinguescant adiecto.

Postea herbę siccę, casia, cinamomū, aspalathum, calamus odoratus, caryophylla, spica nardi, schęnuanthos.

Postremo flores rosarum, croci, epithymi, forpicius antę confecti.

Vuę, daętyle & similes fructus, vel per se triti cernuntur impulsu manuum, aut cochlearis, vt casia, tamar Indi: vel secti cum siccioribus teruntur.

Bdellium, popanax, hanumoniacum, opiū, myrrha, vino, melle, vel alio humore soluntur, vel parua portione cum alijs siccioribus multis teruntur minutim prius secta, sicos cordis cerui, rasura eboris. Turbith modice quassatū vbi erit in diaphęnico, electario Indo vtroque & similibus, tunc sicciora miscęantur zingiber, piper & similia, vt puluerari possit. Nam per se latefcit non pulueratur si sit legitimū. Quę industria scęmonio, opio, & liquoribus, gummis, resinis terendo latefcitibus confert: vel pistillo & mortario calfactis illa siccare: sed id multum virium a medicamento digerit.

Terenda pręterea tenuissime calida cum vrinas mouere studemus, vt thymum, asarū, cyminū, vt in aurea, athanasia, esdra, hęmagogo, diacurcuma, dialacca maioribus & aromatico: crassius verò cum purgare studemus, vt in antidoto hamech vtraque in electario Indo maiore.

Per se teruntur rha barbarū, scammonium, nisi quod oleum amygdalarum dulcium vtriq; a quibusdā miscetur, & postrema miscetur ac ē propinquo, & clemęter ne euolent, aut exhalent. Seorsum quoque thus nasculū, myrrha, mastiche, succinum, gummi Arabicum, tragacantha, moschus, caphura, ambra: sed hęc tria ferē cum pauca aqua rosarum, & postrema miscetur etiā ē propinquo. qua ratione rha barbarum, & scammonium. Priora autem minutim secta mortarium siccior postulant, vt euphorbium, styrax, calamites, sal gemma, sericum, anacardi etiā per se terantur.

Vniones, corallium vtrunque, lapidum pretiosorum fragmenta in mortario lapideo vel æreo primum crassius teruntur, postea super marmor porphyriū, vel alium lapidem durissimum ducendo friantur, affusa identidem pauca aqua rosarum, aut buglosi.

Lemnija terra, vt bolus armenia per se est friabilis, & humore aliquo soluta mox liquefcit modo calcis.

Multa alia huc pertinentia ex modo componendi theriacę scripto nobis lib. 4. methodi medicamenta componendi possunt huc trāsferri, quale est illud quod mortarium in quo prędicta omnia teruntur, & cętera alia, pręsertim pretiosiora, est tegendū, etiā duobus operculis, ne quod est tenuissimum exhalet ac euolet, eadem ratione quod iam est cretum curiose inuoluatur. Si electarijs succi, vel humida alia adscribuntur, tollenda sunt si hęc sicca & puluere seruaturus es pyxidibus vitreis, vt ferē hodie fit: si verò electarium formare libet molle, sunt vsui quę forma veteribus magis placuit. nā quę hodie est electarij siccij, & solidi forma, minus est vsu frequens, nisi ad palati gratiam.

Si etiā daętylos, vuas, ficus recipit medicamentum, tollantur, si puluerem vis, nisi pauca cum magna siccorum copia puluerari posse videantur, si autem electarium molle conaris, purgentur, secentur, terantur, cernantur, & alijs miscantur.

Si puluis ante electarij solidi compositionē amygdalas, strobilos, semina frigida maiora, & similia recipit. Hęc vtendi & electariū parandi tempore miscantur, quia diebus paucis rancida sunt, & compositum vitiant.

Pulueris vncia vna vel etiam drach. sex vni librę sacchari fere miscentur in electario solidior: sunt qui parcius iniiciunt, non vt gratus sit electarium, sed vt ipsis cõstet minoris, presertim cum preciosa recipit, vt electarium de gemmis, diambra, exhilarans.

Pulueris vero vncię tres fere traduntur librę vni mellis despumati: sic tamen vt saccharum, penidia, daçtily, amygdalę, strobili, & similia, pulueris appellatione tunc non veniant. Mel tamen crudum quadruplum omnium puluerũ miscet. Mesues in antidoto dia moschu. Cum vero pulueres misceretur, sit mel tepidum adeo, vt digitos admittat mel ipsum vel fundum sartaginis, quę mortario vel alterius manibus firmata sit oportet, quando pulueres pistillo ligneo sunt commiscendi. Id quod etiam seruandũ est, si electarium solidum es facturus, quod primum in offas mazę modo cogunt, deinde manibus & pistillo ligneo super papyrum purum complanant in flaminicę placentę figurã, mox cultello secant in buccellas, & tessellas, nunc rhomboides, nunc quadratas, nũc triangulas (quas lozengas vocant) nũc longiores digitorum forma quas ob id manus Christi vulgus vocat. Quibus præterea pondus circumscribunt, vt drach. vnius vel plurium.

Porro in antidotis mollior, vt catholico, diapruno, antidoto, hamech cum cassia & tamar Indi, cum humore aliquo soluta cernuntur, tamar Indi ante per horam sunt macerandi quę cernantur, vtręque vero antequam soluantur, humor est pendendus, vt intelligas an cum eopondus iustum tamar Indorum & cassię postquam creuisti, retinueris. Eodẽ modo in manna & alijs eiusdem generis, quod etiam in pilulis seruadũ audies, dum lachrymas humore solutas cernes, aut colabis.

Antidotus diambra Mesuę recipit cinamomi, doronici, caryophyllorum, macis, nucis moschatę, folii, galagę ana drach. tres, spice nardi, cardamomi maioris, & minoris ana drach. vnam. zingiberis drach. vnã & semissem, fantali flauı, ligni aloes, piperis longi ana drach. duas, ambrę aureum vnum, moschi drach. dimidium. Ant. de gemmis Mesuę recipit fragmentorum saphyri, hyacinthi, sardinis granatorum, smaragdi ana drach. vnam & semissem, zedoarię, doronici, macis, corticis citri, sem. ozimi caryophyllati, ana drach. duas, corallii rubri, succini, limaturę eboris ana script. duo been albi & rubri, cariophyllorum, zingiberis, piperis longi, spice, folii, croci, cardamomi minoris ana drach. vnam, trochiscorum, dia rhodon, ligni aloes, ana drach. quinque, cinamomi, galangę, zurumbet ana drach. vnam & semissem, foliorum argenti & auri ana aureum dimidium, moschi boni drach. semissem, ambrę drach. duas.

Ambra moschus per se terantur, corallium & preciosi lapides, aut per se singuli, aut omnes simul quo dixi modo, cætera simul terenda, sed ordine seruato.

Ant. exhilarans Galeno adscripta recipit apud Nicolaum, succi pomorum dulciũ & odoriferorum, succi cydoniorũ, succi florum borraginis, & florum basilici.

* seminis
alij.

Vini veteris

Croci, macis, zedoarię.

Xylobalsami, caryophyllorum.

Corticis citri, galangę.

Nucis moschatę, styracis calamitę,

Caphurę, ambrę, moschi ana drach. vnã, anisi, thymi, epithymi, rasurę eboris ana drach. duas, margaritarũ, ossis à corde cerui ana drach. vnam, auri & argenti puri ana script. vnũ, sacchari quantũ sufficit.

} ana drach.
} qui nque.

Antidotum hanc non esse Galeni plane conuincunt macis, zedoaria, cariophylla, galanga, moschocarion, caphura, ambra, moschus, simplicia Galeno ignorata, & ebur, margaritæ, os à corde certui, aurum, argentum, saccharum, sumi nondum cepta Galeni seculo, aut saltem infrequentia. Saccharum cum succis coquendum, cui percocto & refrigerato pulueres miscendi sunt.

Sacch. lib. 7. in aqua dissolutæ & coctæ, additis ad postremum his succis coquantur quantum satis est ad comprehendendas vncias circiter septem huius pulueris. Electarium ætificans Nicolai Alexandrini ab hoc est diuersissimum.

Hi pulueres tres antidotorum præcipue nobis sunt in vsu, quâuis Mesue & Nicolao humore aliquo excipiantur in electariis molle, ut nobis tempore vtendi. In electariis solidis saccharo per humorem idoneum, sed paucis soluto percocto, ut pulueris vncia una habeat sacch. vnc. 12. vel pul. horii iuribus & codimicis miscetur. Præter hos autem alii, quia vsu rari à nobis consulto præmittuntur, præsertim ea fusius in Mesue & Nicolao interpretatis, vnde poterit pharmacopœus corrogare, si quando parare imperetu. Tales sunt antidotus diacalaminthæ, diatrion, pepereon, diospoliticus, diaphysopu, diasenne, diacostu, diaris Salomonis, diapenidion, diacomeron, diatragacanthum calidum, diamargariton calidum, alia eius generis permulta.

Nunc de antidotis dicendum quæ ob id opiata vocantur, quod harum multæ opium recipiunt, quibus aliæ consentientia similes nomen idem vulgo sunt sortitæ.

Antidotum catholicum Nicolai, Galeno adscriptum, recipit folliculorum fennæ, cassiæ fistulæ purgatæ, tamar Indorum ana vnc. octo, rha barbari, violarum, polypodii, anisi ana vnc. quatuor, glycyrrhizæ, rasæ, penidiorum, sacchari candefacti ana drac. quatuor, seminum quatuor frigidorum, purgatorum ana vnc. vnam. Polypodii * alterius libr. vnam, tritam, in aqua coque diu, colatum percoque in syrupum cum libris octo sacchari. Cassiam & Tamar Indos in colati parte dissolue, cola, syrupo iam percocto adde, postremo pulueres adice.

Senna, polypodii, glycyrrhizæ, anisum, violæ simul terantur, rha barbarum per se, * semina. 4. frigida maiora excorticata scapello minutim cōcidantur cum saccharo & penidijs, ne pinguescant. Cassia & si recentes sunt tamar Indi per se cernantur potius, quam cum decocto, portione soluantur, ne sint ad accepti humoris consumptionem coquenda. * Vbi ex decocto polypodij syrupus erit percoctus, & ab igne depositus, iam modice refrigerit, cassia & tamar Indi creta parte syrupi dissoluantur, mox syrupo miscantur, postea pulvis prædictorum, postremo rha barbari & concisa semina paulatim addantur pistillo ligneo probe permiscendo. Si vero cassiam & tamar Indos decocti portione, ut vnc. duabus solueris & colaris, prope percocto ipsi syrupo miscantur, ut eodione acceptum humorem deponat. Hodie sunt qui delicatius, & efficacius componunt, sed sumptuosius. fennæ enim vnc. sexdecim in libris quatuor, rha barbari vnc. octo, in libra dimidia decocti radices polypodij infundunt, fenne expressum cum sacch. coquant in electarij prope consentientiam, expressum rha barbari miscant paulatim extra ignem, deinde cassiam tamar Indos creta & pulueres.

Diaprunum simplex Nicolai recipit pruna Damascena maturata centum. Hæc aqua ad dissolutionem percocta vbi modice refrigerunt, exempta inde & manibus confricata per cribrum cernuntur, cortices & ossa abiiciuntur. Aqua hæc cum dimidia vncia violarum recocta * cum sacchari libris duabus in syrupum percoquitur addendo pulpæ prunorum prædictæ libram vnam. Hæc vbi coquendo crassescere incipient, cassiæ recenter extractæ, tamar Indorum ana vncia una in portione parua prædictæ aquæ dissoluatur, coletur, admisceatur, semper spatula mouendo. dum perfecte omnia hæc erunt cocta, aufer igni, & adde spatula semper miscendo pul-

Ponderibus variat Nicolaus Alexandrinus, ex quo salernitanus expressit, nec Galeni meminit. * recentes, à quo tantum humiditas excrementi exhalant aque lib. 12.

ad lib. 4. cōsumptione. * nihil tñ tenuiss, quia purgatoriū est medica mentū non vreticum.

* Si vero tamar Indi decocto soluuntur, id pēden dū, vt intelli gas si cretonum tamar Indorum pondus quæriti habes.

Diadama - scenon dicitur Nicolao Alexandrino & viridia damascena eligit.

* & colata. Vel potius si potes sine humore cernendo purgatur, vt in catholico dixi.

Nicolaus
Alex. scāmo
nii drach. se
prem in lib.
singulas mi
sct.

uerem sequentem fantali albi, & rubri spodii rha barbari ana drac. tres: rosarum, violarum, feminis portulach, intybi, oxyacanthæ, succi, glycyrrhizę, tragacanthi ana drach. duas: quatuor feminum, frigidorum maiorum purgatorum ana drach. vnam. Si vero purgatorium vis medicamentum ab igne vbi abstuleris, adde scammonii præparati vnc. dimidiam in libras singulas.

Sunt qui scammonii drach. sex alij, vnciam vnam miscent libris singulis, sicque nescientibus medicis imponunt. fit enim, vt medicamentum valentius purget, quod tamen clemētius existimabat medicus instituisse.

Ant. diaphœnicon Mesuæ recipit phœnicon cirrhon, id est dactylorum fuluorum aceto per triduum maceratorum partes centum, penidiorum cum aqua hordei coctorum partes quadraginta, turbith partes triginta quinque, amygdalarum purgatarum partes triginta, scammonii partes duodecim: zingiberis, piperis longi, cinamomi, macis, galangę, ligni aloes, foliorum, rutę siccorum, anisi, fœniculi, lauci ana partes duas & semissim. Probe trita hæc omnia melle despumato excipiantur.

*(nā largi
ante triturā
effundendū
facultatis da
ctylorū ali
quid secum
trahit.

✧ sunt enim
pulueris vnc
ie nouem si
drach. partē
accipis.

Dactyli intus & foris purgati quo sunt sicciores, eo diutius & largiore aceto sunt macerandi quo recentiores & humidiores, minus diu & parciore aceto macerentur. Quin si præhumidi sunt, citra macerationem teri possunt aceto pauco interim affuso: fere autem nobis sunt passii, purgati igitur, & particulatim se&ti aceto parciore * sine igni macerentur, triduo in vase siliceo, vel vitrato tecto, pistillo ligneo in mortario lapideo curiose terantur, manu cernantur per cribrum setaceum, vel stamen, vt reliquę pelliculę eximantur. Potes cum his amygdalas depellatas terere & cernere, aut cultello, minutim concidere, vt & nucleos pineos (quos nonnulli penidiorum loco adhibent) sed cum pulpa dactylorum ad acetum consumptionē sit parum coquenda amygdalę pinguescerent, ob id melius inciduntur & cum puluere reliquo miscentur. Mellis lib. sex aqua dupla despumatæ dū aqua cōsumpta ad libras tres * redierint, & cydoniati liquidū consistētiā habeant, dactylos misce, parum diu coque, vt acetum exhalat. Quidam saccharo excipiunt in electarium solidū, vt & diacnium benetamen coquatur, & loco sicciorē reponatur, ne rancidū fiat. Nicolai Alexandrini diaphœnicon carniū dactylorum drach. centum recipit, cætera multum ab hoc diuersum est.

Hodie me
lius expref
sum cū sac
charo in sy
rup. perco
quitur & re
frigerato mi
sctur casia
& tamar In
di cretę cum
parte deco
cti, postea
penſi & scā
monium co
ctum.

Ant. hamech apud Mesuē, recipit myrobalanorum flauarum vnc. quatuor, cepularum Indarum, rha barbari ana drachmas duas, agarici, colocynthidos, polypodii querni ana drach. sexdecim, ablinthii, thymi, fennæ ana vnc. vnam, violarum drach. quindecim, epithymi vnc. duas, anisi, rosarum, fœniculi ana drac. sex, succi fumarigę lib. vnam. pruna numero sexaginta. vuarum purgatarum vnc. sex. macera omnia fero lactis dies quinque in vase vitrato, oris angustii, obturati. Post hos semel feruefac, cola, in colato dissolue casię fistulę purgatę vnc. quatuor, tamar Indorum vnc. quinque, mannę vnc. duas, frica manibus, iterum cola, colato adde sacchari lib. vnam & dimidiā, scammonii vnc. vnam & dimidiā, coque ad mellis crassitudinem, tunc paulatim puluerem hunc insperge, Myrobalanorum flauarum, cepularum Indarum ana vnc. dimidiam, bellericarum emblicarum, rha barbari, feminis fumarigę ana drach. tres, feminis, anisi, spicę nardi, ana drach. duas.

Polypodium, fenna, myrobalani, anisum crasiuscule teratur, agaricus raptim minuatur, colocynthis, rosæ, thymus, epithymus, absinthium, minute forpicebus incidantur, rha barbarum cultello: vel forpice in taleolas. pruna, yuae intus purgantur: violæ integræ, agaricus, rha barbarum, colocynthis cum cæteris: quinque dies macerentur succo fumarie, residetia, & insolatu etiam post vnam feruefactionem purgato, & sero lactis colato quantum omnia tegat, ut libris tribus: sed agaricum, & colocynthidem nodulo ligare præstiterit. Sexto die id totum leuiter coquatur, coletur mediocriter exprimendo. (Fortis enim expressio ex materia illa macerando & coquendo velut putrefacta terreum quoque extrahet.) Colati portione idonea dissolutam cassiam & tamar Indos, alia portiuncula mannæ coctio ex reliqua colati parte syrupo, cum sicchari lib. vna & dimidia misce, minimū coque: his enim coctio longior, aut vehementior vires adimit. quapropter ne omnino coquantur, quidam sine humore purgatam cassiam, & tamar Indos percoctio & tepenti syrupo miscent, quo scilicet tempore adduntur pulueres aliorum & scammonium coctum. Serum sit lactis caprini recens multum, & in rem præsentem coagulati immisso semine cardui beatæ Mariæ contracto. Eius feri lib. sex semel feruefiant, albuminibus duobus purgantur: ubi refrixerint, colentur: aut si celerandum est, ter colabis etiam calidum. Capræ autem nigre & excornis serum hic quidam expetunt, ut lac præfici ad calculum frangendum.

Ant. benedicta Nicolai recipit turbith electi, sacchari ana drach. decem, scammonii cocti, hermodactylorum rosarum ana drachmas quinque, caryophyllorum, spice nardi, zingiberis, croci, saxifragiæ, macropiperis, amomi, cardamomi, feminis apii, salis gemmæ, galangæ, macis, cari, sceniculi, sem. asparagi, rusci, lithospermi ana drachmam vnam, mellis quantum sufficit.

Turbith, scammonium, hermodactylos trita negligentius, ut purgent magis: reliqua tenuius, ut in corpus magis feratur, ex tritura disciplina recte quidam volunt. Turbith, esula, sacchari ana drach. decem, scammonij drach. quinque quedam exemplaria habent, cum esula in Nicolao Alexandrino taceatur, in eodem scribitur turbith saccharique ana drach. viginti scammonij drach. decem, sed reliquorum omnium ana drach. duæ quæ poudera omnia dimidio diminuit Nicolaus Salernitanus. sunt qui etiam scammonij drach. duas, alij drach. duas & semissem miscent.

Hiera picra, id est sacra amara Galeni, recipit cinamomi, mastiches, asari, spice nardi, xylobalsami, croci ana drach. sex: aloes drach. centum, mellis quantum sufficit.

Sic Galenus Romæ componi solitam suo tempore scribit: & aloen, nunc lotam, nunc illotam, nunc largiorem, nunc parciorem miscendam pro varijs medicorum scopis: & croci sufficere drach. quinque. Plura de hac antidoto leges in Mesue.

Ant. hiera diacolocynthidos Pactii recipit stœchados, marrubii, chamædryos, agarici, colocynthidos ana drachmas decem: opopanacis, sagapeni, petroselini, aristolochiæ rotundæ, piperis albi ana drach. quinque, cinamomi, spice nardi, myrrhæ, polii, croci, ana drachmas quatuor. Opopanax & sagapenum mortario teratur adiecto melle tenui, id est quàm liquidissimo: trita cætera & cribrata melle ad comprehendendum sufficienti excipiantur.

Quæ ad hanc hieram hodie celebrari ceptam magno mortalium commodo pertinet, fusissimè in Mesue docuimus. Si puluerem & siccam hieram cupis, liquores fractos purgatos alijs particulatim iniectos, cum his puluerantur. Si autem vis electarium molle, liquidissimo melle dissoluti colantur.

Ant. Philonis recipit piperis albi, hyoscyami albi ana drach. viginti, opii drach. decem, croci drach. quinque, spice, pyrethri, castorei ana drachmā vnam, mellis despumati quadruplo omnium exci-

Scriboni
largus.

pe. Addunt aliqui moschi scriptulum vnum.

De philonio Romano & Persico Mesuem, mihi satis est hec veterum descriptio. In hac antidoto pulueris vncie tres mellis lib. singulis misceantur, vt in alijs plurimis, à Philone Iudeo philosopho Platonico doctissimo, vt scribit Nicolaus Alexandrinus, dicta

Ant. de baccis lauri Rasi recipit foliorū rutę siccorum drach. decem, seminis ameos, cumini, melanthii, ligustici, origani, cari, dauci, amygdalarum amaram, piperis nigri & longi, methastri, acori baccharum lauri, castorii ana drach. duas, opopanax drach. tres, sagapeni drach. quatuor, mellis cocti pondus omnium, tritis terendis fac electarium molle.

Hoc electarium pilularum consistentiam habebit ex tam paucis melle, nisi sagapenum & opopanax alio melle liquidissimo dissoluantur & colentur, vt in hiera diacolocynthidos. Hoc die mel pulueribus quadruplum misceat, sed puluerum nomine opopanax & sagapenum non censent, sic est gratius, sed imbecillius.

Diacar-
thami.

E. diacnicum Arnaldi villanouani recipit pul. E. diatragacanthi frigidi vnc. semissem, carniū cydoniorum vnc. vnam, medullę cnici, hermodactylorum ana drachmas quatuor, zingiberis albi drach. duas, scammonii cocti drachmas tres turbith albi drach. sex, manne, granatę drach. duas, mellis rosati colati vnc. vnam, sacchari vnc. octo cum saccharo sufficienti fiat electarium.

Caro cydoniorum siue cydonia in partes. 4. plures pauciores diuisa, & vt sunt integra saccharo condita terantur, & per stamen colentur, cuius loco si cum nostratibus cydoniatu capias in drach. eius duabus vna erit sacchari, aut mellis drach. vel etiā largius. Tunc vero id vt manna melle rosato soluta colatur per stamen, semen cnici excorticatū, vel inciditur vel cum saccharo teritur, & pulueri turbith, hermodactylorū & zingib. simul tritorū miscetur, scammonium verò per se. Vbi saccharum paulo vltra quā electario conuenit est coctum, (quia liquida mox addenda ipsum vt sic dicam recrudabunt) adde cydonium, mannā, mel rosatum simul trita & colata. Sunt qui pul. diatragacanthi omittunt, & cydoniatu cum melle subactum immitunt in sacchari lib. vnā percoctam cū aquę vncijs 4. vel sex, si impurius est saccharum, & ob id despumandum, postea pulueres reliquos, Alij aliter.

Elec. de succo rosarum Nicolai recipit sacchari, succi rosarum rubrarum perfectarum ana lib. vnam vnc. quatuor santalorum arborum & rubrorum & citreorū ana drachmas sex, spodii drach. tres, scammonii cocti drach. duodecim, caphurę script. vnum, ad excipiendum succus cum saccharo in syrupum percoquatur.

Cui misce santala & spodium puluerata, postremo scammonium & caphuram, vtrumque per se tritum.

Cum Mesue sit solenne vncijs singulis compositionum scammoniatarum dare scammonii cocti circiter scriptulum vnum, hic Nicolaus dat propemodum scriptula duo, ob id recte quibusdam videntur scammonii drach. octo huic composito sufficere, tamen etiā drach. duodecim scribit Nicolaus Alexandrinus cap. 309. lib. de compositione medicamentorum secundū locos, ex quo Nicolaus Salernitanus & alter Nicolaus prepositus sua descriperūt. Sue eo pariori commodius fiet. Alij etiam componūt s. rosatum colagogum Mesue.

E. diarhodon abbatis Nicolao recipit, santali albi & rubri ana drachmas duas, & semissem, tragacanthi, gummi arabici, spodii ana scripta duo, asari, mastiches, spice nardi, cardamomi, succi glycyrrhizę croci, xylaloes, caryophyllorum, gallię moschatę, anisi, marathri, cinamomi, rha barbari, seminis basilici, oxyacanthes, cicho-

rii, portulacæ, cucurbitæ, cucumeris, melonis, citreoli, ana scriptulum vnum, margaritarum ossis à corde cerui ana scriptulum dimidium, sacchari candefacti, rosarum ana vnciam vnam, drachmas tres, caphuræ grana septem, moschi grana tria & dimidium, confice cum syrupo facto ex aqua rosarum.

Puluis huius vt aliorum vitrea pyxide operculata seruetur, & vtendi tempore excipitur syrupo rosato percolato. Vel sacchari delecti lib. vna dissoluitur, libra dimidia aquæ ex rosis albis recentibus destillatæ, vel rosarum siccarum decocti, vel succi rosarum rubrarum recentium, & coquitur ad iustam crassitiem. Vbi refrigerando iam multum concreuit, pulueris prædicti drach. sex iniiciuntur, raro plures, & curiose pistillo ligneo, vt prædixi, miscentur: semina quia cito rancescunt & cetera corrumpunt, misce tantum vtendi tempore. Moschum plerisque abominabile, & cephalagicum, ne misce, vti neque caphuram, nisi doctus est medicus qui imperet.

E. aromaticum rosatum Gabrielis apud Mesuem recipit rosarum rub. drachmas quatuordecim, glycyrrhizæ rasæ drachmas septem, ligni aloes, santali flauo ana drach. tres, cinamomi drachmas quinque, macis, caryophyllorum ana drachmas duas & semissem, gummi Arabici, tragacanthi ana drachmas duas, & partes duas drachmæ vnius, nucis moschatæ, cardamomi maioris galangæ ana drach. vnam, spicæ nardi, ambræ cineritiæ ana script. duo, moschi scriptulum vnum, syrupi rosati quantum sufficit.

E. Diamargariton frigidum recipit santalorum omnium florum violarum, feminis melonum excorticati, trochiscorum diarrhodon ana drachmas duas, serici crudi ossis à corde cerui, spodii, doronici Romani. been albi & rubri, spicæ nardi, croci ana scriptula duo, margaritarum integrarum & pertusarum, rasuræ eboris, saphyrorum, hyacinthorum, smaragdorum, iaspidium viridium, ligni aloes, feminis intybi & oxalydis, ambræ cineritiæ ana drachmam semissem, auri optimi drachmam vnam, caphuræ scriptulum vnum, moschi grana duo.

Alter Nicolao, aliter alijs, sed hoc nobis est in vsu frequentiore.

E. diatrionfantaloni Nicolai recipit, santali albi, rubri, flauo, rosarum psyllii ana solidos duos, rha barbari, spodii, succi glycyrrhizæ, feminis portulacæ, ana solidum vnum & dimidium, amyli, gummi Arabici, tragacanthi, feminis melonis, citreoli, cucumeris, cucurbitæ, cichorii domestici ana solidum vnum, caphuræ scriptulum vnum, & dimidium, syrupi rosati quantum sufficit, alii pondus rosarum quadruplum miscent.

Dimidium est descriptionis Nicolai Alexandrini, nisi quod saccharum habet pro psyllio, & cichorii domestici non meminit loco syrupi: fit cum saccharo in aqua communi aut rosata soluto.

E. Diatragacanthon frigidum Nicolai recipit, tragacanthi al- Spurium.
bi vnc. duas, gummi arabici vnc. vnam, drachmas duas, amyli vnc. vnam, penidiorum vnc. tres, glycyrrhizæ, seminum melonis, cucurbitæ, cucumeris, citreoli ana drachmas duas, caphuræ scriptuli se-

missim, syrupi violati, aut iulepi violati quantum sufficit.

Saccharo aqua communi vel rosara soluto excipitur hodie.

E. Diarix simplex Mesuæ recipit radicis iridis vnc. semissim, sacchari candefacti. E. diatragacanthi frigidi ana drachmas duas.

Saccharum aliud aqua rosarum soluitur ad hæc comprehendenda, libræ autem vni sacchari vnc. pulueris vnam capienti dum refrigeratur, si albumen oui vnus vel potius succi limoni dnc. suæ, fortiter & diu misceas, vtrunque hoc electarium euadet longe albisimū. Sacchari vnc. vna aqua rosarum soluta, cum margaritarum pul. tenuissimi drach. vna. fit manus Christi perlata vulgo dicta.

SECTIO SEXTA DE PILVLIS.

MEDICAMENTVM cur forma pilularum fingatur interdum, abunde diximus in Mesue, initio sectionis sextæ: hoc autem loco dicenda sunt quæ ad modum pilulas seu potius pilularum offas & magdalias componendi pertinent. Vt electaria humore aliquo egebant comprehendi præsertim mollia, sic & pilulæ & trochisci. Is autem est magna parte mel despumatum vel rosatum, syrupus rosatus vel similis, interdum muccago tragacanthi, ita vt omnino sit glutinosum, quod pilulas debet comprehendere, vt melius velut in mazam misceantur, & mista cohereant, ac ne simplicium facultas prompte exhalat, si offa siccitate interhiæt, sed intus probe conclusa melius fermentetur. Ob eam causam quas pilularum species aqua, aut succo vult comprehensionem sit percossus. Quod succo comprehensæ non cohererent, sed hordeaceæ, aut furfuracei panis modo prompte friantur, mox siccantur, & canescunt situmque ducunt putredinis indicem & authorem. Ob eam rem videtur Nicolaus pilulas sine quibus fœniculi succo exceptas manibus oleo rosato, aut communi inunctis formari, & nos alutam, aut pergamenam offæ inuoluendæ debitam oleo quoque oblinimus.

Si tamen in vsum præsentem fiant pilulæ, possunt succo excipi, quod in multis videntur scriptores innuisse, dum ciceris scilicet orobei, aut orobi, aut piperis magnitudine pilulas formandas imperant. Est tamen quando succi emplasticam efficiunt materiam, quando scilicet his emplastica alia soluntur, vt aloë, scammonium, sagapenum, hammoniæ, gummi arabicum, tragacantha. Tunc etiam pilularum massam recte comprehenderint.

Omnia in pilulis crassius terenda quàm in electariis, nisi quod vitrobique lapides preciosi, & congeneria tenuissime sunt pulueranda, & colocynthis ne partes quas permeat viceret.

Quæ vero lachrymæ, siue liquores suis, siue gumi, siue resinæ, si sunt adhuc molliculæ, pistillo calido, in mortario calido terentur & puluer abutur, aut humore idoneo dissoluerentur, vt alia capiât. De succis recensitis iâ diximus, de siccatis seu sapis idè iudiciū quod de lachrymis, interdū tamen prædictæ lachrymæ, si puræ sunt, pistillo calido in mortario calido humore pauco superdato subiguntur, fiuntque idoneæ pulueribus aliis comprehendendis, vt in pilulis fœtidis, sagapeni & similibus. Si autem sint impuræ, dissoluantur humore quæsito, colantur, coquuntur ad humoris consumptionem, pulueres tunc adduntur & permisceantur.

Magdalia seu offa, seu massa inuoluitur vbi siccata est quantum satis est, aluta, alba, potius quam rabra, vt vires illas infectricum materiarum pilulæ in se non trahant, aut pergamena, sed vtraque, oleo rosato, aut communi est ante subigenda, vt massam diu mollem teruet & transpirare vires eius prohibeat, obstructis oleo emplastico poris, non tamen ita quin humiditas, siqua adhuc superest excrementosa digeratur. In vsum autem non veniant pilulæ si potes, nisi iam fermentatæ, non tamen vetustate exuccæ, & exanimatæ: sed nec ita molles, vt in ore dissoluant, sed consistentia mediocri fiant, aut plures pauciores, maiores minores pro eius, qui sumit natura, & alijs medici scopis. Si autem deuorare nequit, minimæ fiant, & syrupo aliquo inuolutæ cochleari aliquo simul deuorentur. Alij ne ingratum earum saporem percipiant, syrupo remollitas saccharo tegunt. alij folijs auri æquius, quam nonnulli membrana prunorū, aut vuarum, aut cerato liquido. Nam carne prunorū, aut pomorum coctorum inuolui non magis prohibeo, quam pane missali in vinū merso. Os quoque ante & post abluui potest vino, aqua, alio, vt lingua hoc imbuta sapore tetrum non sentiat: & si quid ei hæserit, tergeatur. potest etiam vini loco pomi buccellam mandere & suc-

cum deglutire, aut aliud aliquid iucundum præsertim astringens. Sunt quoque qui os vino vel alio implent, & pilulam ori immittunt, cum vino illo deuorandam, idque toties repetunt, donec omnes deuorant: quod ad celeriores pilularum actionem facit, non ad diuturniorē, & ventriculū lædi pilularum præsertim durarū contactu vetat, & quibus friget ventriculus confert, ut quibus is aut hepar insigniter calet, cum pissana, vel humore alio deuorari possunt, manus etiā ligare, & eas ac nares aceto, aut frigida aut oxycrato madefacere est vtile. Quæ præcepta sunt communia etiam his qui medicamenta alia quauis forma sumperint, quando vomitus eorum timetur, Et præter hæc alia multa doctē à Mese descripta libro primo.

Pilulæ aureæ Nicolai recipiunt aloes, scammonii cocti ana drachmas quinque, rosarum, seminis apii ana drachmas duas, & semissem, anisi, fœniculi, mastiches ana drachmam vnam, & semissem, croci, pulpæ colocynthidos ana drachmam vnam, cum aqua infusionis tragacanthi fac massam.

Tragacanthi drach. vna aquæ vnc. duabus maceretur ad dissolutionem super cineres calidos coletur panno raro: hac mucagine paulatim affusa cōprehēde pulueres. hodie tamē syrupo vel melle rosato comprehendunt omiſſa tragacantha, neque mea sententia infelicitur, Aloes, scammonium, colocynthidis, mastiche seorsum quo sæpe dixi modo terantur, simul autē semina: rosæ, crocus, ambo hæc prius minutim concisa dimidium est compositionis Nicolai Alexandrini, in quo etiam mastiche non scribitur.

Pilulæ cocciaë Rasis & Mesuæ recipiunt, pulueris hieræ picræ Galeni drachmas decem, colocynthidis drachmas tres, & scriptulum vnum, scammonii drach. duas & semissem, turbith, stœchados ana drachmas quinque.

Syrupo vel melle, rosato excipe, turbith, & stœchas simul teruntur, cernuntur. Nam stœchas egræ teritur licet florulenta sit, nisi inter papyros siccetur ante quo modo etiam vis eius facile exhalat.

Alii ex Nicolao Galeni coccia sic parant, aloes, absinthii, colocynthidos, scammonii ana partem vnam, mastiches partem dimidiam, cum succo fœniculi vel absinthii vel solani, forma massam. Pil. Gal. ex aloes li. i. c. ph. p.

Nicolaus Alexandrinus Galeni non meminit, & vocat pilulas diacolocynthidos, hisque miscet aloes, scammonii cocti ana drach. quatuor, colocynthidos, mastiches ana drachmas duas, bdellij drach. vnam cum succo absinthii fac orobea catapotia.

Pilulæ sine quibus esse nolo apud Nicolaum recipiunt, aloes In Nicolao Alexandro non inuenio. lotæ drachmas quatuordecim, myrobalanorum, flauarum, cepularum, bellericarū, emblicarum, Indarum, rha barbari, mastiches, absinthii, rosarum, violarum, fennæ, agarici, casuthæ ana drachmam vnam. Temperentur scammonii bene trita & puluerata drachmæ sex & dimidia succo fœniculi, quantus scammonio per pannum colando, & pulueribus aliis ad pilulas comprehendendis sufficere videbitur, quæ manibus vinctis oleo violato vel communi, sed arte dicta loto formentur.

Senna, myrobalani, absinthium, rosæ, violæ, cassutha simul: rha barbarum, aloes, scammonium, mastiche per se puluerentur, licet autem succo fœniculi purgato parua coctione & residentia, in quo dissolutum sit scammonium comprehendendi possint, tamen fere scammonium per se tritum & cretum alijs pulueribus miscet, omnesque simul mistos excipiunt melle, cum quo succus fœniculi coquendo sit consumptus.

Succus absinthii sicca-
tus hodie
nō seruaf,
igne tamen
in rē presen-
tem sicce-
tur.
Hi trochisci
ex Mesue
sektionē. 7.
repetendi.

elephan-
gingē.

aqua sex-
tupla.

Mes. i aloē

* Aloes vnc.
sex seu selti-
bre dar ibi-
dē expressi
lib. vna, ergo
aloes vnc. 12
seu librę re-
cte da: expi
si lib. 2. vnc.
semissem
Melibidem

Pilulæ rha barbari Mesue, recipiunt rha barbari drachmas tres, succi glycyrrhizæ, succi absinthii, mastiches ana drachmā vnam, myrobalanorum flauarum drachmas duas & semissem, seminis apii, foeniculi ana drachmā semissem, trochiscorum dia rhodum drachmas tres & semissem, hieræ picræ drach. decem, forma cum aqua foeniculi.

Succus foeniculi, hic vt in alijs cū melle coquendo est consumendus, myrobalani, succi concisi simul terenda, rha barbarum, mastiche, trochisci per se.

Pilulæ aromaticæ Mesuæ, recipiunt cinamomi, cubebæ, ligni aloes, calami aromatici, macis, nucis moschatæ, cardamomi, caryophyllorum, asari, mastiches, schoenanthi, spicæ, carpobalsami ana vnciam vnam, absinthii sicci rosarum ana drachmas quinque, trita crassius coque ex aquæ libris duodecim ad partium duarum consumptionem, frica, cola, exprime. Expressi huius libris duabus macera libram vnam aloes, prius aqua pluuia sæpe lotam & siccata tribula, sicca. Illi misce myrrhæ, mastiches ana drachmas quinque, croci drach. x tres, omnia macera, reliquo expresso, tribula sicca.

Siccatur aloë primum in vmbra, post in sole Mesuæ cap. de aloë. Hæc vero omnia, vel seorsum quassanda, vel dura crassa cum duris crassis, mollia tenuia cum mollibus tenuibus, postea in aquam mittenda omnia hæc tantum contracta, vt promptius aqua permeet, & vires ipsorum in se trahat, macerantur, igni lento coquuntur ex aquæ libris octo ad dimidias (nam tam larga aqua longam postulat coctionem, quæ his aromatibus vires aut minuit aut adimit) reliquarum quatuor librarum dimidium aloë primum per se ebibet, prius tamen aqua fontana lota & siccata, reliquum dimidii cum puluere tenuissimo myrrhæ, mastiches, croci semel aut potius paulatim combibet eadem aloë, & priusquam siccetur, massa fingatur. æstare potius fiant, quàm parte anni alia, vt promptius siccetur aloë.

Pilulæ lucis maiores Mesuæ, recipiunt rosarum, violarum, absinthii, turbiti, colocynthidos, cubebarum, calami aromatici, nucis moschatæ, spicæ, epithymi, carpobalsami, xylobalsami, schoenanthi, mastiches, asari, caryophyllorum, cinamomi, casia, croci, seminis rutæ, anisi, apii, foeniculi ana drachmas duas, myrobalanorum quinque, rha barbari ana drachmas quatuor, agarici, sen-næ ana drachmas quinque, * euphrasie drach. septem, aloes bonę pondus omnium, excipe succo foeniculi.

* Surculi
summi cum
floribus sic-
cati.

Colocynthis, agaricus, aloë, mastiche per se terantur: cætera simul misce omnia & comprehendente melle cocto, cum succo foeniculi ad ipsius consumptionem, seu donec mel valde glutinosum euaserit.

* Eius præ-
paratio horre-
sem substi-
tutus sicca

Pilulæ foetidæ maiores Mesuæ recipiunt sagapeni, hammoniaci, popanacis, bdellii, colocynthidos * rutæ agrestis, aloes, epithymi ana drachmas quinque, hermodactylorum, esulæ ana drachmas duas, scammonii drachmas tres, cinamomi, spicæ, croci, casto-

rii ana drachmā vnam, turbith drach. quatuor, zingiberis drachmam vnam & semissem, euphorbii drac. vnus partes duas, dissolue lachrymas succo porri, & colato comprehendere omnia.

Liquores quatuor primi succo porri calfacto dissoluti & colati, coquantur ad consumptionem multi succi, deinde cætera mista comprehendunt. Scammonium tamen & euphorbium liquores per se puluerantur, nisi recentia sunt, & mollia: ita enim etiam dissolui possunt.

Pilulæ de hermodactylis maiores, recipiunt hermodactylo- Mefues.
rum, aloes, turbith, colocynthidos, myrobalanorum flauarū, bdellii mollis, sagapeni ana drachmas sex, opopanacis, euphorbii, sarco collæ, castorii, rutæ agrestis, apii ana drac. tres, croci drachmas duas & semissem, comprehendere succo brasiicæ.

Melle cui incoctus sit hic succus excipiuntur omnia hæc puluerata: nam etiam puluerari possunt hi liquores pauci & sicciore cum multis siccis: vel potius vt prius, liquores hi succo brasiicæ calfacto soluti, colati, recocti omnia alia comprehendant.

Pilulæ arthriticæ Nicolao recipiunt hermodactylorum, turbith, agarici ana drachmas quatuor, * casia lignea, spica, caryo- * Vulga-
ris cina-
momi.
phyllorum, xylobalsami, carpobalsami, zingiberis, mastiches, fœniculi, seminis lithospermi, seminis asparagi, rusci, rosarum, salis gemmæ ana drachmā semissem, aloes pondus omnium, comprehendere succo fœniculi. seminis in
bacca eius
rubra con-
diti.

Succus in melle coquendo consumitur, quo melle vires succi adepto cætera excipiuntur. pilulas ex semine cucumeris agrestis & Alexandrinæ podagricis & arthriticis vtilis scribit Nicolaus Alexandrinus. hanc vero descriptionem non habet.

Pilulæ fumaricæ Auicennæ recipiunt myrobalanorum flauarum, cepularum, nigrarum scammonii ana drach. quinque, aloes drach. septem, omnia ter imbuantur succo fumaricæ, & toties siccantur, & postremo fac massam.

Imbui debent succo fumaricæ non excipi, sed melle cui succus hic incoctus fuerit, multo facilius ob myrobalanorum siccitatem, sole siccantur quàm aromaticæ.

Pilulæ ascleieret Auicennæ recipiunt pulueris hieræ picræ vnc. vnam, mastiches, myrobalanorum citrearum ana vnc. semissem, aloes vnc. duas, cum syrupo stœchados. forma offam.

Hic syrupus vt cæteri ob lentorem idoneus est his pulueribus comprehendendis, & seruandis à situ ac putredine.

Pilulæ ex agarico Mesuæ recipiunt agarici drachmas tres, radicis ireos, prassii, myrrhæ ana drachmam vnam, turbith drachmas quinque, hieræ picræ drac. quatuor, colocynthidos, sarcocollæ ana drach. duas, excipe sapa. Iris Illyr-
ica aut flo-
rentina.

Vinum ad dimidias aut tertias coctū. i. sapa crassitie & lentore est idoneum his comprehendendis, & à putredine ac transpiratione in aerem vindicandis.

Pilulæ ex hiera recipiunt, pulueris hieræ picræ Galeni vnciam vnam, cum melle rosato, fac massam.

Similiter ex omnibus hieris & antidotis alijs fieri possunt massæ pilularum, sed melle opus est tanto parcior ad pilulas quàm ad electaria, quanto pilulas electariis esse oportet duriores.

Pilulæ mastichinæ conciliatoris recipiunt mastiches drach. quatuor, aloes drach. decem, agarici drach. tres, cum succo artemisæ, finge massam.

Hæc tria seorsum trita mastichæ, si vis cum pauca aqua dulci, melle excipiuntur, cui succum artemisæ incoxeris.

Pil. ante
cibum.

Pilulæ stomachicæ Mesuæ recipiunt aloes drach. sex, mastiches rosarum ana drach. duas, syrupo rosato excipe.

Aloe æsta
ta, & sta-
tu pestilē-
ti lauāda.

Pilulæ rufæ, seu communes recipiunt croci, myrrhæ ana vnam, aloes vnc. duas, comprehende vino aromatico.

Nunc melle rosato comprehenduntur.

Pilulæ bechicæ Mesuæ recipiunt succi glycyrrhizæ, sacchari ana aureos sex, amyli, tragacanthi, amygdalarum dulcium ana aureos quatuor, cōprehende mucagine seminis psyllii, aut cydoniorum.

Possunt comprehendi mucagine tragacanthi, vt sequentes.

Pilulæ albæ fiunt ex sacchari libra vna, in vncia mucaginis tragacanthi soluta, & diu tribulata.

SECTIO SEPTIMA DE TROCHISCIS.

Quid trochiscus & cur hoc nomine, & alij appellatus, abunde nobis dictum est sectione septima Mesuæ. Horum autem vel compositio hic fieri non potest, vt trochiscorum theriacorū, vel vsus intercidit, vt iam paucissimi sint in officinis compositi. Quia vero componendi rationem habent pilulis finitimam (in ambobus enim pulueres humore aliquo excipiuntur) longo sermone mihi egere non videtur. Ob id paucis eos perstringā, quod adhuc sunt vsui quotidiano, qui vero aliorum erit necessitas, Mesuæ & Nicolai Alexandrinum consulas.

Trochisci de gallia moschata Mesuæ recipiunt ligni aloes crudi partes quinque, ambræ partes tres, moschi partem vnam, glutinis, tragacanthi, cum aqua rosata extracti, quantitatem illa comprehendere sufficientem: fiant trochisci magnitudine foliorum myrti, sigillentur, reponantur in vase vitreo. alij *ambra* oleo balani- no in vase vitreo soluunt, & hoc oleo cætera comprehendunt.

De ben&
mustelinū
vocat.

Trochisci de gallia moschata Nicolai Alexandrini, recipiunt mastiches vnc. duas, gummi vnc. vnam, caphuræ scriptulum vnum, trita mollissime, cum aqua rosarū formentur in trochiscos, in vmbra siccetur, terantur subtilissime oleo iasmino, sambacū vocant, incoquantur, adde cinamomi, caryophyllorū, nucis moschatæ, ana semunciam, fac trochiscos, illinc moscho aqua rosarum soluto.

Male in Nicolao, olei sambucini vnciæ quatuor & male coquit ad dimidias, hodie mastiche trita super cineres calidos ex olei drach. vna soluitur, pul. gummi & caphuræ additur affusa pauca aqua rosarum.

Nicolai
Alexan-
drini.

Trochisci aliptæ moschata, recipiunt ladani purissimi, vnc. tres, styracis, calamithæ vnc. vnā & semissem, styracis rubri vnciā vnam, ligni aloes drachmas duas, ambræ drachmam vnam, caphuræ script. vnum & dimidium, moschi script. dimidium, aquæ rosarum quantum sufficit.

Ladanum per se negligenter & crassius teratur, styrax vterque simul parum teratur, & per cribrum rarum cernendo purgetur: deinde tria hæc catino imposita sole æstiuo, vel sine hoc vase duplici liquetur potius, quam mortarij, aut pistilli caliditate vehemēti, mox, vt liquata sunt pistillo in mortario, sole vel igni probe siccatis, diu tūdantur addendo paulatim puluerem ligni aloes. In mortario alio tere amygdalas aliquot oleofas, easque vbi mortarium, & pistillum illeuerint, abijce: ibi tere primum ambram, deinde caphuram, & moschum aqua rosarum pauca affusa, misce reliquis & forma trochiscos. Hæc parandi ratio prope tota ex eodem Nicolao est sumpta.

Trochisci de myrrha Nicolai recipiunt myrrhæ, foliorum rutæ, mentastri, pulegii ceruini, rubiæ, * opi Parthici, sagapeni, opopana- *assa fo-
tida. naci, ana drach. tres, lupinorum pertritorū drach. quinque fiant trochisci cum succo rutæ ponderis drach. duarum.

Trochisci de agarico Mesuæ recipiunt agaricum electum pulueratū, qui cū vino cui infusum sit zingiber, formatur in trochiscos.

Trochisci de spodio recipiunt spodii drach. quatuor, rosarum rubrarum drach. septem, seminis portulacæ, succi glycyrrhizæ, ana drach. duas, muccagine seminis psyllii cōprehende in trochiscos drach. vnus.

Spodium arabum sit verum non ebur vltum, ne autem accipe spodium Græcorum rem fornaciarum pompholygi affinem nunquam sumendam, sed solum admouendam.

Trochisci de terra sigillata Mesuæ recipiunt sanguinis draconis, gummi Arabici, asfi, * ramich, rosarū, seminis rosarum, amy- * i troch?
Mesf. li asfi, spodii, acaciæ, hypocisthidos, balaustii, boli armenia, terre sigillatæ. i sigilli Lemni, corallii, vnionū, succini, tragacanthi, papaueris nigri, ana drach. tres, & semissem, sem. portulacæ asfi, cornu cerui vsti, thuris, nucū cypressi, ana drach. duas, cū aqua arnoglossi fac trochiscos.

Trochisci de succino Mesuæ recipiunt succini aureos sex, cornu Dia ele-
stra, seu
de carabe cerui vsti gummi Arabici asfi, corallii, vsti, tragacanthæ, acaciæ, hypocisthidos, balaustii, massiches, cancam loti, papaueris nigri asfi ana aureos duos, thuris, croci, opii ana aureum vnum & semissem, fac trochiscos cum muccagine seminis psyllii.

SECTIO OCTAUA DE PVLVERIBVS.

SVLVERES initio antidotorum nonnihil attigimus, vbi horum pulueres pyxidibus vitreis fere seruari diximus, & interdum præsertim vtendi tempore in electario solida formari. Sæpe etiam initio melle, vel alio excipi, seruari, coqui, ea suo calore natiuo seu (vt cum vulgo dicam) fermētari. De pulueribus alijs siquid es sollicitus: ex Mesuæ sectione octaua repete, tātum addam pulueres condimentis destinatos.

Puluis minutarum specierū recipit zingiberis albi lib. vnam, piperis boni vnc. quatuor, nucis moschatæ vnc. duas, caryophyllorum, granorum paradisi ana vnc. vnam, cinamomi electi semiu nciā fiat puluis.

Puluis albus recipit zingiberis albi & purgati libr. vnam fiat puluis. Puluis eximius finis vulgo dictus, recipit zingiberis albi selibram, granorū paradisi vnc. duas. tritis his simul misce croci drach. duas, & acetum paulatim affunde, vt croci colorem induat, diu & multum runde simul omnia.

DE MEDICAM. SIMPL.

Libræ vni facchari misce cinamomi vnciam vnam. habes puluerem ducis.

SECTIO NONA DE OLEIS.

In genera quatuor demonstrauius in Mesue, quorum primū est oleum ex oliuis maturis, aut immaturis expressum, quod oleū absolute dicitur, aut cum vulgo oleum commune. Alterum est quod ex seminibus oleaginis exprimitur. Tertium quod vi ignis tollitur aut descendit. Quartum quod oleo constat, sed cui plantarum partes ac animalium sunt incoctæ.

Primum genus tanquam cuius perspicuum sciens omitto, reliqua tria persequar.

Secundū
genus.

Oleum igitur amygdalarum dulcium fit ex amygdalis non depellatis, in mortario lapideo pertritis, in offas collectis, quæ calentis aquæ vapore, in quo diu subiguntur manibus vbi calent calato spartaceo, aut sacco cânabino calenti inuolute, torculari calido exprimuntur in oleum clarissimū & dulcissimū. Aliter quoq; fieri in Mesue documus.

Sic fit oleum ex amygdalis amaris, pistacijs, strobilis, nucib⁹ auellanis, Indicis, balano myreplica, nucleis perficorum, ceraforum, seminibus cucurbitæ, cucumeris, melonū, ricini, staphidos agriæ, cnici, cannabis, lini, papaueris, hyosciami, & cæteris oleaginis, quæ etiam per genus tertium extrahi possunt.

Mes.

Oleum laurinum fit ex baccis lauri maturis recentibus, tritis in pila, incoctis aquæ, & torculari expressis.

Sic ex baccis recentibus myrti, iuniperi, terebinthi, lentisci fieri potest oleū simplex. In vsum autem frequentiore est compositum, de quo in quarto genere. Laurinum autem id ex Gallia Narbonensi vbi magnus est harum baccarum recentium prouentus, ad nos mittitur.

Tertium
genus.
Mesues.

Oleum ouorum fit ex vitellis ouorum elixando duratis triginta aut circiter, qui manibus friati in sartagine plūbata frigantur igni mediocri, mouēdo cochleari donec rubescant, & oleum ab his resoluatur & profluat.

Alios huius olei modos lege in Mesue. alij sacculo & torculari exprimunt.

Mes.

Oleum iuniperi fit segmentis ligni iuniperi, vase solido conclusis, incenso circa id igni luculento, vt in vas subiectū descēdat oleū.

Cætera ad hoc oleum pertinentia & ad alia, quæ eodem sunt modo ex Mesue repetite, item qua ratione fiat oleum philosophorum tartari, & alia eius generis permulta, quæ quia ibi fusius sunt explicata, neque multo vñ non celebrata, nūc putauī pluribus verbis explicanda.

Quartū
genus.

Olea quarti generis ex plātarum, & animalū quorundam partibus, vbi harum vires macerando, & coquendo traxerūt, colantur, exprimunturque, & humor siquis in oleum largior transijt, coctione absumitur. Et quæ olea cum succis liquidis fiūt, aut siccis quidem vel liquorib⁹, sed humore, vt vino solutis ad humoris consumptionē percoquūtur, ne humor ille excrementosus oleo putrendi & situm ducendi occasionem afferat. succi consumptionem indicat oleum spatula iniectum igni. nam si ardet, purum est: si crepitat succū habet adhuc reliquum. Adhæc seruendo in lebetē crepitat cū succo, & bullas egerit: vbi absumptus, tranquillum est, & gutta in manu succum subiectum ostendit oleum supernatans.

Olea quibus flores miscentur æstiuo insolatu magis coquuntur, aut igni lento, aut vtroque.

Olea ex animalibus facienda, viuā ipsa recipiunt, vt in his moriantur scorpiones, serpentes, ranæ, formicæ, vulpes.

Quartū
gen⁹ olei
per im-
pressionē
factū.

Oleum rosatum Nicolao sic fit, Rosarum tritarū sesquilibra coquitur diu in olei loti libris duabus vase duplici, tela alba exprimatur & torculari.

Hodie rosas recentes, etiam nō exunguatas oleo omphacino, aut loto, dies, aut etiam menses aliquot in sole macerant vase vitreo, aut siliceo. Postea hyeme, aut vtendi tem

pore, paucō succo rosarum aut vino adiecto coquunt in vase duplici ne vrendo grauculentiam acquirat, sicque reponunt. Similiter ex floribus violarum chamæmeli fit Mesuæ chamæmelinum cum oleo dulci, etiam in vase duplici coquendum, & ex floribus meliloti, aneti, liliorum, iridis, leucioj lutei, nymphææ: sed à lilijs apices crocati tollendi.

Oleum melinum fit ex cydoniis acerbis tritis, in oleo omphacino sufficienti insolatus dies quindecim, dein cum succo cydoniorum coctis in vase duplici ad horas circiter quatuor. Carnē & succum muta, rursus insola, & coque vt dixi, idque bis aut ter repete, cola, repone.

Oleū cydoniorū.
Mes.

Cydonia sunt qui cortice & semine purgent, purgatione tamen nihil opus est, nisi impura sint aut semiputria.

Oleum mastichinū recipit olei rosati vnc. duodecim, mastiches Mes. vnc. tres, vini boni vnc. octo, coque ad vini consumptionem.

Fit hodie ex oleo vulgari cum tamē aut rosato, aut omphacino, aut saltē loto confici debeat in vase duplici. Consumptoque propemodū vino mastiche pertrita paulatim affunditur continenter mouendo, donec erit liquata & permista. Cōctione longiore exanimatur.

Oleum myrtinum recipit myrtarum recentium selibram, olei omphacini, aut loti sesquilibram: insola, aut coque cū vini albi austeri vncijs quatuor ad vini consumptionem. Fit etiam per expressionem, & per decoctionē in aqua, donec oleum supernatet quod concha separandum est.

Oleum nardinum Mesuæ recipit spicæ nardi vnc. tres, vini & aquæ ana vnc. duas & dimidiam, olei sesamini selibrā, coque in vase duplici lento igne horis circiter quatuor, sæpe mouendo.

Seu ad aquæ & vini cōsumptionē, sed prius infundatur spica aquæ & vino. Fit etiam sæpe oleum nardinum descriptione Nicolai Alexandrini efficax, sed sumptuosum magis, à quo etiam componendi modus abunde explicatur.

Oleum costinum recipit costi amari vnc. duas, casie vnc. vnam, extremitatum sampsuchi vnc. octo, vini odori quantum sufficit infundere hoc biduo, olei sesamini lib. duas, coque horis septē, seu ad vini consumptionem, exprime, repone.

Mesues.
*vnc. octo aut circiter.

Aut costum verum, galāga maior hodie dictum, sumendum, aut eius loco radix enu lę campanę, aut silphij, aut similis potius quā quę vulgo est in officinis qualitatū insignium expers.

Oleum rutaceum fit ex foliis rutæ recentibus, oleo maceratis, & estate tota insolatis, qua exacta coquitur, exprimitur, reponitur, sic fit oleum menthę, absinthii.

Oleum euphorbii fit vt oleum mastichinū. Euphorbium enim tritum, aut si recens & molle est, minutina confectum oleo cum vino feruenti paulatim immitratur, & ad vini consumptionem semper mouendo coquatur.

Oleum castorii Nicolai fit ex castorii vnc. vna, cocta in olei lib. vna, ad consumptionem tertię partis castoreo retinenda.

Coquitur etiam id oleum cum paucō vini, vt vnc. duabus. Nam si per se coquatur, & oleum vrendo nigrescit, & castorium vanescit. Potest tamen sine vino in sole coqui sæpe mouendo.

Oleum vulpinum Mesuę sic fit, Vulpes integra tantum exenterata coquitur in aquę fluuiialis & marinę aut falsę, ana sextario vno, olei antiqui clari sextariis duobus & dimidio, coque ad aquę consumptionem, & vulpis carniū dissolutionem exprime & reponere.

Oleum lumbricorum fit ex lumbricis in vino albo diligenter lotis, & oleo, & paucō vini rubri incoctis ad vini cōsumptionem, deinde colatur & exprimitur leuiter oleum, ac reponitur. Sūt qui tritos deinde lumbricos eidem oleo permiscēt in vnguenti formam, nec inutiliter.

DE VNGVENTIS SECTIO DECIMA.

Paulus
cap. 20.
lib. 7.

V

VNGVENTVM, quia partibus inungitur, dictum, crassius est oleo, liquidius cerato, vt ex vnguentis Galeni, & aliorū constat. huius materię sūnt plantarū partes, & multę animalium, metallica etiā & terrea quedam. In his succi recentes, & fluidi coquendo absumuntur, vt in oleis, iidem si sunt sicci, aliquo sunt humore dissoluendi.

Si herbę in vnguenta recipiantur, vel puluerātur si sunt siccę & alijs miscentur, vt metallica & terrea, & alia plurima: vel humore aliquo, vt vino macerantur, etiā virides cōquuntur, exprimūtur: deinde reliquis vinum id vel aliud incoquitur, ad sui consumptionem. Liqueores sicci & gūmi, & resinę, vel terūtur quando sunt sicciora: vel pistillo calido soluntur, vel humore idoneo, quando pręsertim sunt humidiora.

Sunt autē vnguenta nunc igni, nunc sola subactione, sed longa, vt vnguentū ex lithargyro nutritum cum oleo, aceto alijs, & quę alia similiter nutriti diximus lib. 2. Sic argentum viuū citra ignem alijs miscetur, quod in vapore prompte totum abeat.

Vnguentis, ceratis, emplastris, æstate minus olei, cerę, & similium corpus dantiū miscemus: hyeme plus quod huius frigiditate etiā liquidiora cogantur, & duriora appareant, æstate contra etiā sicciora per colliquationem mollescant.

Cera cum oleo liquata igni aufertur, & refrigerando continenter mouetur, vbi iam modice coisuit pulueres paulatim permiscētur, idque ne fiat grumosum vnguētum. Alij vbi refrigerādo coisuit, in sartagine cochleari, aut spatula ferrea in bracteolas deradunt, in mortarium imponunt, & adiectis paulatim pulueribus duā tribulant. Quod præceptum plurimis his vnguentis est commune.

Vng. re.
gis.

Vnguentum aureum Mesuę recipit cerę flauę vnc. sex, olei boni lib. duas & semissem, terebinthinę vnc. duas, resinę pineę & colophonię ana vnc. vnā & semissem, thuris, mastiches ana vnc. vnā, croci drach. vnam.

Cera ex oleo liquata pulueratę resinę affundūtur, his liquidis terebinthina mox igni aufertur, vbi refrigit, puluis reliquorum adijcitur.

Vnguentum pompholygos spuriū recipit olei rosati vnc. decē, cerę albę vnc. quinque, cerusę lotę vnc. quatuor, plūbi vsti, pompholygos ana vnc. duas, thuris vnc. vnam. Coque oleum rosatum cum succo solani ad ipsius consumptionem, tunc adde ceram: deinde reliquorum puluerē tenuissimum misce in mortario, vbi refrigit, quo dixi modo.

Cerę vnc. duę, aut vnc. duę, & dimidia satis sunt vnguēto. Hęc enim quantitas Emplastrum fecerit, pompholyx vera misceatur non vt hodie cadmia.

Vnguentum basilicum minus Mesuę recipit resinę, picis, cerę,

ana olei quantum sufficit.

Tetrapharmacum hoc Galeno & Paulo aliter fieri docuimus in Mesue. Cera in oleo liquata, pix & resina puluerata iniiciuntur, quibus liquidis igni aufer. Si verò crassius tritam picem immittas, quia tardius liquatur, ob id diutius ignē tolerat, & velut vritur, nigrumque facit tunc vnguentum. Cera & resinæ vnc. dimidia olei vnc. duæ, picis vnc. vna.

Vnguetum Aegyptiacum Mesuæ recipit æruginis aureos quinque; mellis aureos quatuordecim, aceti acerrimi aureos septem coquenda igni ad iustam crassitiem.

Mel cum aceto primum aliquandiu coquitur, deinde additur erugo & percoquitur. Iusta autem crassities ex notis prius dictis intelligitur. hoc est, si eius portio vasi stanneo, aut marmoris imposita & refrigerata coeat, nec adhareat. Aerugo coctione trāsmittatur in rubrum, sicque minus terret vnguentum ægos quā viride.

Gal.lib.
c.ph.9

Vnguentum album rasis recipit ceræ albæ vnc. vnam, cerusæ in aqua rosarum lotæ vnc. duas, olei rosati vnc. quatuor. Sūt qui addunt paucū aceti, alii etiā vnc. vnā lithargyri, alii caphuræ drach. duas, alii duo albumina ouorū, oēs recte pro vario medici scopo.

*vnc. vnā

Hodie pleriq; addunt omnia hæc præter lithargyrum. Alij olei vnc. 12. cerusæ, ceræ albæ ana vnc. quatuor.

Vnguentum desiccatiuum rubrum nothum recipit cadmiæ lapidosæ, terræ sigillatæ, ana vnc. quatuor, lithargyri, auri, cerusæ, ana vnc. tres, caphuræ drach. vnam, ceræ vnc. quinque, olei rosati & violati ana vnc. sex.

Præstātius esset cū solo oleo rosato & eo factō ex oleo omphacino, quia magis stringeret & siccaret.

Lithargyros cum oleis aliquandiu nutritur super ignē, cera deinde liquatur in his, deinde reliquorum puluis tenuis, paulatim adijcitur.

Vnguentum enulatum spurium recipit radice enulæ campanæ coctæ cum aceto, & tritæ, & cretæ lib. vnā, axungie porci, olei communis, ana vnc. tres, ceræ nouæ, argenti viui, salina hominis ieiuni extincti, terebinthinæ lotæ ana vnc. duas, salis communis puluerati vnc. semissem.

Cera in oleo liquatur, axungia, deinde. post additur enulæ pulpa, deinde argentū viuum & sal, post id terebinthina. Sunt qui argenti viui loco salubrius miscent sulfur, alij vtrunque omittunt.

Vnguentum populeum Nicolai recipit oculorum populi lib. dimidiam foliorum papaueris nigri, mandragoræ, hyoscyami, solani, semperuiui parui & magni, lactuce, personatæ, cotyledonis, violæ nigræ, summitatum rubi tenerimarum, ana vnc. tres, axungie porci sine sale lib. tres.

A multis
huic du-
pla, aut
tripla cō
ponitur.

In hac regione populi flores & herbæ in idem tempus non incidunt. Nam oculi populi martio erūpunt, herbæ iunio vigent: ob id oculos ipsos in mortario per se terimus, deinde cum dimidio axungie porci purgatæ (sæuum dulce vocamus) multum diuque tundimus, in vase operculato recondimus hebdomadas 5. 6. menses duos, dum herbæ vigeant. Hæ incisæ & per se pistillo ligneo tritæ, quia simul ob lentorē, & multitudinem non possunt cum oculis populi, & sepo coquantur, cernuntur omnia, & si opus est parum recoquantur, reponuntur: vt tamen vireat magis, superadde coctioni solani triti manipulos duos, non maleficorum more æruginem.

Vng. de
lithargy-
ro nutri-
to.

Vnguentum tripharmacum Mesuæ recipit lithargyrum læuissi-
me tritum in mortario ad iustam crassitiem, tribulandum cum ace-
to & oleo vicissim & paulatim affusis: si verò coquis ad aceti con-
sumptionē, & lithargyri fusionē, vt crassefcat magis, fiet emplastrū

*dictum,
quia sim-
pliciter
12. constat
quot fue-
runt apo-
stoli.

Vnguentū *apostolorum Auicennæ 5. can. recipit terebinthine,
ceræ albæ, resinæ, hāmoniacy ana drach. quatuordecim, æruginis,
opopanacy ana drach. duas, aristolochiæ lōgæ, thuris masculi, bdellii
ana drach. sex, myrrhæ, galbani ana drach. quatuor, lithargyri
drach. nouē, bdellium si molle est, hammoniacy, opopanacy cum
aceto macerabis nocte vna, postridie calefac, cola, iterum pende: &
ponderi horum legitimo, terebinthinam permisce, quæ tam bel-
le hæc ac cætera cōprehendet, vt vix sis erraturus: lithargyrū autē
in oleo nutries aliquandiu sine igni friatum. Post igni trade: vbi ca-
let, ceram immitte. Hac liquata igni aufer, liquores, vt dixi, paratos
misce: vbi refrixit, reliquorum puluerē paulatim adice, & bdellii
si est siccius, quale nobis est adulterinum.

Olei li-
bræ sint
estætē duc
hyemē
tres.

Rarum vsu, tamen ob componendi & miscendi magnam difficultatē sæpe ad operis
specimen probandis seplasiarijs parari imperatur.

Emplastrum apostolicum Nicolai Alexandrini ab hoc diuersissimum est, & constat
simpl. viginti & vno.

Vnguentum martiatum cum Hermolao, vel Marcianum cum alijs, & de althæa, &
Arragon, & Agrippæ (quæ quatuor vulgus olea 4. calida vocat) quia rarò componun-
tur, omisi, ex Nicolao petenda si componendi necessitas inciderit, & vnguentum in gra-
tiam comitis cuiusdam ad menses cohibendos scriptū, quia omnibus & solis astringen-
tibus constat, vt emplastrum contra rupturam. si tamen componendi cupiditas tibi in-
cesserit, aut etiam necessitas, nobis scribitur in fine vnguentorum Mesuæ cum vnguento
citreo, & alijs non paucis hodie obsoletis: quanquam & vnguentum citreum, etiam ho-
die quidam componunt, incerti tamen quid anientum dulce sit. Nam sunt qui lapidem
vitri (quem axungiam vitri vulgo vocant) alij gypsum lucidum, alij aliud. Forte autem
corrupta vox ex amīto lapide quo adulterat hodie alumē scissile illi aspectu similitū,
sed alumē vrit, amīatus est dulcis. Eadem ambiguitate tenentur in antalli lapide, & in
gersa serpētaria quā vocē ex cerusa, syncope, n, uincorruptā esse est perspicuū. Est enim
velut aut cerusa, aut amyllum (sic enim etiā quidam vocant) ex radice ari, vel dracuncu-
li depellata, tria, siccata citra lotionem his alijs post lotionem cum aqua rosarum.

Cerote & crelæon Geracis, nobis ceratum à cera dictum, medicamentum consisten-
tia quodammodo medium inter vnguenta & emplastra.

Mes.

Ceratum Galeni refrigerans recipit ceræ albæ per ablutionem
vnciam vnā, olei rosati ex omphacyno facti vncias quatuor,
fiat ceratum in vase duplici, quod dum est refrigeratum, multum
diuque ex aqua frigidissima, & postremo paucō aceto albo puro
subigatur.

Non esse autem ceratum hoc aqua & aceto imbuendum, nisi tempore vtendi, abun-
de ex Galeno in Mesue sectione vndecima docuimus. Postremo aqua rosarū imbuunt
hodie quod probō, sed diu seruari nolo, præsertim aere calido, quia vires suas perdit, &
grauolentiam acquirit.

Ceratum fantalatum Mesuæ recipit ceræ albæ, drach. triginta,
olei rosati librā vnā, rosarum drach. duodecim, fantali rubri drac.
decem, fantali albi & flauī ana drach. sex, boli armenicæ drach. se-

ptem spodii drach. quatuor, caphuræ drach. duas.

Refrigerato iam cerato & raso puluerem in mortario miscēt, paulatim potius quam inter refrigerandum, vt ante vnguenta dixi.

Ceratum Galeni stomachicum recipit vnguenti nardini optimi ceræ odore & pinguis, & lotē ana vnc. vnam, si hyems est: si vero æstas ceræ drach. septem, liqua in vase duplici, refrigerato deinde & raso adde pulueris mollissimi aloes, & mastiches ana dra. vnā.

Succus omphacii aut absinthii quando addenda, in Mesue dixi. Hoc aliter Mesues componit ex Galeno, sed mutatis aliquot simplicibus & ipsorum pondere.

Ceratum Galeni stomachicum alterum recipit olei melini, ceræ albæ lotæ ana vnciā vnā, hypocisthidos vnc. semissem. fiat ceratum.

Refrigerans.

Hæc duo cerata stomachica ex Galeno vsurpanda potius suaserim, quam quæ hodie fiunt ex Nicolao & Mesue, quanquam & id clemēs, & efficax fuerit. Illud calidissimum quod nō esse Galeni caryophylla, nux moschata, macis, cubebē, galangā, planē indicāt.

Ceratum stomachicum Galeni ex Nicolao recipit menthæ, absinthii, maioranæ, stœchados Arabicæ, foliorum lauri, chamæmeli, rosarum, ana manip. vnū, cinamomi, spicæ nardi, nucis moschatæ, caryophyllorum, macis, cubebē, galangæ ana vnc. dimidiam, thuris, mastiches ana vnc. vnā, puluerata excipe ladani, ceræ ana vnc. octo, olei chamæmeli, laurini, spicini, mastichini, rosati, ana vnc. vna & dimidia.

Oleum laurinum, rosatum, chamæmeli, cum cera & ladano liquantur, mox igni aufer, & trade mortario, cætera misce multum, & diu tundendo, donec erit glutinosum cum oleo spicino, & mastichino.

Ceratum aliud Mesue recipit rosarum, mastiches ana drach. viginti, foliorum absinthii siccorum drach. quindecim, spicæ Indæ drach. decem, excipe ceræ puræ vnc. quatuor, olei rosati lib. vna, & semisse simul igni liquatis mox aqua rosarum aliquoties lotis, deinde vino veteri, succo, cydoniorum, & pauco aceti.

DE EMPLASTRIS.

AE C emplastrum cū r, & adiectiue medicamentū emplastrum sine r, Galeno dicitur, latinis tamen placuit potius dicere neutro genere emplastrū, quos hic sequemur. Emplastrū autē est medicamentū corpori ad mouendū, durū valde & solidū ex omnibus prope medicamentis, præsertim pinguibus & siccis coactum.

H

In emplastra enim recipiuntur omnes plantarum partes, metallica item & terrea omnia. Multæ etiam partes animalium ac interdum animalia tota.

Ex his autē quædam vires solas emplastro distribuūt, vt vinū, acetum, aqua, succi liquidi, hæc enim ad sui consumptionem coquuntur. Alia corpus tantū, & materiæ emplastro conferunt, nullam verò aut minimā virtutē largiuntur, vt lithargyrus, cera, oleum commune, recens, & frequenter resinæ. Reliqua prope omnia & corpus & facultatē aliquam emplastro impartiuntur. Ex quibus patet scopos componendorū emplastrorum præcipuos esse duos facultatē, & consistentiam crassā, durā, glutinosā. Duos verò alios odorū & colorum minus esse præcipuos, & magis in ægorū gratiā quam medicamenti naturam, recipit tamen ob apprehensionem, magni quoque sunt momenti. præcipue odor. Is enim bonus cerebro cordi vtero commodare possit malus nocere, in fumendis verò coloris, & præter hos saporis magni quoque ratio est habenda, vt in methodo componendi medicamenta ostendimus.

Ex his radices, cortices, ligna, folia, furculi, flores, fructus, semina sicca, & simul puluerata, vel cum alijs, ferè postrema miscentur cocto emplastro cum aristolochia gætiana,

chameleon remoto ab igni emplastro à Galeno miscetur: siquæ verò ex his relictis & viridia sumantur, vel ex humore aliquo coquuntur, cernuntur, miscetur: vel succus ex his si succulenta sint tritis expressus incoquendis alijs seruit, & in vapore exhalat, viribus tamen relictis, vt in emplastro de genua. Id quod etià maccaginibus comune est, sed minus hæ ob lentorem exhalant.

Oleum tamen & mel adhuc multum absolutis emplastris superest.

Qui verò succi constantes & corpulenti (vt aloë, hypocistis, glycyrrhizæ succus, a cacia, glauciũ, lyciũ, elaterium, meconiũ) in emplastra veniunt si recentes sunt, aliquo rei propositæ idoneo humore soluuntur, qui coctione prius est consumendus quàm illi cõposito misceantur, aut saltem simul incoquendo consumetur. Si autẽ sicciores sunt, tamen adhuc teri cõtumaces, pistillo calido, & ob calorem siccate terantur, nisi siqui sint friabiles, vt aloë, scammoniũ, tam succus quàm liquor. Dicti verò succi omnes refrigerari iam incipietĩ emplastro miscẽdi sunt, vel dum cerati consistentiã habet emplastrũ, si illorũ succorũ substantiã & facultatem manere volumus in emplastro.

Sed succi sicciores, vt rarius in emplastra recipiuntur: sic liquores, gũmi, resinæ, metalla omnino frequentissime.

Liquores autem vt galbanum, opopanax, sagapenum, hammoniãcum aceto vel vino vel alio competenti humore macerati dissoluuntur, colantur, coquuntur ad humoris illius consumptionem, in emplastrique consistentiam coguntur, tuncque pondus illorum quæsitum in scriptura sumitur. Si verò horũ duo, tres, quatuor in idem emplastrũ recipiuntur, sed pòdere diuerso, vt in emplastro diuino, separatim liquores singuli sunt macerandi, dissoluendi, colandi, coquendi, vt cuiusque per se pondus legitimũ accipiatur id quod ante hanc per colum purgationem fieri probe nõ potest ob rametorum, seminum, sordium, & aliorum largam in multis horũ mistionẽ. Si verò puri sint aut cultello purgati, potes initio statim pẽdere, & mox simul dissoluere, colare, & emplastro prope modum cocto incoquere ad humoris accititij consumptionem. Quod si iam dissoluti, colati, appensi, & per se cocti ad emplastri crassitudinem, vt dictũ est venerint, per cocto iam emplastro iniiciũtur. Sunt qui terebinthina pauca, si hanc recipit emplastrum, per coctos prius resoluant quàm iniiciant.

Galbanũ ligneo pistillo tusum aliquando ceteris ab igne depositis iniicitur, aliquando parũ incoquitur, raro multũ: hamoniãcũ sepe multũ coquitur, aut separatim, aut cum emplastro, interdũ minus: est quãdo digitis ad ignẽ, vel solem dilatatũ mox vbi alia, sed remota sunt ab igne sublata iniicitur, donec liquecat.

Hammoniãcum solum impositum squalida & arida reddit emplastra, nisi cera & resina, vel alia ad emplasticam confectiõnem idonea misceantur.

Vinum verò, acetum & alia id genus coquẽdo tota consumuntur, viribus tamen (vt dixi) in medicamento relictis pro varia aceti & vini natura. Neque enim idem potest acetum ex vino austero, & acetũ ex vino valenti. adhæc tenue, purũ album valentius est, in tenuando & penetrando quàm contrarium: sic vina medicamentis varia expetitur, nunc austera in emplastris epuloticis: nũc generosa, quale salernũ, si digerendũ valentius est. Ob id à medico sunt hæc distinguenda in suis scripturis.

Oleum emplastris prima ratione miscetur ad coctionẽ, deinde vt emplastrum fiat a nodinum, resolvens, molliens, vtque medicamento vis acris, vel austera obtundatur.

Oleum commune emplastris miscetur, vt materiã presteritisque cum cera liquatum, & mistum emplastrorum corpus, cui euphorbium vel alia misceatur. Sæpe autẽ ad metallicorum coctionẽ adhibetur, vel solum, vel cum aqua, vel aceto, vel vino. Solum cum axũgia in emplastro diachalciteos ad lithargyri, & chalciteos coctionẽ: solo itẽ vel cum dictis humoribus lithargyros leuissima fere veteribus coquitur ad sordium consistentiam, metallicis quibuscumque, vt squamma æris, cerussa, nunc initio adiectis, nunc postea, pro varijs medicis scopis.

Oleum verò vetus quanquam & materiã præbeat, tamen ad digerẽdum miscetur: id quod quanto vetustius est, tanto in id efficacius. Eadem ratione omphacinum oleũ, vel simile ad astringendum & refrigerandum miscetur: lorum ad refrigerandum, & dealbandum. Composita quoque olea omnia, & vnguenta in emplastra immitti possunt, vt præter materiã, facultatem quoque suam immittant.

Additur etiã oleum, vt resinarũ sicciorum, & ceræ vetustioris siccitatem corrigat: id quod resinæ recentiores quoque præstant.

Oleum hyeme vnguentis quibuscumque ceratis emplastris largius miscendũ quàm æstate,

à cuius calore semisufum, mollius reddit vnguentū ceratū, emplastrū, vt durius idem oleū ab hyemis frigore concretū. Eadē ratio refinārū, liquidarū, & fccarū minus & cerę, vt olei partem cotylę quartam hyeme, estate oſtaum : mifcet Galenus, interdum cotylas olei quatuor hyeme, tres estate idem mifcuit. Refina tamen & cera quāto pinguior, humidior, recētiōr tanto parciōr tam hyeme quā estate mifcēda eſt, ſed tamen parciōr adhuc estate quā hyeme.

Mel panacię & alijs quibuſdam emplaſtris mifcetur, vt corpus præbeat emplaſticū, & præterea ſiccet, tergeat, digerat, à putredine vindicet.

Cera in emplaſtris ſolum materię locum habet non efficaciam virtutis adiuvat, vt interdum refina, non tamen omnibus, vt pote materiam aliunde fortitis cera mifcetur, aut refina. Nam emplaſtrum diachalciteos neutram recipit, quōd conſiſtentiam emplaſtri iuſtam ſuppedit lithargyros, chalcitis & axungia à membranīs purgata, cum oleo coſta. Adhęc quibus ladanum mifcetur ſi largum eſt cerę vicem ſuſtinet, vt ea non ſit addenda.

Porro cera vel eſt recēs, & ob id pinguis & glutinoſa magis. Hęcque estate parciōr eſt mifcenda, vt oleum hyeme, largiori manu vtrunq;, & ratione eadem pices, & refinę. Quę verō cera eſt ſiccior, vel natura, vel tempore, hęc minus diu coquenda, & ſepe oleo aliquo vel refina liquidiore humeſtanda. Adde, quod cera alba ſeu natura, ſeu lotione ad candorem quoque interdum additur. Propoleos ferē eadem quę cerę coſiſtentia & ratio, ſed facultate trahendi vehementi eſt prædita, quā cera vel nullam vel minimam obtinet, quanuis nonnihil digerit, ſed inter digerens & tractorum aliquid intereſt Galeno initio lib. 7. c. ph. g. Propolis ob id ferē ſemper remoto ab igni in emplaſtro mifcetur, ne vis eius attractrix exhalet.

Gummi thuris omnū frequentiffimē in emplaſtra Gręcis veteribus recipitur, myrrha & ſarcocolla non rarō, bdellium & ſtyrax interdum, cætera rariffime, niſi quod capthuram, & alia quędam arabes ac neoterici frequenter hodie ſuis emplaſtris cōmifcent.

Thns autem perſepe mifcetur emplaſtris ad obtundendam aliorum valentiorū violentiam, nonnunquam vt materiā præbeat emplaſticam, præſertim quod recentiffimum eſt ac pinguiſſimum, nonnunquam vt affectus cauſam coquat, & modice digerat. Rationibus iſdem manna iſtis mifcetur, ac præter eas vt modice aſtringat. Gummi alia ferē mifcētur quo emplaſtris facultatem aliquam ſuam largiātur, ac non multo ante refinās iniiciuntur, idque quia ſubſtantia ſint aquea & caſiore cū refinę ſint aerę magis & tenuiōres, vt in ſimplicibus diximus. Si verō gūmi ſint liquida & recentia eorū que humiditate multam, & virtutem in emplaſtro manere velimus, parum diu incoquantur. Quod præceptū ſuccis, liquoribus, refinis, & alijs permultis eſt cōmune: quia coquendo ſicciora euadunt, & viribus velut exanimantur.

Gummi liquores ſemper in fine mifcētur, & ſucci ſicci quę ſi humore aliquo fuerunt ſoluenda, ad illius conſumptionem prius coquātur, poſt mifceantur, quando emplaſtrum incipit refrigerari. Succī liquidi in emplaſtro de ianua coquendi cū oleo. Herbę virides in emplaſtro gratia dei cum vino coquuntur ad eius conſumptionem. Ex oleo coquuntur emplaſtra, vt apoſtolicum, ceroneum, oxycroceū, diuinū ex cōtra rupturam, diachylon, vel ex ſuccis, vt emplaſtū de ianua: vel lacte, vt emplaſtrū gratia dei.

Chalcanthum aceto ſolutum deſiſtis ab igne paulatim mifcetur Galeno cauēt ne efferueſcat. Aes vſtum, erugo, chalcitis, magnes, bolus armenica, terra lemnia, ſulfur, auripigmentum, & cætera puluerabilia in fine deſiſtis ab igne mifcentur. Adeps ſuper ignem mifcetur ſemper agitādo, crocus humore ſolutus dum ſiūt magdalīę & moſchus mifcentur.

Refina lētiſſima, terebinthina, laricea, pithyina ſeu pinea, picea, abietina, cupreſſina emplaſtris mifcentur ſæpe ad conſiſtentiam ipſorum conſtituendam tantum, ſeu vt materiam & corpus emplaſtro cum alijs præbeant, interdum vt lentorem & glutinoſam qualitatem impartiantur, cum per alia emplaſtrum pinguis expers, nec adhærens per ſe partibus eſt, at per ſe promptē excidens.

Eſt quando vt virtutem aliquam emplaſtro afferant digerendi, tergendī, ſiccādī, vel aliam cuique ſeorſum refinę peculiarem, vt in ipſarum hīſtoria docui in ſimplicibus. Quantum autem vniufcuſque ſit mifcendum, & quando coſtioni ſit vnaquevis mifcenda, poſtea ſuis locis audies.

Terebinthina quanuis valentius quā cera emollit, ac præterea calfacit, & digerit: ſæpe, tamen emplaſtris iniicitur, vt ea tantum reddat glutinoſa non vt facultatem ali-

DE MEDICAM. SIMPL.

quam, vel nouam tribuat, vel augeat. Alię item resinę similiter pingues eadem ratione.

Quando autę ea misceatur, & simul liquores, aut succi sicci. His humore idoneo solutus, colatis, ad humoris consumptionem coctis, rectę commisceatur terebinthina, deinde ambo percocto emplastro, & ab igni deposito permisceantur, vt ignem nullum, vel minimum sentiat terebinthina. Siue per se siue cum alijs in emplastrum veniat, vt in emplastris diachylo maiore de meliloto, de mucaginibus.

METALLICA.

METALLICA sunt ante admodum curiose terenda, & cribro tenui cernenda, vt promptius liquantur si liquabilia sunt, vel ne contactu nos offendat si non liquantur, etiam si liquabilia sint.

Ex his verö quę liquantur libro superiore docui in liquatione.

Liquatur lithargyros cū aqua, vel oleo, vel vino, vel aceto, vel oleo iunctis horū aliquibus, quę tamen coquendo absumuntur, & liquandi celeritatem lithargyro afferunt, vt post audies.

Lithargyri & cerussę ana lib. i. si cum olei & aque ana lib. vna, parum diu aere puro igni splendente coquantur, album fiet emplastrum: sed vt adherat parum terebinthinę, vel resinę similis addendum, si molybdęna addatur fiet cineritiū, si lithargyros & oleum sint lota, albius fiet emplastrum. albedinem præter dicta emplastro conciliat cera alba, oleum lotionē albatum, pōpholyx, spodiū, calx, ossa vsta, & pisciū testę vstę, farine. si plus cerussę accipiat quā lithargyri albius fiet: sed minus tenax.

Aerugo citra coctionem cerato mista emplastrum facit viride: melius fiet si aerugo in sole ex aceto acri pluribus diebus leuigetur, quod enim est in ea mordax, sic miscet. Si verö æruginem cum alijs initio mediocriter coxeris, emplastrum facies melinū. i. coloris mali cydonij: si liberalius, rufum fiet. Rufa item & fusca efficiunt chalcitis vsta, auripigmentum, sandaracha, pix nigra, bitumē, gagates lapis, & alia ante mitionem nigricantia, quę si largiora misceantur, nigrum faciunt emplastrū. Melinū etiā fiet si ærugo lithargyro ad spissitudinē cocto addatur, & iterum coquatur, donec vrendo rufescat.

Cadmia fornacaria, vt etiam lapidosa prius ex vino, vel aliō liquore idoneo diu trita fit melior, & ad fusionem aptior.

Cerusa interdum additur emplastris, vt refrigeret, siccet.

Interdum ad albedinem conciliandam, interdum ceu apta tantum conficiendo emplastro materia, vt in emplastro herę ex duabus aristolochijs.

Si cādium vis emplastrū lithargyri loti & cerussę ana lib. i. cum olei vncijs nouem coquitur parum diu ob paucum liquorem (coctio enim longa nigredinē affert) sed medicamentū tunc minus est glutinosum, & adherens: quale vt fiat quidā terebinthinam, vel colophoniam maximē perlucētē miscet, ne colorem vitient, aut medicamenti virtutem. Alij eadem ratione ceram albam adijciūt, vt cerussā emplastris multis ad albedinem conciliandam misceatur: sic ad ruborem mynium sinopici. veteres miscuisset docet Gal. lib. 6. c. ph. g. vt autem sit fuscum emplastrum, squamma aeris additur, & ignis fit ex tæda loco lignorum, ibidem.

Interdum per se ex oleo coquitur lithargyros ad spissitudinem, tuncque puluerata cerussa spergitur, vt fiat emplastrum album. Cerussa potest initio misceri, vt sal, & alia metallica, & terrea; & cum lithargyro coqui quando nihil ad albedinem confeceret, sed neque ad aliud quā materiam, nisi quod valentius siccet quo diutius coquitur: sic lithargyros & metallica ac terrea alia.

Lithargyri enim vsus in emplastris duplex, si enim non liquetur, materię solū habet rationem: si liquetur præterquam quod corpus glutinosum emplastro præbet, etiam siccatur, idque magis quo diutius cocta erit, sitque sic medicamentum glutinantiū.

Si lithargyros ex oleo coquenda sit, & ei emplastro addantur mucagines, lithargyron prius extra ignem paucō oleo nutrias; deinde igni trade, & mucaginē paucam, vt vnc. duas affunde, prohibebit oleum & lithargyron vri: si non requiritur mucago, igni lento diu coquatur.

Lithargyros oleo duplo in cocta: satis glutinosum facit emplastrum sine resinoso, aut ceroso corpore, multo magis si triplo.

Si emplastrum recipit lithargyrū, cerusam cum vino, aceto, aqua, oleo, vel succo alio fluxili, prius sine igni illis nutriatur in mortario cū pistillo: deinde coquatur igni lento, donec corpus (vt dicunt) sumat, & crassum glutinosumque euadat. Lithargyros enim coquenda diu ex humore aliquo, vt siccans magis, & glutinosum reddat emplastrum. Ea-

dem ratione metallici reliqua, & terre a coctione longa ficiora euadūt, non tamen glutinosa, nisi quæ liquantur. Nam quæ glutinosa prius erant cum his cocta, liquores, gummi, resine, cera, mel, siccata magis lentorem glutinumque amittūt. Oleum verò lentum sed minus ob iunctam humiditatem multam glutinosius euadit, vt veritate sic coctione. Adde quod fufe coquendo lithargyros, & oleo vnita probe, olei glutinositatem auget, tum quod in pristinam duritiem non redit, tum quod siccādo liquiditatē olei consumit. Vnde etiam citra fusionem lithargyros læuissime trita, diu cum oleo mediocri subacta, in emplastri formā perducitur, præsertim si id in sole, vel aere aliter calido fiat.

Contra, erugo, chalcitis, squamma aris, & similia diu coquantur, vt vires eorum vehementes coctione longa obrundantur.

Ladanum autem & galbanum, & propolis, & plurima alia vires tantas non habent, Quatitas quæ obrundendo veniant ob id nihil, aut minimum coquantur.

Lithargyri lib. tres, chalciteos vnc. 4. cum olei lib. tribus, & axungie lib. duabus coquantur: præstat tamē prius in mortario miscere illa omnia, quā in cacabo coquātur. Lithargyros & cerussa ex pari sibi oleo & aqua si coquantur, medicamentum fiet fragile, cuti non herens, si maiorem liquidorū mensurā acceperint, & ob id diutius coquantur, glutinosum euadet medicamentum. Lythargyros fusa cum aqua & oleo largo blandum, & glutinosum, & album facit emplastrum.

Lithargyri libr. vna ex aceti & olei ana lib. duabus, cocta ad liquationem, glutinosum admodum facit emplastrum, magis si ex vtriusque ana lib. tribus coquatur: quod si vno die toto coquatur, nigrum fiet ac splendens.

Eadem ratione si cum largo vino & oleo liquetur. Viribus tamen maxime variat pro coctionis mensura, & aceti, vini, aque, olei varia in differētijs suis natura: quas differentias medicus Pharmacopeo in scripturis suis explicare debet. Præstātius autem fiet horum quodq; si lithargyros ex his liquoribus, vel singulis, vel coniugatus estate sole calido multum teratur singulis diebus quindecim.

Oleum hyeme largius emplastris miscetur quā estate, à cuius calore semifusum fit mollius emplastrum, vt à frigore concretum durius eadem ratio est resinarum liquidarum, aut minus siccarum & ceræ.

Resina aut cera quanto pinguior, humidior, & recentior, tanto parcior tam hyeme, quā æstate miscenda est.

Si medicamentū facturū es simile acopis vnguētis, & ceratis liquidis, oleum sit quadruplum ceræ. Si ad emplastri speciem durū, ceram oleo equalem misce, maxime si cera sit vetusta & sicca: si verò recens est ac pinguis, pauciore oleo quā cera opus est, vt ceratum emplastri consistentia fiat, maxime per estatem: vt si facis ceratum diaeuphorbij, accipe ceræ drach. sex, olei drach. sex, vel drach. quinque, euphorbij drach. vnam. Quod si resinam miscebis, vt glutinosius sit medicamentū, oleum minue. Cera enim ad liquiditatem multo pinguior est: resinæ verò si sint aride, paucio: si liquide, siccam aliquam substantiam ad emplastri consistentiam postulant. Quantū autē resinæ cerato misceas, coniectabis experientia. Terebinthina enim triplicata ceræ mista, vide an emplastri habet spissitudinem, si erit siccus, auge resinam: si mollius minue, vel ceram auge.

De propoli eadem quæ de cera ratio. si enim pinguis & recens est, parciore miscenda est ad emplastri formam, si vetus & sicca, largior potest misceri.

Si medicamentū iam cerati habet consistentiā, vt emplastrū fiat, ceræ tantū tertia pars vel quarta misceatur: si adeps miscenda est, & ea humidior, ceræ dimidium addendū est.

Si ceram parem miscebis oleo, emplastron medicamentū fiet aere temperato. Si verò cera vetus est, & arida, & aer frigidus, paulo plus olei: si autem cera pinguis, & aer calidus, paulo minus olei quā ceræ, vt ceræ pinguis lib. vni, olei vnc. duodecim, ceræ verò sicca vnc. tredecim, pro ceræ consistentia, quantitate, & aeris in calido & frigido temperatura. Vt autem pinguedine lenta cuti adhærere possit, resina additur præcipue terebinthina liquida parte ad ceram tertia, vel quarta.

Quando ceræ misceantur liquabilia, quæ frigida vbi concreuerint solida sunt, pauca cera opus est, vt in basilico tetrapharmaco recipienti ceræ, resinæ sem. colophonix, picis, seu taurini pares portiones.

Quando præterea ceræ mista sicca sunt, vt metallicorum pulueres, farine, pauca misceantur, vt emp. ex se. lini. Olei veteris libr. duæ, ceræ vnc. 20. resinæ colophonix, adipis suilli ana lib. i. & dimid. lithargyri lib. i. cerusæ, & mucaginis sem. lini ana vnc. sex, thuris vnc. 4. farine tenuissi. vnc. vna. Mucaginis, sem. fœni. lini, rad. althææ, & oleum

incoquit Paulus in diaphilo, dum bullire defierint. i. ad mucaginis consumptionem.

Ex metallicis præsertim si pauca liquida addantur, statim durissima euadit emplastrum, ob id parua quantitate paranda, præsertim si hyeme paranda sunt, ceræ, olei, adipum, medullarum, gummi, resinarum, butyri, liquorum recetium, & succorum glutinosorum misturam cum siccis. primâ coniectura quadam artificiosa ex singulorum quantitate & consistentia præsumimus: non planè scientes quale crassitudine tandè medicamentum sit futurum, Sed cum mista sint omnia, clarum fit an tenerius, vel durius equo sit redditum: quare in secunda cûpositione diligētius à nobis cōiectanda est legitima cuiusque quēritas.

Olei mensura est coniectanda ex his quibus miscetur, & coctionis quantitate, & aeris temperie: nam metallica sunt coquenda diutius quæ siccare sine morfu volumus, ac glutinosa esse, ob id largius oleum requirūt: quod si paucū habent, & minus diu coquenda & friabilia sunt, nisi resina aliqua coeat. Quod si cum oleo & aceto vel vino coquitur, quo plus aceti vel olei accipit, eo magis siccabit emplastrum.

Quæ ladanum accipiunt, non egent cera & contra, quia ladanum ceræ loco ad siccum medicamentorum vnitatē faciendam vsurpatur. Multæ ceræ mixtura medicamentum vim auferit cera recentissima, mollissima, pinguisima, paucō humore oleoso eget.

Coquēdi
modus &
ordo.

Vnus coquendi modus in omnibus emplastris non est similiter utilis, sed colorem, & sæpe facultatē immutat. Possis enim cerussam ab initio cum lithargyro coquere, sed cādorem ex longiore coctione perdet, & astringentem, & refrigerationem: magis tamen siccabit, si cruda inijcitur, contrā, si cocto iam lithargyro ad mellis consistentiam, omnia hæc mediocriter.

Dum lithargyrum & alia metallica coquis igni, spatha ferrea moue ne vratur, quod fundum ob insitam grauitatem promptè petunt.

Lithargyro ad consistentiā cocta adduntur adipēs, resinæ, gummi, manna, cera, dum cocta adeo sunt omnia, vt digitos non inquinēt, galbanum, & ærugo, & opopanax, aristolochia, panacis radix, chamæleontis, radix gentiana, myrrha.

Lithargyro ex oleo liquata cera, & terebinthina addūtur, vbi cocta sunt adeo, vt manus non inquinēt, ammoniacum manibus dilatatū additur, deinde lana succida, vsta.

Quod si sēpum & mannam thuris accipiat illa, ante cerā miscentur, & assidue mouentur: post vbi mutata erunt & liquata, ceram, & picem aridam, & terebinthinam, donec amplius manus non inquinēt: tunc adde galbanum, post æruginem, & opopanaxem aceto dissoluta.

Lithargyro ex oleo cocta squāma læuissīma miscetur semper mouēdo, deinde chalcites ex vino calido acrimoniam exuta, vel aceto trita, paulatim miscetur.

Si bitumen, pix, cera, resina, ppolis spissato illi addatur, quibus liquatis ærugo, & pyritis lapis ab igni sublato, & modice refrigerato alumē, galbanū subactū māna inijcitur.

Myrrha, bdellium, thus, opopanax ex aceto teruntur, interdum & ichthiocola minutim concisa prius, puluis lanæ succide, manna, galbanum, extra ignem inijciuntur.

Terebinthina & cera adduntur lithargyro ad consistentiam cocto, deinde ammoniacum digitis dilatatū, tunc & ærugo & squamma cr̄is: post hæc ipsum æs vstum, pytinam, & ceram: post hæc, metallica.

Coquēdi
finis.

Finis coctionis emplastrorum est, cum scopos prius dictos attingit: consistentiam scilicet legitimam cum viribus expectatis, colorem quoque quæsitum ac odorem. Consistentia autem iusta, hoc est crassa, dura, glutinosa, & adherens cognoscitur, quando emplastri portio exempta, & refrigerata in aere, marmore, metallo, vel aqua, vel alio, digitos non inficit, & omnia in vno probe coierunt: nec fragile, sed tenax, ductile, rumpi cōtumax, duritiæ ceræ igni, vel alio calore mollit æ.

Vires autē emplastri expectatas cognosces si quas frangi noluit medicus, integræ sunt, nec igni dissolutæ: quas actas voluit, vel fractas, coctione longa, vel aliorū mistione auctas & fractas coniectura quadam colligis, quæ an certa fuerit, experientia & vsu emplastri probabit medicus, & tibi postea insinuat. Ignis ipse non modò vehemēs aut clemēs, sed subiectōrū ratione, & diuturnitate emplastri, vim aliā alia mutat: nam vehemētor vr̄it, & denigrat, vt & diuturnior & fumosus, & qui ex tedis fit, vel alijs fumū multum & crassum ob resinosa substantiam edentibus, & in aere crasso, & nebuloso factus. Contrā verò elementior coquit, & qui ex lignis fit siccis, ac sine fumo, sinceram & splendidam flammam edentibus in aere puro.

Lithargyros flamma acri & continua interdū coquitur, interdum igni lento. Probe coctum est emplastrum diachylon Nicolai Alexandrini, quando in eo vesiculas, ebullare

& subsistere videris, cap. eiusdem. 104.

Pyxide rubra quædã alia ligneæ, alia pelle excepta reponitur, fere tamen hodie Damocra tis exemplo lib. 5. c. ph. g. *μαρδαίνης* manibus facimus, quas papyro circumdamus.

Emplastron diachylon cõmune Mesuæ sic fit, lithargyri tenuissime triti, & à plumbo, & scoria purgati vnc. vna & dimidia, cū olei antiqui clari vnc. tribus in mortario & lapideo pistillo ferreo diu cõquassetur & agitetur, post igni lento coque, rudicula semper mouendo, donec lithargyrum crassescat: tunc igni aufer, vt paulatim frigescat, sine. Interim vncias tres mucaginis ex semine lini, & fœnigræci & radice maluæ, extractæ parum feruefac, deinde illã paulatim lithargyro & oleo probe pistillo ligneo permisce: postremo percoq; omnia simul ad iustam spissitudinem. Si vis ireatum facere, misce, aut oleum irinum pro cõmuni, aut pulueris ireos vnciã vnã in lib. singulas: si addatur mucago, se. meliloti, anodynum magis euadet.

Hodie sic paramus. sunt qui semina lini & fœnigræci purgata sordibus, & radicem maluæ mūdã & contusã nonnulli triduo aqua macerãt, super prunas clementes, deinde semper mouendo coquunt ad dimidias, & colant. Eius colati libram vnã cum oleo aliquantisper coquunt, postea puluerem lithargyri miscent, & cõtinenter rudicula mouentes coquunt, donec bullas & stridorem edere desinat, seu donec marmori vel aquæ frigidæ infusa portiuncula & refrigerata idoneam habere consistentiam videatur.

Si lithargyros & oleum diligenter sint abluta, multo albius erit emplastrũ. Nicolao Alexandrino recipit olei veteris vnc. 4. lithargyri vnc. 3. 6. radices maluæ agrestis, & ibisci, fœnigræci, seminis lini ana vnc. 12. radices & semina in aquæ phialis tribus triduo infusas, igni lento coque ad dimidias, cola: expressi libram vnã cum oleo aliquandiu coque, dein puluerem lithargyri quãtum satis est in coque semper mouendo: dũ percoctum erit, hoc est, dũ vesiculas bullare & subsidere videris aufer igni: dum refrixerit, conde. Lithargyrũ cum oleo vidi diu agitari in mortario metallico pistillo ferreo, albit: sed dũ ignem attingit, nigrui, maxime vt diachylo ineptissimum videretur.

Lithargyrum vbi in vas igni impositum miseris, oleum paulatim affundatur, semper miscendo pistillo ligneo vbi probe sunt mista, partem meliorem mucaginis affunde & coque, dum ea videbitur consumpta: reliquum paulatim adice semper mouendo.

Cum autem lithargyrũ prõpte vratur motu per spatham ligneam latam assiduũ est opus, qui eã à fundo vasis sepatet: ignis præterea sit blandus, & affundatur vt dictũ est, mucago.

Album autem fiet vt vulgo experitur, si mucago parũ habeat se. fœnig. id enim largius flauum facit emplastrum. addunt nonnulli salem paucum initio extrahende mucaginis, vt clarior & albius sit. Lithargyros item bene lota aqua cõmuni vel salsa, albedinem addit, & coctio mediocris. Nam multa & vltioni propinqua flauitiam & ruborem & nigrorem impartit. Si vero violenta est flamma, etiam mox nigredinem dat lithargyro.

Empl. diachylon magnum Mesuæ recipit lithargyri puri, triti & creti vnc. 12. olei irini, anethini, chamæmelini ana vnc. octo, mucaginis, seminis lini & fœnigræci, & radices althææ, & ficuum pinguium & vuarum passerarum, succi ireos, & scillæ, cœsypi, ichthiocolle ana drach. duodecim & semissem, terebinthinę vnc. tres, resinę, pini, cerę flauę ana vnc. duas, compone vt diachylon cõmune.

Mucagines vt prius emulgeantur, oleoque lithargyros in mortario vel vase in quo coquenda est diu ante coctionẽ nutriatur semper mouendo, deinde igni lento coquatur, dum crassescere incipit, mucago paulatim affundatur, hac prope cõsumpta igni auferatur emplastrum, affundatur succus ireos & scillæ, & ichthiocolle glutinis mucago, cum vino & aqua simul mistis & coctis extracta. His cõsumptis coctum est emplastrum, & cera minutim

Repositio

Diachylõ
albu m.

* æreo ho
die.

Si pulue
rem ireos
misceas
oleum ali
quod etiã
tum mi
scendum.

Propor
tio lithar
gyri ad o
leũ hic ea
dem quæ
prius.

Ichthio
colla etiã
piscis est.

secta & pini resina miscendē his liquatis , terebinthina & celsypus extra ignem miscenda , quia coctionem non sustinent.

Empl. de muccaginibus spurium recipit muccaginē, sem. lini & fœnigræci, & althææ, & mediani corticis vlmī ana vnc. quatuor & semissem, olei, liliorum, anethi, chamæmeli ana vnc. vnam, hammoniāci, galbani, opopanacis, sagapeni ana vnc. semissem, ceræ nouę vnc. viginti, terebinthinę vnc. duas, croci drac. duas. fac emplastrum.

vel came
meli &
meliloti
decocto.

Muccagines vt dictum est extrahantur cortice vlmī medio bene prius confuso , eadem oleis incoquendo consumantur, olea residendo purgentur, vel linteo sine expressione colentur: his calentibus cera particulatim secta liquefiat, & liquores isti quatuor aceto * soluti, & linteo colati cerælo calido misceantur: postremo extra ignem terebinthina probeque omnia commisceantur, & caue ne in grumos abeat. Crocus tritus marmorī inaspergitur & manibus fingendo magdalias immisceatur.

Empl. de meliloto Mesue recipit, meliloti vnc. sex, florū chamæmeli, se. fœnigræci, rad. althææ, absinthii, sampsuchi, baccarum lauri ana drach. tres, cardamomi, cyperi, ireos, casie, spicę nardi, seminis apii, ameos, anisi ana drach. duas & semissem, hammoniāci drach. decem, styracis, bdellii ana drac. quinque, terebinthinæ vnc. vnā & dimid. ficus pingues duodecim, sepi hircini, resinę ana vnc. duas & semissem, cerę vnc. sex, olei sampsuchini & de spica ana. q. sufficit infundendis & extendendis omnibus.

Vt ana vn
ciam vnā.

Sepum hirci colatum resina, cera in oleis liquentur, ficus pingues aut parum humectatę probe trite per mantile, aut stamen, aut cribrum setaceum cernantur, prædictis misceantur, deinde hammoniācum & bdellium in aceto soluta & colata, postea terebinthina, postremo vbi refrixerit, pulueres creti radicem, herbarum, florum, aromatum, & simul cum his styrax per se diligenter tritus. Si vero ficus essent pauciores, & pulvis largior, nec is cernendus, possent hæc minutim concisę cum alijs teri, baccę lauri excoctandę. Sunt qui Hammoniācum & bdellium aqua (cui melilotus, chamæmelum, & fœnumgræcum sint incocta) dissolui malunt, vt emplastrum fiat emolliens magis: sed aqua illa ægrius soluuntur: quàm aceto essentia tenuitate promptius ipsa tota penetrante & dissolvente.

Emplastrum
ceroma Ni-
colaus Ale-
xandrinus,
& primę
classis drac.
7. 2. drach.
6. tertię . 4.
quartę . 3.
quintę duas
& galbanū,
ex qua bdel-
liū & cōsti-
tentē. i. sty-
racem ru-
brā in sex-
tam separet
drach. vna
vtriusq; con-
tentus, vt li-
thargyri
drach. dimi-
dia.

Empl. ceroneum Nicolai recipit picis naualis colatę, cerę ana vnc. duas, & drach. tres, sagapeni vnc. duas, hammoniāci, terebinthinę, colophonię, croci, ana vnc. vnam, & drach. tres, aloes, thuris, myrrhæ ana vnc. vnā, opopanacis, styracis, galbani, mastiches, aluminis, fœnigræci, styracis rubri, bdellii ana drach. tres, lithargyri drach. vnam & dimidiam, sagapenum, galbanū, opoponax, hammoniācum fracta vel potius incisa vino tecta nocte macerentur: coquantur ad vini dimidii cōsumptionē, colentur, tunc picem colatā misce, spathula moue, hac liquata cerā: qua fusa colophoniam colatam, postea styracem pistillo calido tritum frustatim adde: hinc mastichen, thus, myrrham, bdellium, trita, creta aliquandiu post iniice, terebinthinam, alumen, lithargyrum, fœnūgræcum percoctum effunde in aquam frigidam, extracto aquam omnē manibus exprime cum puluere, aloes super marmor oleo laurino vnctū subige, cum puluerato croco finge offas manibus eodem oleo vnctis.

Sed Nicolaus Alexandrinus litargyrum tenuissime tritum, cū oleo quantū satis est, perco-

quit, deinde picem addit: hac liquata, ceram, aqua fusa lachrymas colatas, hammoniacum, sagapenum, opopanax, galbanū, styracem vtrūque, terebinthinā, & spatula probe miscet. Hinc colophonie, thuris, mastiches, bdellii, aluminis, myrrhæ, fœnigræci, puluerē paulatim miscet: vbi pcoctū est, in aquā iniicit. Ceroma autē proprie oleū quo luctaturi se perfundūt.

Hodie melius picem & colophoniam liquatā colant, ceram in ea liquant, sagapenū, hammoniacum, galbanum, opopanax, bdellii, vino soluta & collata coctaque ad vini prope totius cōsumptionē, paulatim miscent, deinde terebinthinam, postremō puluerē reliquorum tenuissimē tritorum & cretorū, crocum verō inter subigendum super marmor & oleo manus vngunt, ne his emplastrum adhæreat. Vel potius liquoribus, vt dixi, coctis particulatim miscetur cera, resina, colophonia liquata, vel cera particulatim iisdem miscetur: & hac fusa, reliqua duo liquata paulatim miscentur: sic enim citius & perfectius in corpus vnū coeunt. Si vero simul vel liquores ceræ, picis, colophonie, vel contrā liquoribus, ceram, picem colophoniam affatim iniicit, liquores fundum ob grauitatem petētes vrentur: & cum aquosi sine ægrius, alijs pinguius summū leuitate sua petentibus miscebuntur: nisi forte tandem iam vel vlti vel semiuisti. Vide diligēter, ne aloe, & myrrha vrantur, & grumofum reddat emplastrū.

Alij secreto quodam modo hammoniacum, sagapenum, opopanax, galbanum, bdellium vino soluta, colata, cocta ad emplastri consilientiam, terebinthina paulatim mista sine igni remolliunt, non modo in ceroneo hoc, sed etiam emplastro præcedenti de meliloto & alijs, deinde liquatam ceram cum pice & colophonia miscent, postremō reliqua.

Empl. oxyroceum Nicolai recipit picis naualis, croci, colophonie, ceræ ana vnc. quatuor, terebinthinę, galbani, hammoniacy, myrrhæ, mastiches, thuris ana vnc. vnam, & drach. tres: Galbanum & hammoniacū aceto nocte vna macerantur, postridie liquantur igni, colantur, iterum coquuntur ad partis aceti consumptionem: addit tunc picem naualem colatā, hac fusa, ceram, qua liquata colophoniam, deinde terebinthinam aliquandiu post mastichen, thus, myrrham, semper spatula mouendo. Cocta in aquam frigidā immitte, manibus hanc totam exprime, super marmor oleo inunctū cum puluere croci molli, & offas finge.

Alij picem naualem colatam, colophoniam ceram liquant, his adhuc calidis galbanū & hammoniacum in aceto dissoluta & colata miscent. His coctis mastichen, thus, myrrham, postremō terebinthinam, & vbi iam refriguit manibus molliendo & subigēdo super marmor, puluerem croci confundunt: hyeme verō addi potest olei vnc. vna ob emplastri siccitatem.

Nicolaus Alexandrinus picem cum parte aceti, in olla noua coquit ad aceti cōsumptionē, cum reliqua hammoniacum, thus, in mortario terit & soluit, & coquit semper mouēdo, cauens ne acetum exiliat. Cum acetum est consumptum, galbanū, myrrham, mastichen addit, his feruefactis crocum pulueratum miscet, deinde in mortarium fundit, & fingit magdalliones. Sed modi alij placent magis.

Oxyroceum vocatur ab aceto macerante, galbanum & hammoniacum & croco largiore. Nam eius vncias quatuor recipit, ceroneum verō tantum vnciā vnam & drach. tres. In ceroneo præterea liquores vino macerantur, cætera multum conueniunt: sed illud valentius, hoc propter crocum largiorem sumptuosius, quem varie minuunt. Obid vt vilius sit, croci vnc. tantum duas hodie miscent, dolo parum malo cum croco vires medicamento maiores non largiatur, quàm ceroneo, vt causa sit nulla, cur hic adeo augeatur sumptu parum necessario, nec viribus adeo æstimandis.

Empl. de Ianua Nicolai recipit succorum apii, plantaginis, bethonicę ana lib. vnam: ceræ, picis, resinæ, terebinthinę ana libr. semissem, forma emplastrum.

In succis his reliqua tria sunt igni lento coquenda, & continenter mouēda ad succorum consumptionem, postremō terebinthina mista semel, aut bis feruefacienda. Alij terebinthinæ partem dictis simul incoquūt, reliquam extra ignem miscent, vt siccitatem aliorū emendant, sicque formam emplastro meliorem impertiunt. Succos per se in sapis coquerem potius, deinde liquatis alijs miscerem. In neutro Nicolao inuenio hoc emplastrum, vt neque

Nico. Alex.
in
prima classe
vnc. duo-
decim, in
secūda. 4.
aceti phila-
lam vnam
miscet.

tria sequentia, sed tantum ex his ceroneum, oxycroceum, apostolicum.

Empl. gratia dei Nicolao recipit, terebinthinę lib. semissem, resinę lib. vnam, cerę vnc. quatuor, mastiches vnc. vnam, verbenę, bipinnellę, bethonica ana manip. vnũ. herbę hę tuse ex vino albo valenti coquantur ad vini tertię partis consumptionem, cola, herbarum substantiam abiice, in colato cera, resina, mastiche coquantur, ad corporis idonei constitutionem. aufer igni, terebinthinā adde, spatula moue, fac emplastrum.

Hęrbę hę recentes incise, tuse in vino albo potenti ad sui dissolutionem percoquantur, colentur, in colato vini reliquo cera & resina ad colati prope consumptionem coquantur: tunc mastichen adde, postremo terebinthinam, semel seruefac, aufer igni, vbi refrigit sine in offas cylindrales.

Alij in colato resinam solam coquant: hoc prope sumpto ceram addunt, postremo terebinthinam extra ignem, & vbi refrigerari incipit, mastichen pulueratam permiscunt. Vterque hic modus, quam Nicolai est præstantior, quod mastiche coctionem non sustineat ob essentię tenuitatem.

Hodie vt sit albius, addita paulo largiore terebinthina trahunt modo penidiorum.

Empl. ad herniam Nicolao recipit picis naualis, aloes ana vnc. tres, lithargyri, cerę rubrę, colophonię, galbani, hammoniacy ana vnc. duas. Visci a quercu vnc. sex. Boli armenię, vtriusque simphyti, gypsi, vtriusque aristolochię, lumbricorũ terrę, gallarum ana vnc. quatuor, myrrhę, thuris ana vnc. sex, terebinthinę vnc. duas, sanguinis humani lib. vnā. Pellis a veruece mox vbi ablata est, horis. 24. coquatur, deinde expressa pelle & abiecta viscũ quernum in hoc iure diu coctum vbi fuerit, igni auferatur, addaturq; terebinthina, lithargyros, colophonia, hinc mastiche, thus, myrrha, galbanũ, hammoniacy, lumbrici terrę, paulo post symphytũ maius & minus, gypsum, bolus armenia: igni tũc redde, & adde sanguinem humanũ, aristolochiam longam & rotundam, postremo aloen, semper spatula agitatio, impone marmor quod oleo violato inunxeris & manibus subige. Iterũ biduo aut triduo in mortario cõtinẽter teratur.

Aliud est
Arnoldi
villanoua.

In decocto prædicto pellis arietinę recentis visci bacce ad sui dissolutionem percoctę, colatio expressę abiiciuntur, additur lithargyros, aliquanto post cera, pix, colophonia, coquendo semper mouenda ne vrantur: coctis his, & aqua prope consumpta, galbanum hammoniacy vino soluta & creta, myrrha, terebinthina, ab igne depositis, sed adhuc calentibus, thus mastiche, lumbrici in vino purgati & vino alio probe seorsum cocti. Tempore nimis durecit, nisi addatur oleum. Alij post colatum viscum extra ignem addunt ceram colophoniam, terebinthinam, aliquanto post iniciunt liquores dissolutos, colatos, coctos, vt sæpe dictũ est. Lithargyros, gypsum, thus, myrrha, bolus armenia, sanguis humanus, &c. teri habilia.

Emp. diuinum Nicolai recipit galbani, myrrhę ana vnc. vnam & drac. duas, hammoniacy vnc. tres & drach. tres, opopanax, mastiches, aristoloch. lögę, æruginis ana vnc. vnam, lithargyri & olei communis ana lib. vnam & semissem, cerę nouę vnc. octo, thuris vnc. vnam & drach. vnam, bdellii vnc. duas, Magnetis vnc. tres, misce omnia vt decet.

* (id quod Lithargyrum cũ oleo diu ante coctionem nutriatur, postea ad spissitudinem vsque coctum ei cito, quatur: tunc adde ceram minutim concisam: qua liquata aufer igni, & adde galbanũ, ham-

moniacum, opopanax, bdellium, si molle est in aceto vel vino dissoluta & colata & cocta: paucū est d' einde pulvis myrrhæ, bdellii, si est sicum, mastiches, thuris, aristolochiæ, magnetis: postre oleū, accimō ærugo ne si diu coquatur empl. fiat rubrum, sit tamen medicamentum adhuc valde ca. dit.) lidum, alioqui, ob ipsius solidam duritiem ægre permiscerentur omnia. Si vero flauum vis semistam æruginem impone, vel coquendo talem redde: si rubrum (quale Narbonensis Gallia præfert) eius æruginis drach. duas, vel quatuor dum coqui ceperit lithargyros immitte, reliquas eius drach. in fine, si non vis ita coloratum, totam misce postremum.

Emplastri forma per coctionem fiunt hodie vnguentum tripharmacum, & vnguentum de ceruisa.

Empl. apostolicū Nicolai recipit, lithargyri vnc. sex, ceræ mauricæ, colophonij ana vnc. duas, propoleos, visci querni ana vnc. vnā hammoniæ, cadmiæ lapidis ana drac. sex. mastiches, thuris ana vnc. semis. terebinthinæ, bdellii, opopanax, galbani, myrrhæ, sarco collæ, æris vsti, squammæ æris, æruginis, dictamni, aristolochiæ rotundæ, & mumiæ ana drachmas tres.

* præfixi
ridis Ni-
col. Alex.

Lithargyrum & oleum diu simul nutrita, coquatur, semper mouendo ad emplastri cōsistentiam, seu donec scutellæ imposita, ceræ, aut mellis modo coacta sint: tunc cera, colophonia, mastiche, thus, myrrha, bdellii, propolis, visci quernum, terebinthina in his quo scribitur sentit, nitur ordine liquentur. His fustis igni auferatur, adde paulatim: ne effereant liquores hammo si pōderiæ niacum, opopanax galbanum dissolutos aceto aut vino, colatos, coctos ad aceti aut vini bus oibus consumptionem, vt dictū est, recoque, deinde pulueres sarco collæ, cadmiæ lapidosæ, ærgui variaret. nis, squammæ æris, æris vsti, dictamni, aristolochiæ, dū erit pcoctū, hoc est aquæ frigidæ portione iniectum duratur, & digitos tractatu non inquinat glutinoso adhæsu, tūc totum aquæ frigidæ iniiciatur: dum refrigit, exemptum manibus, oleo laurino inunctis, fac magdalias. Nicolaus Alexandrinus, lithargyro, cum oleo ad emplastri consistentiam percocto, cerā, galbanū, terebinthinam, propolim, colophoniam seorsum & modico intervallo addit: postea, æs vstū, cadmiam commiscet, probe semper seruefaciēdo, deinde opopanax, hammoniā, bdelliū, viscum, myrrham, thus, mastichen, sarco collam, squammam æris cū pauco aceto trita in mortario, & in lactis formam deducta miscet, & coquit spatula certatim mouendo.


Empl. de vigo recipit olei chamæmeli, anethi, de spica, de lilio ana vnc. duas, adipis porci vitul. ana lib. vnam. euphorbii drach. quinque, thuris drach. decem, olei laurini sescunciam, adipis viperæ vnc. duas & semissem, ranas viuentes sex, lumbricorum in vino lotorum vnc. tres & semissem: succi radicū, ebuli & enulæ ana vnc. duas, fchoenanthi, stoechadis, matricariæ ana manip. vntū, vini odoriferi lib. duas, coque omnia simul ad vini cōsumptionē: coletur,colato adde lithargyri auri lib. vnā, terebinthinæ claræ vnc. duas, cū cera alba, fiat ceratum, aut vnguentum, addendo in fine, styracis calamitæ sescunciam, & igni ablatum pistillo tribuletur, donec tepidum erit, tunc adde argēti viui saliuā extincti vnc. quatuor, misce diu pistillo.

Hoc emplastrum adscripturus non eram, quod argētum habeat viuū à cuius vsu omnīū maxime abhorreo, propter noxas à prioribus designatas, à recentioribus experientia quotidiana plusquam vellent cognitas. Sed publica vtendi eius consuetudo, ne omittere effecit. accersit ad id Petri Gruselij olim mihi in re medica cōdiscipuli, nūc vero medici longe præstantissimi elogiū de hoc emplastro à se non semel magnis successibus vsurpato in articulorū & reliquarū partū neruolarū doloribus etiā hæreditariis, nō solis hispanam lucem cōcomitantibus in corporib' carnosiss. Plura composita medicamenta describere, mihi visum non est, quod etiam in his multa idē promittūt, & præstant, ob idq; ociosa videri possint. Inter-


grum autem cuius docto, vel noua adiicere, vel ex his quædam expungere, aut saltem mutare, vt simplicibus consent, vel pluribus, vel paucioribus, vel non idē pollentibus. Huc pertinet quod nullo negotio quiuīs potest ex Mesue, & Nicolao Alexandrino potius quā ex Salernitano quoties opus erit, alia corrogare. Nobis hoc labore sufficit experiri quid hæc in re aliquando præstare poterimus. Quapropter paucis singula tantumque leuiter perstrinximus, cum plurima superaddere nobis licuisset, nisi noluissemus prolixitate auditorem deterrere nouitium, vel obruere. Est autem id totum velut imago quædam rudis tantum eorū quæ post scribemus: sed paulatim mihi pharmacopœi sunt melioribus assuefaciendi, vt postea non fugiant maiora. Cum non ignorem in horum sæcæ plurimos omnino & indoctos, & rerum omnium imperitos, & stolidos, dicā audacius, & maleficos, & haud dubie veneficos, qui hunc laborem nostrum accusabunt tanquam parum utilem: immo noxiū, scio, calumniabūtur, quod hætenus miseris mortalibus ægris recte esse consultum per Arabicæ familiæ placita planē mentientur. Sed hi non ita multo post etiam inuiti intelligent, quā fuerit in hunc diem iniqua ipsorum conditio: & volent non volent, sub nostra hæc præcepta cogentur, ne frugibus inuentis glandes defendere amplius illis liceat. Interea vero quia nihil suis his cum amaracino vnguento est, musis & purioris pharmacopœetæ studeo scribo id quantulum quantulum est: quod oro manu grata accipiant, & secum repetent, quā non fuerit facile rem hætenus intentatam excitasse. Id quod iudicare facillimū his est, qui scripta sua aliquando publicarunt multo studio, cura, industria, vigilijs, ingenij summis virib⁹ cōparata, Qui verō nihil adhuc ediderūt, ignari nostrorū laborū, ad calūnias sunt propēssissimi, sed hæc leges ingratos tulit, & feret omnibus annis. Hisq; ingratis seruire nephas est, vt est apud poetas. Boni igitur cōsule: & fronte non ingrata sume lector candide nostrū hoc tirocinium, interea dum huius medicinæ partis specimen apparamus, longe pulcherrimum, sæcundissimum, posteritatis memoria dignissimum.

FINIS.









A DILIGENTIA ET LA
BORTON DEHOVROE
EG CHVETEC V. 111
RDIN G. D. VO. 11
13. NOVEB. AN. 1110.